una gammapatía monoclonal (5). Estos linfomas son predominantemente no Hodgkinianos y de células B (IgM-Kappa). En nuestra paciente no existía evidencia de que sufriese un proceso linfoproliferativo, si bien el estudio de la médula ósea hubiese sido necesario. Sin embargo el hecho de que el componente monoclonal haya desaparecido con el tratamiento realizado sugiere que tal evento formaba parte del propio proceso autoinmune y no se debía a una proliferación neoplásica de las células B.

J. Elvira González, N. Chozas Candañedo*, F. Medina Varo*

*Servicios de Medicina Interna y *Reumatología. Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz*

1. Moutsopoulos HM Ghused TM, Mann DL, et al: Sjögren's syndrome: Current issues. *Ann Int Med* 1980; 92: 212-226.
2. Sugai S, Shimizu S, Hirose Y, Takiguchi T, Konda S, Yamano H: Monoclonal gammopathies in Japanese patients with Sjögren syndrome. *J Clin Immunol* 1995; 5 (2): 90-101.
3. Sugai S, Shimizu S, Tachibana J, et al: Monoclonal gammopathies in patients with Sjögren's syndrome. *Jpn J Med* 1988; 27 (1): 2-9.
4. Sugai T, Konda T, Shirasaka T, et al: Non-Ig M monoclonal gammopathy in patients with Sjögren's syndrome. *Am J Med* 1980; 68: 861
5. Kassan S, Thomas TL, Moutsopoulos, et al: Increased risk of lymphoma in sicca syndrome. *Ann Int Med* 1978; 89: 888-892.

Empiema por *Alteromonas putrefaciens*

La *Alteromonas* (pseudomonas) *putrefaciens* es un raro patógeno en humanos, se trata de una bacteria bacilo gramnegativo. Este organismo pertenece al género *Pseudomonas*. En 1972 se propuso el nombre genérico de *alteromonas* (1), y en 1985 el de *Shewanella* (2). Este organismo ha sido aislado de una variedad de productos lácteos, peces en descomposición y medio ambiental como agua y petróleo y es muy frecuente su aislamiento en el agua marina (3,4). La *S. putrefaciens* es una causa inusual de infección en humanos. En la revisión MEDLINE (1975-96) se describen menos de un centenar de casos de infección por *S. putrefaciens* (5-7). Describimos el primer caso de derrame pleural donde se aísla *S. putrefaciens*, en paciente con neoplasia pulmonar.

Se trata de un paciente de 83 años con antecedentes de cardiopatía isquémica con infarto de miocardio antiguo, diabetes mellitus en tratamiento con insulina e hipertensión arterial bien controlado. Diagnosticado en abril de 1996 de probable neoplasia pulmonar, sin poder confirmarlo dado que se desestimó la realización de pruebas agresivas por parte del paciente y familiares.

Desde su alta ha permanecido su estado general estable, presentando los últimos días tos, disnea progresiva y dolor torácico en hemitórax izquierdo de características atípicas, sin fiebre. En la exploración física destacaba discreta afectación del estado general, abolición del murmullo vesicular en hemitórax izquierdo, siendo el resto de la exploración normal. En la hematimetría destacaba cifras de leucocitos normales con desviación a la izquierda; hematocrito, 30,2%; hemoglobina, 10,1%; resto de los parámetros normales; la velocidad de sedimentación globular (VSG), 107mm/primer hora. Las cifras de plaquetas y el estudio de coagulación eran normales. En la bioquímica general presentaba insuficiencia renal leve, con cifras de urea, 65 mg/dl; creatinina, 1,8 mg/dl; siendo el resultado de los demás parámetros normales. Así como, las inmunoglobulinas, anticuerpos antinucleares, factor reumatoideo, C3 y C4. En el proteinograma descaba la cifra de albumina, 3 g/dl, el resto de los parámetros eran normales. El sistemático de orina era normal. El antígeno carcinoembrionario, 336,1 (Normal: 0-3). El resto de marcadores tumorales fueron normales. La prueba de tuberculina fue negativa. En la radiografía de tórax se apreciaba derrame pleural izquierdo significativo. El líquido pleural presentaba características de exudado, con glucosa 3 mg/dl, las proteínas totales de 4.6 g/dl, LDH 1798 UI/l, los leucocitos $29 \times 10^9/l$ con 91 % de polinucleares, $40 \times 10^9/l$ hematíes, ADA 15 UI (normal), la baciloscopia era negativa. Citología con característica de benigna, y en el cultivo crecía abundante cantidad de *Alteromonas putrefaciens*. Ecografía abdominal: Derrame pleural bilateral y masa suprarrenal derecha de probable origen metastásico. En la tomografía axial computarizada torácica se apreciaba derrame pleural izquierdo de gran tamaño con atelectasia del lóbulo inferior izquierdo y engrosamiento pleural posterior, de aspecto nodular. Múltiples adenopatías calcificadas en el mediastino e hilos pulmo-

nares. Se realizó tratamiento con ciprofloxacino y drenaje del derrame con evolución favorable, aunque persistiendo discreto derrame con cultivo negativo a los dos meses de seguimiento.

La *A. putrefaciens* ha sido aislada en el humano en diversos tejidos, particularmente ocurre en pacientes con infecciones crónicas de extremidades inferiores, de oídos, en prematuros y enfermedades debilitantes (5,8). Debido a que el organismo ha sido aislado con otras especies de bacterias, en muchos casos su significación clínica es difícil de determinar. El organismo ha sido considerado responsable de episodios de bacteriemia (5,8), peritonitis en pacientes sometidos a diálisis peritoneal (9), otitis crónica (5), úlceras en piernas (7) y neumonía (3).

Suelen responder favorablemente a las fluoroquinolonas, aminoglicósidos, ureidopenicilinas y cefalosporinas. Parece mostrar mayor resistencia que la *P. aeruginosa*, a los aminoglicósidos, cefatazidima y pefloxacin (5,9,10).

Dada la rareza de este germen como causante de infecciones en los humanos, describimos el primer caso de derrame pleural en un paciente debilitado.

V. Escudero Sereno, J. Sánchez Castañón*, T. Cámara González, T. Lázarro Moreno, A. Romerales Rodríguez

Servicio de Medicina Interna y Microbiología. Hospital Comarcal Don Benito-Villanueva. Don Benito (Badajoz)

1. Baumann L, Baumann P, Mandel M, Allen RD. Taxonomy of aerobic marine eubacteria. *J Bacteriol* 1972;110:402-29.
2. McDonnell MT, Colwell RR. Phylogeny of the Vibrionaceae, and recommendation for 2 new genera. *Listonella* and *Shewanella*. *Systematic. Applied Microbiology* 1985;6:171-82.
3. Rosenthal SL, Zuger JH, Apollo E. Respiratory colonization with *Pseudomonas putrefaciens* after neardrowning in salt water. *Am J Clin Pathol* 1975; 64:382-4.
4. Heller HM, Tortora G, Burger H. *Pseudomonas putrefaciens* bacteremia associated with shellfish contact. *Am J Med* 1990;88:85-6.
5. Brink AJ, van-Straten A, van-Rensburg AJ. *Shewanella*(*Pseudomonas*) *putrefaciens* bacteremia. *Clin Infect Dis* 1995;20:1327-32.
6. Debois J, Degreef H, Vandepitte J, Spaepen J. *Pseudomonas putrefaciens* as a cause of infection in humans. *J Clin Pathol* 1975;28:993-6.
7. Appelbaum PC, Bowen AJ. Opportunistic infection of chronic skin ulcers with *Pseudomonas putrefaciens*. *Br J Dermatol* 1978;98:229-31
8. Kim JH, Cooper RA, Welty KE, Harrell LJ, Zwadyk P, Klotman ME. *Pseudomo-*

- nas putrefaciens bacteremia. *Rev Infect Dis* 1989;11:97104.
9. Dan M, Gutman R, Biro A. Peritonitis caused by *Pseudomonas putrefaciens* in patients undergoing continuous ambulatory peritoneal dialysis. *Clin Infect Dis* 1992;14:359-60.
 10. Paul K, De PK, Bhattacharya S. Comparative efficacy of fluoroquinolones, aminoglycosides, ureidopenicillins & newer cephalosporins against *Pseudomonas* species. *Indian J Med Res* 1992;95:136-8.

Shock hipovolémico por fistula aortoentérica

Una comunicación directa entre la aorta (o una de sus ramas) y el tracto gastrointestinal, conocida como fistula aortoentérica, es una causa rara de hemorragia gastrointestinal. La etiología usual suele ser la erosión producida por un aneurisma arteriosclerótico en el duodeno, pero se describen otras causas y variedades, así como otras localizaciones. La presentación clínica habitual suele ser el sangrado intermitente poco importante, que conduce a una situación de hipovolemia en el plazo de horas a días, siendo el dolor o la presencia de una masa pulsátil un hallazgo frecuente. La endoscopia, la arteriografía, los ultrasonidos o incluso el TAC se suelen utilizar para el diagnóstico en estos pacientes. Las fistulas aortoentéricas primarias se suelen descubrir durante la realización de una laparotomía, sin un diagnóstico preoperatorio preciso (1). Presentamos aquí el caso de un paciente con un cuadro de rectorragia masiva secundaria a fistula iliaco-entérica.

Paciente de 66 años de edad, con antecedentes personales de úlcus péptico y portador de un filtro en cava por cuadro de trombosis venosa profunda en miembro inferior derecho, que ingresa en el hospital para estudio de un cuadro de 48 horas de evolución de alteración en el ritmo intestinal y dolor continuo en hipogastrio y flancos de características opresivas. Toda la analítica era normal.

Para descartar patología relacionada con el filtro de cava que portaba el paciente, se realiza en primer lugar un TAC abdominal que muestra un aneurisma de aorta abdominal suprarrenal sin compromiso de la luz, sin otra patología asociada. Encontrándose a la espera de nuevas pruebas complementarias, a las 24 horas de su ingreso, el paciente sufre episodio súbito de rectorragia de aproximadamente 1 litro de sangre roja rutilante, inician-

do cuadro de inestabilidad hemodinámica (presión arterial de 50/30 mmHg, frecuencia cardiaca de 120 lpm, y claros signos de hipoperfusión periférica), ingresando en la unidad de cuidados intensivos. A su ingreso es intubado, conectado a ventilación mecánica y tras canalizar vías centrales, se inicia perfusión de fluidos (derivados sanguíneos, cristaloides y coloides). En la analítica rutinaria de ingreso sólo destacaba la presencia de un sodio plasmático de 157 meq/ml, con una hemoglobina de 7,2 g/dl, Hcto del 21%, 18.600 leucocitos, 199.000 plaquetas, actividad de protrombina del 45% y TTPA de 48 segundos (sobre un control máximo de 38). En la gasometría arterial, con fracción inspiratoria de oxígeno de 1: 7,36/67/360/38/99%, tras el aporte de 250 meq de bicarbonato un molar.

Tras su estabilización hemodinámica, se solicita endoscopia oral urgente que no encuentra alteración patológica alguna, realizándose a continuación arteriografía de ramas intestinales y cavografía que resultan ser no concluyentes al no mostrar extravasación de contraste. En esta situación, la exploración abdominal comienza a mostrar claros signos de abdomen agudo. En la laparotomía se objetiva una neoformación, identificada posteriormente por anatomía patológica como un adenocarcinoma bien diferenciado de sigma-recto, con afectación de los vasos ilíacos (una fistulización intestinal) y peritonitis fecaloidea, procediéndose a la resección de toda la zona con realización de ano ilíaco permanente según técnica de Hartmann.

El paciente reingresa en la unidad hemodinámicamente estable, tras haberse transfundido un total de 13 bolsas de sangre entre el periodo de la resucitación y el quirófano. En su evolución es extubado sin incidencias, requiriendo el empleo de dopamina y aporte de volumen por hipotensión y oliguria en las 48 horas posteriores a la intervención. Se inició tratamiento antibiótico empírico con clindamicina, tobramicina, y una cefalosporina como tratamiento de la peritonitis. Fue dado de alta en nuestro servicio a los 5 días de su ingreso, siendo remitido a su casa 14 días más tarde sin haber presentado otro episodio de sangrado.

En el caso de una hemorragia digestiva baja la sangre expulsada puede presentar las características de rectorragia o hematoquecia, y eventualmente, caso de proceder de segmentos algo más altos, de melenas. La hemorragia aguda suele incidir con mayor frecuencia por encima de los 60 años, y su frecuencia es menor que en el caso de la hemorragia digestiva alta.

El estudio de estas hemorragias cobra un interés especial pues en los últimos 20 años han cambiado los métodos exploratorios y la mentalidad terapéutica en gran parte. Al arsenal diagnóstico se han incorporado la angiografía selectiva, la fibrocolonoscopia y los barridos con radioisótopos, gracias a los cuales se puede determinar con exactitud el punto sangrante. En lo concerniente a los tratamientos, se han mejorado con la incorporación de infusiones intraarteriales de vasoconstrictores, embolización a través de sondas, extirpación endoscópica y electrocoagulación endoscópica. Previamente a la existencia de los mismos, la mayoría de las hemorragias digestivas agudas eran atribuidas a la existencia de diverticulosis. La radiología convencional y la endoscopia tenía poca sensibilidad diagnóstica en la hemorragia digestiva baja originada en segmentos proximales a la región rectosigmoidea. En esta situación la angiografía tiene una utilidad mucho mayor que en la hemorragia digestiva alta, en la que la endoscopia sí tiene un alto porcentaje de aciertos diagnósticos. En la hemorragia con un débito superior a 0,5 ml/min la arteriografía mesentérica suele localizar el punto sangrante mediante la visualización de contraste extravasado, teniendo un gran valor diagnóstico en los pacientes con hemorragia secundaria a anomalías vasculares (angiodisplasias, hemangiomas, y como en nuestro caso, fistulas aortoentéricas). Los estudios isotópicos son útiles para detectar débitos incluso de 0,1 ml/min, excepto en el caso de que el sangrado tenga su origen en el ángulo hepático pues se verá artefactado por la captación del parénquima hepático.

Las fistulas aortoentéricas primarias son una complicación poco frecuente pero severa resultante de la erosión de los aneurismas abdominales o de neoplasias. Según estudios, sólo el 31% de las mismas se puede considerar primaria pues el 69% restante son secundarias a la reconstrucción de injertos vasculares aórticos mediante prótesis (2). El diagnóstico temprano y el tratamiento eficaz son cruciales para la supervivencia. Generalmente el diagnóstico se lleva a cabo intraoperatoriamente, a causa de lo poco específico de su clínica (hemorragia digestiva, masa abdominal o dolor), que lleva generalmente al paciente al campo de lo crítico y debiendo requerir una decisión quirúrgica rápida y no el empleo para su diagnóstico de complicadas técnicas. La endoscopia y la radiología para el diagnóstico de las mismas puede ser muy útiles, pero la normalidad en las mismas no lo excluye, estando indicada la laparotomía exploradora en los pacien-