Estudio comparativo en la erradicación del *Helicobacter pylori*: ranitidina-citrato bismuto frente omeprazol más dos antibióticos durante 7 días

L. BUJANDA, A. SÁNCHEZ, C. IRIONDO, A. SANTOS, A. COSME*, C. MUÑOZ

Servicio de Digestivo. Hospital San Eloy. Baracaldo. Vizcaya.

*Servicio de Digestivo. Hospital Ntra. Sra. de Aránzazu. San Sebastián

RANITIDINE BISMUTH CITRATE VERSUS OMEPRAZOLE PLUS
TWO ANTIBIOTICS FOR *HELICOBACTER PYLORI* ERADICATION
DURING ONE WEEK

RESUMEN

Objetivos: Comparar la eficacia en la erradicación del *Helicobacter pylori* con ranitidina-citrato bismuto (RB) frente al tratamiento clásico con omeprazol.

Material y métodos: Se estudiaron de forma prospectiva y randomizada la eficacia de erradicación en 200 pacientes consecutivos con dos pautas de tratamiento; OCA-7 (omeprazol 20 mg/12 horas, amoxicilina 1g/12 horas, claritromicina 500 mg/12 horas durante 7 días) y RBCA-7 (RB 400 mg/12 horas, amoxicilina 1g/12 horas, claritromicina 500 mg/12 horas durante 7 días). La erradicación se valoró con el test del aliento al menos 4 semanas de finalizar el tratamiento.

Resultados: 112 hombres y 88 mujeres con una media de edad de 48 años (18-82 años). 100 pacientes eran randomizados a OCA-7 y 100 pacientes a RBCA-7. En total 186 pacientes completaban todo el estudio. La tasa de erradicación por intención a tratar en el grupo OCA-7 fue del 72% y del grupo RBCA-7 del 73%. La tasa de erradicación por protocolo en el grupo OCA-7 fue del 78% y del grupo RBCA-7 del 77% ($p=0,3$). Cinco pacientes del grupo OCA-7 y 9 pacientes del grupo RBCA-7 relataron efectos secundarios, 3 de estos últimos suspendieron el tratamiento por diarrea.

Conclusiones: Ranitidina citrato bismuto más dos antibióticos es tan eficaz y segura como el tratamiento clásico con omeprazol en la erradicación del *Helicobacter pylori*.

PALABRAS CLAVE: Ranitidina-citrato bismuto. *Helicobacter pylori*. Erradicación.

ABSTRACT

Aims: To compare the efficacy of ranitidine bismuth citrate (RB) combined with two antibiotics during seven days in comparison with OCA-7 for treatment of *Helicobacter pylori*.

Methods: In a randomized clinical trial 200, consecutive patients infected by *Helicobacter pylori* were studied prospectively. One of two regimens was given for 7 days; OCA-7 (omeprazole 20 mg b.i.d., amoxicillin 1 gr b.i.d., clarithromycin 500 mg b.i.d.) or RBCA (RB 400 b.i.d., amoxicillin 1 gr b.i.d., clarithromycin 500 mg b.i.d.). Eradication was defined as a negative breath test one month after therapy.

Results: 112 male and 88 female with a mean age of 48 years (range 18-82). 100 patients were randomized to OCA-7 and 100 patients to RBCA-7. Overall 186 patients completed the treatment. Intention to-treat eradication was in the group OCA-7 of 72% and 73% in group RBCA-7. Per-protocol eradication was in the group OCA-7 of 78% and 77% in group RBCA-7 ($p=0,3$). Five patients in the group OCA-7 and nine in the group RBCA-7, had side effects, three of these patients did not complete therapy by diarrhea.

Conclusions: RB with two antibiotics is as effective and safe as OCA-7 for the eradication of *Helicobacter pylori*.

KEY WORDS: Ranitidine bismuth citrate. *Helicobacter pylori*. Eradication.

L. Bujanda, A. Sánchez, C. Iriondo, A. Santos, A. Cosme, C. Muñoz. Estudio comparativo en la erradicación del *Helicobacter pylori*: ranitidina-citrato bismuto frente omeprazol más dos antibióticos durante 7 días. An Med Interna (Madrid) 2001; 18: 361-363.

INTRODUCCIÓN

El número de pacientes que reciben tratamiento erradicador para el *Helicobacter pylori* (HP) es cada vez mayor (1). Muchas pautas han sido propuestas la mayoría de ellas recomiendan un inhibidor de la bomba de protones (IBP) asociado a dos antibióticos, generalmente en nuestro país, claritromicina y amoxicilina durante 7 días (2). Otra pauta también aceptada en nuestro país pero menos extendida es el empleo de los dos antibióticos anteriores, asociados a ranitidina citrato bis-

muto (RB) (2). Con cualquiera de estas pautas se consiguen tasas de erradicación superiores al 70% (3,4). En nuestra experiencia y dentro de estudios multicéntricos internacionales hemos obtenido unas tasas de erradicación con omeprazol, claritromicina y amoxicilina durante 7 días de un 73% frente a un 85% obtenido con RB, claritromicina y amoxicilina durante 7 días (5).

Nuestro objetivo era comparar en nuestro medio la tasa de erradicación del HP con RB más dos antibióticos frente al tratamiento clásico.

Trabajo aceptado: 20 de Febrero de 2001

Correspondencia: Luis Bujanda. C/ Ocharán Mazas, 13 Q-1ºA. 39700 Castro Urdiales

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio prospectivo y randomizado en 200 pacientes consecutivos para valorar la tasa de erradicación con dos pautas diferentes: OCA-7 (omeprazol 20 mg/12 horas, amoxicilina 1g/12 horas, claritromicina 500 mg/12 horas durante 7 días) y RBCA-7 (RB 400 mg/12 horas, amoxicilina 1g/12 horas, claritromicina 500 mg/12 horas durante 7 días). Los comprimidos eran administrados después de las comidas.

En todos los pacientes se confirmó la presencia de HP mediante el test de la ureasa rápida y/o examen histológico (hematoxilina eosina) de al menos dos biopsias de antro gástrico o por medio del test del aliento C₁₃ o C₁₄.

Los pacientes eran excluidos si presentaban estenosis pilórica, obstrucción o dificultad al vaciado gástrico, neoplasias del tracto digestivo superior, esofagitis, embarazo, lactancia, tratamiento previo erradicador, menores de 18 años, pacientes con tratamiento activo o reciente con AINEs o antibióticos, enfermedades crónicas severas (como por ejemplo, cardiopatía, insuficiencia renal o hepática), coagulopatía y alergia a algunos de los componentes estudiados. Los pacientes daban el consentimiento informado al estudio.

La efectividad del tratamiento erradicador era valorada a partir de las 4 semanas de finalizar el tratamiento con el test del aliento C₁₃ o C₁₄. Durante este periodo era permitido la utilización de antiácidos y anti-H2 para los síntomas. La eficacia de la erradicación era valorada por la intención a tratar (todos los pacientes independientemente de que no completasen el estudio, estos últimos eran considerados como fracaso del tratamiento) y por protocolo (excluyendo los pacientes que iniciaban el estudio pero que no lo completaban).

Análisis estadístico

La comparación entre los dos tratamientos se realizó por el test Chi-cuadrado y análisis multivariable (regresión logística múltiple). La significación estadística era considerada para una P<0,05.

RESULTADOS

Un total de 200 pacientes participaban en el estudio (112 hombres y 88 mujeres) con una media de edad de 48 años (18-82 años). 100 pacientes eran randomizados a OCA-7 y 100 pacientes a RBCA-7. Las características de los pacientes están reflejadas en la tabla I. Ocho pacientes del grupo OCA-7 y 6

TABLA I

CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES

	OCA-7	RBCA-7
Edad media (años)	50	46
Sexo (H/M)	55/45	57/43
Peso (Kg)	68	69
Altura (cm)	166	167

pacientes del grupo RBCA-7 no volvían a la consulta tras indicar el tratamiento. En total, 186 pacientes completaban todo el estudio.

La tasa de erradicación por intención a tratar en el grupo OCA-7 fue del 72% y del grupo RBCA-7 del 73%. La tasa de erradicación por protocolo en el grupo OCA-7 fue del 78% y del grupo RBCA-7 del 77% (p=0,3). No hubo diferencias estadísticamente significativa en función de la indicación de la erradicación, en algunos casos, debido al escaso número de pacientes como en la dispepsia no ulcerosa (Tabla II).

Cinco pacientes del grupo OCA-7 relataron efectos secundarios, en tres pacientes gingivitis y/o mal sabor de boca, en uno astenia y en otro diarrea. Ninguno de ellos suspendió la medicación por los mismos. Del grupo RBCA-7 presentaron 9 efectos secundarios, en 7 diarrea que cedió al suspender o finalizar el tratamiento y 2 mal sabor de boca. De los 9 pacientes, 3 suspendieron el tratamiento por diarrea.

DISCUSIÓN

La RB es un compuesto con actividad frente al HP debido a la capacidad antisecretora de la ranitidina que facilita la acción de otros antibióticos, y por otro lado, al efecto protector de la mucosa y al efecto bactericida de las sales de bismuto (3,4).

En un metaanálisis realizado por Gisbert y cols. (3) observan como la erradicación con RBCA era del 76,6% mientras que los IBP, claritromicina y amoxicilina era del 73,7%. El riesgo relativo de la primera pauta era de 1,15 frente a 1 de IBP-CA durante 7 días. Cuando se combinaba RB con metronidazol y claritromicina por intención a tratar era de 87,2% mientras que para IBP era del 74,9% con un riesgo relativo para la primera pauta de 1,76 (3). La mejor respuesta con metronidazol se da fundamentalmente en otros países donde la tasa de resistencias al metronidazol son menores que en nuestro país (3).

Existen únicamente tres estudios publicados, no resúmenes (Tabla III) que comparan ambas pautas, se observa como

TABLA II

ERRADICACIÓN DEL *HELICOBACTER PYLORI* CON OCA-7 Y RBCA-7 SEGÚN LA INDICACIÓN

Indicación	OCA-7			RBCA-7		
	Pacientes	IT	PP	Pacientes	IT	PP
Dispepsia tipo ulcus	3-2P	60% (5)	100%	2+6-1P	67% (9)	75%
Gastritis	10-31+4P	69% (45)	76%	11+32-1P	73% (44)	74%
Ulcus gástrico	3+9-	75% (12)	75%	3+7-	70% (10)	70%
Ulcus duodenal	3+15-1P	79% (19)	83%	1+12-3P	75% (16)	92%
Duodenitis	4+14-1P	74% (19)	78%	4+16-1P	76% (21)	80%

-; test del aliento negativo +; test del aliento positivo P; pacientes perdidos o abandono del tratamiento IT; intención a tratar PP; por protocolo

TABLA III

ESTUDIOS PREVIOS COMPARATIVOS ENTRE OCA-7 Y RBCA-7

	IT - OCA-7 % (nºpacientes)	IT - RBCA-7 % (nºpacientes)	PP - OCA-7 %	PP - RBCA-7 %
Sung y cols. 1998 (6)	89,6% (50)	90 (50)	87,5%	94%
Catalano y cols. 1998 (7)	75% (39)	76% (42)	88%	84%
Castellote y Porta 2000 (8)	66% (49)	77% (49)	73%	85%
Bujanda y cols. 2001	72% (100)	73% (100)	78%	77%

IT; intención a tratar PP; por protocolo UD; úlcera duodenal

en dos de ellos hay una mejor tasa de erradicación con RBCA-7, y en otro peor, pero sin observar en ninguno de ellos diferencias estadísticamente significativas.

Cuando comparamos ambas pautas según el tipo de indicación observamos como no existe diferencias significativas, no siendo valorable en la dispepsia debido al bajo número de pacientes (5 y 9 pacientes en cada grupo). Otros autores han observado una mejor tasa de erradicación de RBCA en la dispepsia no ulcerosa (9).

Los efectos secundarios eran similares con ambos regímenes, destacando la diarrea con RBCA-7 probablemente debido a la RB. En todos los pacientes se resolvió al suspender o tras finalizar el tratamiento. Estos mismos efectos secundarios han sido previamente observados en otros estudios (3,4).

En resumen, podemos decir que tanto la pauta con OCA-7 como la pauta con RBCA-7 son igual de eficaces y seguras en la erradicación del HP.

Bibliografía

1. EHPSG. Current European concepts in the management of *Helicobacter pylori* infection. The Maastricht Consensus Report. Gut 1997; 41:8-13.
2. Sainz Sametier R, Borda F, Domínguez E, Gisbert JP y Grupo Conferencia Española de Consenso. Conferencia Española de Consenso sobre la infección por *Helicobacter pylori*. Rev Esp Enf Digest 1999; 91:777-84.
3. Gisbert JP, Gonzalez L, Calvet X, Roque M, Gabriel R, Pajares JM. *Helicobacter pylori* eradication: proton pump inhibitor vs. Ranitidine bismuth citrate plus two antibiotics for 1 week a meta-analysis of efficacy. Aliment Pharmacol Ther 2000; 14:1141-50.
4. Van Oijen AH, Verbeek AL, Jansen JB, De Boer WA. Review article: treatment of *Helicobacter pylori* infection with ranitidine bismuth citrate or proton pump inhibitor based triple therapies. Aliment Pharmacol Ther 2000; 14:991-9.
5. Herrerías JM, Bujanda L, Pena D, Chaves-da-Cruz A, Fueyo A, Compañy T. Efficacy and cost study in Portugal and Spain of three different 7 day eradication regimens of *Helicobacter pylori*. Gastroenterology 1999; 116:A186.
6. Sung JY, Leung WK, Ling TK, Yung MY, Chan KL, Lee YT, et al. One-week use of ranitidine bismuth citrate, amoxycillin and clarithromycin for the treatment of *Helicobacter pylori*-related duodenal ulcer. Aliment Pharmacol Ther 1998; 12:725-30.
7. Catalano F, Catanzaro R, Bentivegna C, Brogna A, Condorelli G, Cipolla R. Ranitidine bismuth citrate versus omeprazole triple therapy for the eradication of *Helicobacter pylori* and healing of duodenal ulcer. Aliment Pharmacol Ther 1998; 12:59-62.
8. Castellote J, Porta F. La asociación de ranitidina-citrato de bismuto con dos antibióticos en la erradicación de *Helicobacter pylori*. Med Clin (Barc) 2000; 115:118-9.
9. Gisbert JP, Carpio D, Marcos S, Gisbert JL, García Gravalos R, Pajares JM. One-week therapy with pantoprazole versus ranitidine bismuth citrate plus two antibiotics for *Helicobacter pylori* eradication. Eur J Gastroenterol Hepatol 2000; 12:489-95.