Varón de 51 años que acudió a urgencias por tos seca y disnea de moderado esfuerzo desde hacía quince días, y en los dos últimos expectoración blanca y fiebre de 38 °C. No tenía antecedentes médicos ni epidemiológicos de interés.

El paciente estaba febril y en la auscultación pulmonar presentaba crepitantes en dos tercios inferiores de ambos pulmones; el resto de la exploración incluyendo piel y articulaciones era normal. En la analítica tenía leucocitosis con neutrofilia siendo el resto de las series normales así como la función hepática y renal. La gasometría arterial objetivó insuficiencia respiratoria parcial y en la radiografía de tórax se encontraron infiltrados parcheados bilaterales de predominio basal (Fig. 1).

Fig. 1.

Se inició tratamiento con levofloxacino y se realizaron cultivos de esputo y serología de *Chlamydia*, *Legionella*, *Mycoplasma*, *Coxiella burnetii*, y adenovirus, influenza virus y citomegalovirus resultando negativos. Desapareció la fiebre y mejoró la tos pero persistiendo la disnea y las alteraciones radiológicas. En la TAC torácica se objetivaron adenopatías paratraqueales derechas, aorta pulmonares, subcarinales e hiliares bilaterales, engrosamiento del intersticio axial y peribroncovascular, lesiones nodulares subpleurales y áreas en parénquima compatibles con fibrosis. La broncoscopia y la biopsia transbronquial fueron normales. La espirometría mostró limitación de la ventilación de tipo restrictivo moderado. No se pudo realizar DLCO por problemas técnicos. Un ecocardiograma transtorácico y un estudio esofagográfico fueron normales. En el estudio inmunológico los anticuerpos antinucleares (ANA) eran de 1/280, con RNP y anti-Scl 70 positivos siendo los anticentrómero negativos así como los anti-Sm, anti-Ro, anti-La, anti histonas y ANCA. El complemento fue normal.

Dada la ausencia de otros datos clínicos que apoyaran el diagnóstico y la imagen del TAC sugestiva de sarcoidosis se realizó mediastinoscopia para biopsia de adenopatías que fueron informadas intraoperatoriamente como linfadenitis reactiva por lo que se realizó toracoscopia con biopsia pulmonar cuyo resultado fue neumonitis intersticial.

Se inició tratamiento con ciclofosfamida i.v. mensual; a los cuatro años de seguimiento el paciente no ha desarrollado afectación cutánea ni otra clínica asociada y se encuentra clínicamente estable desde entonces.

La esclerosis sistémica sin esclerodermia se caracteriza por fibrosis visceral sin esclerosis en la piel. Desde el primer caso descrito en 1954 se han publicado alrededor de 100 casos en la literatura médica, y todos los que tenían afectación pulmonar presentaban además fenómeno de Raynaud y/o clínica esofágica en el momento del diagnóstico que no presentaba nuestro paciente. Dado que la enfermedad pulmonar es la principal causa de mortalidad en pacientes con ES, un 50% a los 8 años, y que en fases iniciales puede haber regresión de la enfermedad, es importante un diagnóstico precoz.

En un paciente con neumonitis intersticial de causa desconocida debería hacerse una determinación de ANA, anti-Scl 70 y anticentrómero; dada su baja sensibilidad la negatividad no excluye el diagnóstico, pero los dos últimos tienen una especificidad comparada con controles libres de enfermedad del 99,5%, y entre el 95 y 98% cuando se comparan con pacientes con otras enfermedades del tejido conectivo.

P. Cubo Romano, P. Mínguez García, S. Muñoz Albarrán, M. Abad Cardiel, J. C. Pontes Navarro

Servicio Medicina Interna III. Hospital Clínico San Carlos. Madrid

1. Slobodin G, Rosner I, Rozenbaum M, Naschitz JE, Zuckerman E, Yeshurun D. Systemic sclerosis sine scleroderma: is it always the same disease? Report of three patients and discussion. *Rheumatol Int* 2002; 22: 170-172.
2. Agard C, Hamidou M, Meriot M, Prendki V, Grolleau JY. Pneumopathic interstitielle fibrosante révélatrice d'une sclérodémie systémique sine scleroderma. *Rev Med Interna (Madrid)* 2002; 1032-1039.
3. Poormoghim H, Lucas M, Fertig N, Medsger TA. Systemic sclerosis sine scleroderma. Demographic, clinical, and serologic features and survival in forty-eight patients. *Arthritis Rheum* 2000; 43: 444-451.
4. Fernández-Fernández FJ, Sesma P, Facio A, Guerra JL, González-Moraleja J. Anticuerpos anticentrómero y enfermedad pulmonar sin manifestaciones cutáneas. *An Med Interna (Madrid)* 1997; 14: 196-198.
5. Lomero RM, Cornella RJ, Schabel SI, Silver RM. Progressive systemic sclerosis sine scleroderma presenting as pulmonary interstitial fibrosis. *Am J Med* 1989; 87: 525-527.
6. Spencer-Green G, Alter D, Welch HG. Test performance in systemic sclerosis: Anticentromere and anti-Scl-70 antibodies. *Am J Med* 1997; 103: 242.

Eosinofilia en pacientes infectados con el virus de la inmunodeficiencia humana

Sr. Director:

La eosinofilia es un hallazgo analítico que se observa con relativa frecuencia en la práctica clínica.

Se acepta que el número total de eosinófilos tiene valor en la orientación diagnóstica, de tal manera que a medida que el número de eosinófilos aumenta, disminuyen las posibilidades diagnósticas (1).

La mayor parte de los autores consideran como eosinofilia leve si existen entre 450 y 999 eosinófilos/ul; eosinofilia modera-

da entre 1.000 y 2.999 eosinófilos e intensa cuando el número de eosinófilos es superior a 3.000 (1,2).

La alteración analítica más característica de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), es la disminución del número de linfocitos CD4.

Se ha asociado en esta enfermedad un incremento del número de eosinófilos a medida que avanza la inmunodepresión, apareciendo hasta en el 12,6% en alguna serie (3,4).

Existen algunas causas específicas de eosinofilia que deben ser consideradas en los pacientes con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, así debe valorarse la posibilidad de que estén recibiendo algunos fármacos (especialmente nevirapina, efavirenz y cotrimoxazol) (5,6), el empleo de fármacos estimulantes de la hemopoyesis (como el factor estimulante de colonias granulocíticas recombinante) (1); la existencia de una insuficiencia suprarrenal por citomegalovirus y diversas parasitosis, fundamentalmente (7).

Decidimos realizar un pequeño estudio analizando la cifra de eosinófilos, de los pacientes con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana que acudieron a una consulta monográfica de VIH de un hospital del grupo 2, durante un periodo de dos meses, tratando de comprobar si existía eosinofilia en nuestros enfermos. Analizamos las dos últimas determinaciones de eosinófilos recogidas en la historia clínica e incluíamos el valor más alto de ambas.

Durante el periodo de estudio, se incluyeron un total de 60 enfermos con infección por VIH, de edades comprendidas entre 21 y 62 años, con una edad media de 42 años.

El valor medio de eosinófilos en el citado colectivo fue de 160. No recibían tratamiento antirretroviral, 16 enfermos y en éstos, la media del valor de los eosinófilos fue de 168,7.

Estaban recibiendo tratamiento antirretroviral de gran actividad, 44 enfermos y en ellos la media del valor de los eosinófilos fue de 136.

Únicamente en cuatro pacientes existía un valor de eosinófilos superior a 500 (dos 500 y otros dos 600 células), de éstos recibían tratamiento antirretroviral, dos enfermos, pero únicamente uno de ellos con uno de los fármacos presuntamente implicados (efavirenz); de los otros dos pacientes que estaban sin tratamiento,

uno de ellos tenía el antecedente de asma bronquial, por lo que éste ya tenía una causa evidente para presentar eosinofilia.

Por lo tanto, excluyendo este paciente, únicamente 3 pacientes de los 60 analizados (5%), tenían una eosinofilia leve.

Por otra parte, 19 de los 44 enfermos que estaban con tratamiento antirretroviral, recibían efavirenz o nevirapina y sólo en uno de ellos existió eosinofilia leve (5,2%); por lo que en nuestra serie de pacientes, los citados fármacos no inducen la aparición de eosinofilia.

Como conclusiones de nuestro pequeño estudio, podemos decir que la eosinofilia se presenta en un pequeño porcentaje de los enfermos afectos de infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, estén o no recibiendo tratamiento antirretroviral de gran actividad.

F. Marcos Sánchez, M. I. Albo Castaño, M. D. Joya Seijo, P. del Valle Loarte, C. Vicente Martín

Servicio de Medicina Interna. Hospital Nuestra Señora del Prado. Talavera de la Reina. Toledo

1. Pérez-Arellano JL, Pardo J, Hernández-Cabrera M, Carranza C, Ángel-Moreno A, Muro A. Manejo práctico de una eosinofilia. *An Med Interna (Madrid)* 2004; 21: 244-252.
2. Maidment I, William C. Drug-induced eosinophilia. *Pharmac J* 2000; 264: 71-76.
3. Cohen AJ, Steigbigel RT. Eosinophilia in patients infected with human immunodeficiency virus. *J Infect Dis* 1996; 174: 615-618.
4. Tietz A, Sponagel L, Erb P, Bucher H, Battegay M, Zimmerli W. Eosinophilia in patients infected with the human immunodeficiency virus. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis* 1997; 16: 675-677.
5. Verdon R, Six M, Rousselot P, Bazin C. Efavirenz-induced acute eosinophilic hepatitis. *J Hepatol* 2001; 34: 783-785.
6. Claudio GA, Martín AF, de Dios Perrino S, Velasco AA. DRESS syndrome associated with nevirapine therapy. *Arch Intern Med* 2001; 161: 2501-2502.
7. Casado JL, Piedrola G. Adrenal insufficiency in patients with AIDS when to suspect it and how to diagnose it. *AIDS Patient Care STDs* 1997; 11: 339-343.