(1). De forma ocasional se han descrito casos relacionados con contaminación de heridas quirúrgicas (2) o por mordeduras de animales acuáticos (3). La ausencia de traumatismos previos es muy infrecuente (4). La mayor parte de las celulitis ocurren en personas sanas, aunque las complicaciones en forma de bacteriemia son casi exclusivas de enfermos con patologías subyacentes, especialmente diabetes *mellitus*, cirrosis hepática y neoplasias (1). En enfermos inmunodeprimidos (como probablemente ocurrió en nuestro caso) el origen puede ser la diseminación hematogena desde del tracto gastrointestinal. En este sentido, *Aeromonas spp* es una causa reconocida de gastroenteritis pero este microorganismo puede formar parte de la flora intestinal normal de personas sanas asintomáticas. El porcentaje de personas sanas portadoras intestinales puede llegar hasta el 3% en regiones de clima templado (5), siendo mucho mayor en zonas tropicales o subtropicales (30%) (6). Nuestra enferma no refirió antecedentes de sintomatología gastrointestinal y existe la posibilidad de que fuera una portadora asintomática, pero desgraciadamente no se pudo confirmar al no realizarse coprocultivo.

El espectro clínico de las infecciones de piel y partes blandas por *Aeromonas spp* es muy amplio, variando desde la celulitis hasta la mionecrosis, que es la forma clínica de mayor gravedad (1). La mayoría son debidas a *A. hydrophila* y es muy frecuente que sean infecciones polimicrobianas, especialmente si son secundarias a traumatismos. La celulitis es la forma clínica más frecuente y en su evolución puede abscesificarse y ocasionalmente dar lugar a ampollas, o bien la infección puede progresar localmente a través de las fascias. La abscesificación subcutánea de la celulitis por *Aeromonas spp* es más frecuente que en las de origen estafilocócico o estreptocócico y el pus puede tener olor a pescado (1). La presencia de bullas con contenido hemorrágico es más habitual en enfermos con cirrosis hepática (2). También se han descrito celulitis crepitantes y celulitis necrotizantes sinérgicas, que son las que presentan mayor gravedad (1). En estos casos la evolución puede ser rápidamente progresiva y en ocasiones es necesario realizar tratamiento quirúrgico.

Todos los aislados de *Aeromonas spp* son universalmente resistentes a penicilina y ampicilina, y más del 50% lo son a amoxicilina-clavulánico (7). Los antibióticos más activos son las cefalosporinas de segunda y tercera generación, fluorquinolonas, cotrimoxazol y aminoglucósidos (8,9). Entre estos últimos, gentamicina y amikacina tienen mayor actividad in vitro que tobramicina. En general, imipenem presenta elevada actividad pero en algunos estudios se han comunicado elevadas tasas de resistencia (hasta un 24%) que limitaría su uso de forma empírica (10). El tratamiento quirúrgico en diferentes grados (limpieza, exéresis, drenaje, desbridamiento o amputación) puede ser necesario en las formas más graves y en aquellas que se complican con mionecrosis. La mortalidad es mayor en las celulitis que cursan con diseminación hematogena y es casi nula en las formas no bacteriémicas (11).

En resumen, *Aeromonas spp* debe ser tenido en cuenta como agente causal de celulitis en enfermos inmunodeprimidos en los que no existan antecedentes traumáticos. El tracto gastrointestinal puede ser el origen de esta infección aunque no exista sintomatología gastrointestinal previa.

D. Tena, C. Gimeno, M. Díaz¹, J. Bisquert

Sección de Microbiología. ¹Servicio de Hematología. Hospital Universitario. Guadalajara

1. Gold WL, Salit IE. *Aeromonas hydrophila* infections of skin and soft tissue: report of 11 cases and review. Clin Infect Dis 1993; 16: 69-74.
2. De la Fuente J, Nodar A, Touza F, Crespo M, Arnillas E, Martínez C. Celulitis por *Aeromonas hydrophila*. An Med Interna (Madrid) 1999; 16: 635-6.

3. Fenollar F, Fournier PE, Legre R. Unusual case of *Aeromonas sobria* cellulitis associated with the use of leeches. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1999; 18: 72-73.
4. Voss LM, Rhodes KH, Johnson KA. Musculoskeletal and soft tissue *Aeromonas* infection: an environmental disease. Mayo Clin Proc 1992; 67: 422-7.
5. Millership SE, Curnow SR, Chattopadhyay B. Faecal carriage rate of *Aeromonas hydrophila*. J Clin Pathol 1983; 36: 920-923.
6. Pitarangsi C, Echeverria P, Whitmore R, Tirapat C, Formal S, Dammin GJ, et al. Enteropathogenicity of *Aeromonas hydrophila* and *Plesiomonas shigelloides*: prevalence among individuals with and without diarrhea in Thailand. Infect Immun 1982; 35: 666-77.
7. Walsh TR, Stunt RA, Nabi JA, McGowan AP, Bennett PM. Distribution and expression of β -lactamase genes among *Aeromonas spp*. J Antimicrob Chemother 1997; 40: 171-8.
8. Vila J, Marco F, Soler L, Chacón M, Figueras MJ. In vitro antimicrobial susceptibility of clinical isolates of *Aeromonas caviae*, *Aeromonas hydrophila* and *Aeromonas veronii* biotype *sobria*. J Antimicrob Chemother 2002; 49: 701-2.
9. Overman TL, Janda JM. Antimicrobial susceptibility patterns against *Aeromonas jandaei*, *A. schubertii*, *A. trota*, *A. veronii* biotype *veronii*. J Clin Microbiol 1999; 37: 706-8.
10. Reina J, Parras F, Alomar P. Sensibilidad de 100 cepas pertenecientes al grupo de las *Aeromonas* mesófilas, aisladas en heces, a 23 antimicrobianos. Rev Esp Quimioterap 1989; 2: 346-52.
11. Lau SM, Peng MY, Chang FY. Outcomes of *Aeromonas* bacteremia in patients with different types of underlying disease. J Microbiol Immunol Infect 2000; 33: 241-7.

Efectos adversos por sonda nasogástrica

Sr. Director:

El empleo de sondas nasogástricas flexibles para llevar a cabo la alimentación enteral en los pacientes malnutridos es una práctica clínica habitual que aunque segura, en ocasiones ha generado distintas complicaciones que afectan al árbol bronquial (1,2). Sin embargo no aparecen trabajos que comuniquen la asociación entre el sondaje nasogástrico y efectos adversos sobre la faringe, existiendo únicamente casos, e incluso series, donde se describen perforaciones faríngeas asociadas a otros procedimientos más agresivos, como son la ecocardiografía transesofágica, las intubaciones orotraqueales traumáticas, las extracciones dentales o ade-noideas, así como en los procesos infecciosos locales, en los traumatismos o ingestión accidental de cuerpos extraños (3-6).

Paciente de 84 años de edad que ingresa en el hospital debido a una hernia crural de la que es intervenida. Durante su evolución en planta desarrolla una insuficiencia respiratoria secundaria a una neumonía. A pesar de tratamiento con antibióticos de amplio espectro presenta síndrome febril que le impide recibir un adecuado soporte nutricional por vía oral, por lo que se implanta sonda nasogástrica. A las 24 horas de la misma comienza con afectación de su estado general con desarrollo de hipotensión, oliguria, e intenso dolor faríngeo. La laringoscopia evidencia una tumoración en la pared postero-lateral izquierda de la laringe que no desplaza la úvula, motivo por el que se realiza una TAC de laringe con contraste donde aparece un gran absceso retrofaríngeo izquierdo extendido hasta aritenoides (Fig. 1). Se practica una resección y drenaje del mismo. La paciente es dada de alta a planta tras 2 semanas de permanencia en UCI.

Fig. 1. TAC de laringe con contraste: absceso retrofaringeo izquierdo.

El espacio laríngeo es un área cervical con mínima resistencia a la extensión de infecciones localizadas a este nivel (2). Los abscesos de esta ubicación son en la actualidad una entidad poco frecuente debido sobre todo al desarrollo de los antibióticos (7). La mayoría de los mismos son de origen médico o traumático, y especialmente en el adulto es frecuente su asociación a enfermedades sistémicas (3,4,8). Además de la clínica y la laringoscopia, la TAC con contraste constituye una herramienta fundamental para su diagnóstico, sobre todo si se sospecha la invasión del espacio laríngeo y si aparecen signos de ocupación en esta área (8). Los abscesos localizados en la parte posterior y lateral de la faringe requieren un diagnóstico precoz para establecer el diagnóstico diferencial entre celulitis y absceso. Además de iniciar tratamiento con antibioterapia, el drenaje quirúrgico aunque en ocasiones controvertido, debe ser considerado ante la gravedad del proceso, el posible desarrollo de mediastinitis y la elevada mortalidad que presenta (7,8).

La perforación de la faringe tras la práctica de un procedimiento no invasivo como el sondaje nasogástrico resulta altamente improbable, aunque debe ser considerada ante la existencia de dolor faríngeo y afectación del estado general de aparición posterior a su implantación. El desarrollo de efectos adversos derivados de procedimientos médicos debe hacernos valorar la indicación de los mismos en aras de evitar su presentación; siendo deseable su realización por personal entrenado y cualificado para ello, para no añadir más factores de riesgo extrínsecos (9,10).

B. Obón Azuara, I. Gutiérrez Cía, R. Montoiro Allué

Servicio de Medicina Intensiva. Hospital Clínico Universitario. Zaragoza

1. Blanco JJ, Barreiro M, Tabara J. Hidroneumotórax secundario a colocación de sonda de sonda nasogástrica. An Med Interna (Madrid) 2005; 22: 54-5.
2. Moran I, Cancio B, Claramunt A. Condensación pulmonar por colocación inadecuada de una sonda nasogástrica. Med Clin (Barc) 2001; 117: 40.
3. Aviv JE, Di Tullio MR, Homma S, Storper IS, et al. Hypopharyngeal

perforation near-miss during transesophageal echocardiography. Laryngoscope 2004; 114: 821-6.

4. Allotey J, Duncan H, Williams H. Mediastinitis and retropharyngeal abscess following delayed diagnosis of glass ingestion. Emerg Med J2006; 23: e12.
5. Tuerlinckx D, Bodart E, Lawson G, De Wispelaere JF, De Bilderling G. Retropharyngeal and mediastinal abscess following adenoidectomy. Pediatr Pulmonol 2003; 36: 257-8.
6. Koscielny S, Gottschall R. Perforation of the hypopharynx as a rare life-threatening complication of endotracheal intubation. Anaesthetist 2006; 55: 45-52.
7. Sichel JY, Attal P, Hocwald E, Eliashar R. Redefining parapharyngeal space infections. Ann Otol Rhinol Laryngol 2006; 115: 117-23.
8. Agada FO, Sharma R, Makura ZG. Atypical presentation of cutaneous tuberculosis and a retropharyngeal neck abscess. Ear Nose Throat J 2006; 85: 60-2.
9. Needham DM, Thompson DA, Holzmüller CG, Dorman T, Lubomski LH, Wu AW, Morlock LL, Pronovost PJ. A system factors analysis of airway events from the Intensive Care Unit Safety Reporting System (ICUSRS). Crit Care Med 2004; 32: 2227-33.
10. Pronovost P, Weast B, Schwarz M, Wyskiel RM, Prow D, Milanovich SN, Berenholtz S, Dorman T, Lipsett P. Medication reconciliation: A practical tool to reduce the risk of medication errors. J Crit Care 2003; 18: 201-5.

Absceso tubo-ovárico por *Streptococcus agalactiae* en una mujer no gestante

Sr. Director:

Streptococcus agalactiae (SGB), es bien conocido como agente causal de meningitis y sepsis neonatales e infecciones durante el puerperio (1). Sin embargo, la incidencia de infecciones invasivas por SGB en adultos no gestantes se está incrementando (2). Por otro lado, el absceso tuboovárico (ATO) es una forma severa de enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) y aunque SGB ha sido descrito como agente causal de EPI(3) y los estreptococos anaerobios de ATO, no hemos encontrado en la literatura ningún caso descrito de ATO causado por SGB en mujer adulta no embarazada.

Presentamos el caso de una mujer de 47 años de edad, con antecedentes de tuberculosis pulmonar en la infancia y diagnosticada 15 años antes de diabetes mellitus tipo 1, con buen control metabólico, que fue ingresada en nuestro hospital por presentar fiebre y molestias suprapúbicas de una semana de evolución. Dos semanas antes había tenido una menstruación normal y no usaba ningún método anticonceptivo. Dos meses antes, estuvo ingresada en nuestro hospital con clínica compatible con infección del tracto urinario con hemocultivos y urocultivos negativos, presentando entonces molestias abdominales focalizadas en la fosa iliaca izquierda, con estudio ecográfico anodino, siendo tratada con cefotaxima con buena evolución, sin llegar a realizarse entonces una valoración ginecológica.

La paciente presentaba una temperatura de 38 °C, tensión arterial de 140/90 mmHg, frecuencia cardíaca de 105 latidos por minuto y 18 respiraciones por minuto con dolor a la palpación en fosa iliaca izquierda con signos de irritación peritoneal. La exploración vaginal y de cérvix fue normal. Se realizó una ecografía abdominal y vaginal objetivándose una masa quística, loculada de 7 x 6 x 5 cm en anejo izquierdo. Con la sospe-