

Vigilancia epidemiológica de la intoxicación aguda en el área sur de la Comunidad de Madrid: estudio VEIA 2004

P. J. CABALLERO VALLÉS¹, S. DORADO POMBO, A. DÍAZ BRASERO, M. E. GARCÍA GIL, L. YUBERO SALGADO, N. TORRES PACHO, C. IBERO ESPARZA, J. CANTERO BENGOCHEA

¹Centro de Salud "Ángela Uriarte". Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

EPIDEMIOLOGIC SURVEY OF ACUTE POISONING IN THE SOUTH AREA OF THE COMMUNITY OF MADRID. THE VEIA 2004 STUDY

RESUMEN

Objetivo: VEIA es un registro evolutivo de las intoxicaciones agudas (IA) atendidas en Urgencias del Hospital Doce de Octubre de Madrid en un año completo (1979 [2], 1985 [3], 1990 [4], 1994 [5], 1997 [6] y 2000 [7]) presentamos el estudio del año 2004 y comparamos los resultados con los de años anteriores (1-7).

Métodos y resultados: el método es idéntico. De las 1.508 IA, 610 son intentos de suicidio (IBAIS) 319 etílicas (IAVE) y 219 drogas (IAVD). De los 2.259 tóxicos implicados el 48% son medicamentos (50% diazepam) alcohol 25% y drogas el 13%.

Conclusiones: este año ha supuesto un importante aumento (34%) del número de casos y la incidencia supera a todas las publicadas en nuestro país (25,31,40). Aunque en el conjunto no hay diferencia significativa de género con el Censo de Área, la hay en IBAIS, IAVE y IAVD. Las IBAIS crecen un 35%; Se duplica el uso de benzodiazepinas y antidepressivos en los IS de mujeres y crecen también en hombres pero menos; El paracetamol se mantiene en el 23% AINE, adyuvantes y mio-relajantes aumentan en mujeres y también el uso de alcohol y otros no fármacos en los is de mujeres casi igualándose con los hombres. La cuarta parte de los hombres con IS eran adictos y aparecen 13 casos de trastornos alimentarios. En las IAVE crecen el grupo sin etilismo y baja el total. Las drogas se duplican con respecto al año anterior: la cocaína supone los 2/3 también suben la MDMA (22 casos) y aparecen nuevas drogas, como el pegamento, sin duda efecto de la inmigración, y ketamina; incluso cuatro casos no pudieron ser etiquetados por la falta de medios diagnósticos en la urgencia.

PALABRAS CLAVE: Intoxicación aguda. Epidemiología. Intentos de suicidio. Intoxicación medicamentosa. Intoxicación alcohólica. Intoxicación por drogas. Intoxicación accidental.

ABSTRACT

Objective: VEIA study is an evolutionary registry of acute poisonings (AP) attended in the Emergency Room of the Doce de Octubre Hospital in Madrid (Spain) in a whole year (1979, 1985, 1990, 1994, 1997 and 2000). We present the 2004 study and compare the results with the previous years.

Methods and results: Methodology has been identical across VEIA STUDY. Of 1508 AP, 610 are suicide attempts (IAVIS), 319 ethylic, (IAVE), and 218 by illicit drugs (IAVD). Of the 2,259 toxics involved, 48% are medications (50% benzodiazepines) alcohol 25% and illicit drugs 13%.

Conclusions: There is an important increase (34%) of cases and the incidence surpasses all published in our country. There are no gender differences nor in the whole neither the Health Area Census, but there are differences in IAVIS, IAVE and IAVD. IAVIS increase in 35%. Benzodiazepines poisoning increases two-fold as well as antidepressive drugs do in women. In men also increase, but in a minor extent. Acetaminophen remains the same in 23%. NSAID's, adjuvants and myorelaxants increase in women as do also alcohol and other poisons that almost equal men's. There are 13 cases of IAVIS in patients with alimentary disorders. Among men, a quarter are illicit drug abusers. In IAVE, the group without alcoholism grows and the total decreases. Illicit drugs duplicate the number of the former year. Cocaine supposes already 2/3 of the cases, MDMA ascends to 22 cases and they appear new substances as glue, without doubt as an effect of immigration and ketamine. Finally 205 household accidents and 57 industrial injuries complete the series.

KEY WORDS: Acute intoxication. Epidemiology. Suicide attempts. Medicine intoxication. Alcohol intoxication. Drug intoxication. Acute poisoning.

Caballero Vallés PJ, Dorado Pombo S, Díaz Brasero A, García Gil ME, Yubero Salgado L, Torres Pacho N, Ibero Esparza C, Cantero Bengochea J. Vigilancia epidemiológica de la intoxicación aguda en el área sur de la comunidad de Madrid: estudio VEIA 2004. An Med Interna (Madrid) 2008; 25: 262-268.

INTRODUCCIÓN

El Estudio VEIA examina la IA desde 1979 mediante cortes cuatrienales que recogen todos los casos asistidos en

Urgencias del Hospital Universitario 12 de Octubre durante un año (1-7). En el presente artículo exponemos los resultados de 2004. Justifican este importante esfuerzo las grandes variaciones que el modo de intoxicarse sufre con el paso de los

Por error en la transcripción, este trabajo fue publicado incompleto en el nº 2, volumen 25. Sólo tendrá valor referencial la versión publicada en el presente número.

Trabajo aceptado: 16 de octubre de 2007

Correspondencia: Pedro J. Caballero Vallés. Avda. de América, 22. 28028 Madrid. e-mail: pedrocvalles@yahoo.es

años instigados por factores sanitarios, farmacológicos o sociales. IA por nuevos medicamentos y drogas disponibles pero también usos diferentes de tóxicos clásicos y sobre todos variaciones en los hábitos sociales son las diferencias esperadas (1-24). Por otra parte a lo largo de estos años otros muchos estudios realizados en nuestro país ha evidenciado que nuestros resultados reflejan de modo fidedigno la cambiante realidad de las IA en España (9,14,15,18,19,24-40).

MATERIAL Y MÉTODO

Se han recogido y estudiado los casos de IA atendidos en la Sección de Urgencias del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid durante el año 2004. Este centro ofrece asistencia sanitaria al Área 11 del SERMAS y es referencia de otros centros por lo que asiste a 643.740 personas mayores de quince años (41). El número de urgencias médicas atendidas fue 186.168 médicas y de ellas 1.508 correspondieron a IA. La metodología es igual a la de anteriores publicaciones (1-7) por lo que denominamos intoxicación al contacto de productos tóxicos potenciales: a) *medicamentos*: cuando superan la dosis máxima terapéutica, incluso si intentan mitigar un síntoma y se ingiere una cantidad excesiva (sobredosificaciones); b) *alcohol y drogas*: cuando interfieren una actividad mínimamente normal, por ejemplo el equilibrio; y c) *otros tóxicos*, a cualquier dosis. Dividimos las IA en voluntarias: (IAV), a su vez repartidas en intentos de suicidio (IAVIS) etílicas IAVE, drogas IAVD y sobredosificaciones (IAVSD), según la intención y accidentales (IAA): a su vez laborales (IAAL) o domésticas (IAAD), dependiendo del lugar donde ocurren. Excluimos las toxiinfecciones alimentarias y las iatrogénicas. Los tóxicos se clasifican en: medicamentos y no medicamentos. Hablamos de fármacos o medicamentos para referirnos a los principios activos y de presentaciones farmacéuticas para denominar los distintos tipos de preparados comerciales empleados por cada paciente que pueden ser asociaciones o no.

Hemos analizado la distribución de los casos según la edad, sexo, tipo de intoxicación y tóxico. También se han estudiado los antecedentes, así como su posterior derivación y la adscripción o no del paciente al área de cobertura del hospital. Se trata de un estudio descriptivo transversal en el que se han empleado técnicas básicas de estadística descriptiva. Cada grupo se define por la proporción sobre el total en variables cualitativas y la media, mediana y/o moda, así como desviación estándar para las cuantitativas. Para la comparación de las medias se utilizó el Chi cuadrado y la prueba de Student, el límite de significación se consideró $p < 0,05$ y el intervalo de confianza del 95%.

RESULTADOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Se atendieron 1.508 IA (234/100.000 habitantes), correspondientes al 1,77% de las urgencias médicas y el 0,68% de las totales. El número de mujeres es 756 (50%) y 752 los hombres (50%), con una proporción M/H de 1:1.

Las edades oscilaron entre 15 y 96 años, con una media \pm desviación estándar para el conjunto de la serie de 36 ± 15

años (mediana y moda 33), 36 ± 14 para los hombres (mediana 35, moda 34) y 36 ± 16 para las mujeres (mediana 32, moda 36); la diferencia es significativa al comparar la edad media entre los sexos (error estándar: 0,91 $p < 0,05$). La distribución por edades y género, así como la pirámide poblacional del Área 11 de según los datos de la memoria del Hospital se expone en la figura 1. Un 20% de los pacientes atendidos no pertenecían a la zona de influencia del Hospital.




Fig. 1. Reparto numérico por edad y género.

TIPO DE INTOXICACIÓN

El número de casos de los diferentes tipos de intoxicación, su género, así como la media y la desviación estándar de las edades, figuran en la tabla I.

—Intoxicaciones agudas voluntarias (IAV) (150/100.000 habitantes). El reparto por edades en cada tipo de IAV se muestra en la figura 2. Las medias de edad de uno y otro sexo en el conjunto de IAV son significativamente diferentes (error estándar: 0,90, $p < 0,001$) y lo mismo cabe decir en las intoxicaciones

TABLA I

REPARTO SEGÚN TIPO DE INTOXICACIÓN, EDAD Y GÉNERO

2004	Varones			Mujeres			Total		
	Nº	%	Edad \pm DE	Nº	%	Edad \pm DE	Nº	%	Edad \pm DE
Voluntarias									
Intento suicidio	195	31	36 \pm 12	415	68	35 \pm 14	610	49	35 \pm 13
Alcohol	229	36	38 \pm 14	90	15	32 \pm 12	319	26	36 \pm 13
Sobredosificación	40	7	44 \pm 19	52	8	43 \pm 21	92	7	43 \pm 20
Drogas	167	26	29 \pm 8	52	9	28 \pm 9	219	18	29 \pm 8
Total voluntarias	631	100	35 \pm 13	609	100	34 \pm 14	1.240	100	35 \pm 14
Accidentales									
Acc. laborales	47	40	39 \pm 13	10	7	37 \pm 8	57	22	39 \pm 13
Acc. domésticos	69	60	41 \pm 19	136	93	47 \pm 20	205	78	45 \pm 20
Total accidentales	116	100	40 \pm 18	146	100	47 \pm 20	262	100	44 \pm 19
Otras	4			2			6		36 años
TOTAL	751			757			1.508		




Fig. 2. Distribución por grupos de edad IAVIS, IAVD e IAVE.




Fig. 3. Distribución por grupos de edad IAV e IAA.

alcohólicas (error estándar: 1,53, $p < 0,001$), y las IAV por drogas $p < 0,05$, pero no en los restantes subgrupos.

—Intoxicaciones accidentales (IAA) (42/100.000 habitantes). Los datos sobre edad y género se exponen en la tabla I y figura 3.

TÓXICOS IMPLICADOS

—Medicamentos: tóxico único en 540 casos (36%) en el grupo general, que asciende hasta el 74% en los intentos de suicidio (IS) (81% en las mujeres y 59% en los hombres). Los fármacos, su reparto conforme a los diferentes grupos terapéuticos y la incidencia según el género pueden verse en la tabla II. Promedio de fármacos por presentación farmacéutica: 1,05.

- No medicamentos: 811 casos 54% (Tabla III).
- Asociaciones de ambos 154 casos (10%) (Fig. 4).
- Desconocido: 4 casos, 0,2%.




Fig. 4. Tóxicos: repartos según fármacos, no fármacos y ambos.

DISTRIBUCIÓN EN EL TIEMPO

Ni el conjunto de la serie, ni los diferentes subtipos muestran diferencias significativas entre los días de la semana ni los meses del año.

Antecedentes: un 88% de los pacientes con IS fueron valorados por un psiquiatra en la Urgencia, obteniéndose 448 antecedentes, todos se enumeran en la tabla IV.

TABLA II

TÓXICOS IMPLICADOS: MEDICAMENTOS, GÉNERO Y TIPO DE INTOXICACIÓN

Tóxicos: medicamentos	Total	Hombre	Mujer	IAVIS	IAVE	IAVD	IAVSD	IAAD
Benzodiacepinas	541	180	361	459	8	13	60	1
Antidepresivos	139	40	99	125	-	-	13	1
Neurolepticos	51	20	31	45	-	-	6	-
Barbitúricos	6	1	5	4	1	-	1	-
Otros psicofármacos	19	8	11	16	-	1	1	1
<i>Total psicofármacos</i>	<i>756</i>	<i>249</i>	<i>507</i>	<i>649</i>	<i>9</i>	<i>14</i>	<i>81</i>	<i>3</i>
Paracetamol	36	12	24	32	-	-	4	-
Salicilatos	8	3	5	6	-	-	2	-
Otros analgésicos	62	21	41	55	-	1	6	-
AINE	50	13	37	46	1	-	3	-
<i>Total analgésicos</i>	<i>156</i>	<i>49</i>	<i>107</i>	<i>139</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>15</i>	<i>-</i>
Otros fármacos	199	73	126	171	-	4	21	3
Totales	1.111	371	740	959	10	19	117	6

TABLA III

TÓXICOS IMPLICADOS: NO MEDICAMENTOS

Tóxicos: no medicamentos	Nº casos	%
Alcohol	560	49
Cocaína	194	17
Heroína	25	2
Cannabis	35	3
Anfetaminas	24	2
Metadona	6	0,5
LSD	-	-
Pegamento	2	0,1
GHB	2	0,1
Ketamina	1	0,1
Otras drogas/no definidas	12	1
Gases	101	9
Cáusticos	110	9,6
Otros tóxicos	76	6,6
Totales	1148	100

DISCUSIÓN

—*Incidencia*: con respecto al 2000 (6) aumentan tanto el número de urgencias (10,5%) como el de IA (33,7%) pero la χ^2 no muestra asociación entre ambos $p < 0,001$. No hemos encontrado publicaciones que avalen este crecimiento. La incidencia actual (234‰ habitantes y año) es un 34% mayor que la precedente (170‰) (6) y supera a todas las publicadas en nuestro país (24,33,38,42) pero admitimos que este cotejo puede no ser muy real. Confrontar la incidencia con otras series es tarea difícil porque los diferentes autores recogen grupos de IA no homogéneos y más o menos selectivos (40) (IS sólo por medicamentos, intoxicaciones alcohólicas incluidas o no drogas, edad pediátrica, etc.); en otras ocasiones el censo sanitario es confuso y por último, en este tipo de trabajos, obligatoriamente retrospectivos, existe el posible sesgo de una recogida incompleta de casos. La población cubierta por el Hospital Universitario 12 de Octubre, según la Memoria 2004 (41) es 536.450 usuarios, pero si tenemos en cuenta que los Servicios de Urgencia hospitalarios atienden un número no desdeñable de personas no adscritas, que en esta serie se cuantifica entorno a un 20%, debemos concluir que nuestra población cubierta real es de 643.740 personas.

—*Edad y género*: al igual que en las últimas cuatro series (4-7) no hay diferencia de género, ni considerado el

conjunto de las IA, ni con la población de referencia, ni tampoco en las IAV o las IAA en su conjunto. Pero tanto en las IAVIS, IAVE, IAVD, como IAAD o IAAL sí que hay diferencia significativa de género tanto en la comparación con el Censo del Área (48) como, lógicamente, con el grupo general ya que entre ellos no difieren. Lo mismo cabe decir cuando estudiamos los repartos por grupos de edad en los diferentes tipos de IA.

—*IVAVIS*: 610 casos (95‰) 40% del total (81% de las mujeres, 59 de los hombres). En los 25 años que hemos estudiado las IAVIS (1-7) los casos han aumentado en ambos sexos, tanto, que en este año, representan casi el doble de 1990 (3) y este crecimiento es mayor que el experimentado por el conjunto de las IA (de 851 a 1.508 -177%- $\chi^2 = 44,4 p < 0,001$). Esta incidencia es muy superior a las publicadas en los últimos diez años (4-6) pero podría ser una tendencia reciente. En un estudio evolutivo, similares al nuestro, Rygnestad (16) observa un declinar entre 1987 y el 2002 tanto en hombres como en mujeres, pero la OMS (12) alertó de un previsible crecimiento.

—*Tóxicos en IAVIS*: 1.144 tóxicos se han visto involucrados en estos 610 casos, lo que supone un promedio de 1,87. Algo mayor que otras publicadas (43) Los medicamentos estuvieron implicados en el 84% de las IAVIS, es habitual que predominen y más en una zona geográfica como la nuestra, urbana con muy poco peso rural (8,11-13,16,17). Los psicofármacos están implicados en el 57% de las IAVIS y en el 33% de toda la serie. Entre ellos las más usuales son las benzodiazepinas con el 48% de toda la serie y el 70% de las IAVIS, la mayoría de los autores avalan estos datos (18,37-40). El uso de medicamentos en las IAVIS reflejan el consumo de esos medicamentos (14,21-23,43). En España, al igual que en la mayoría de los países industrializados, el consumo de tranquilizantes ha experimentado un importante aumento desde 2002, en torno al 5% anual hasta el 2005, momento en que se modera ligeramente (45). Las recetas extendidas a mujeres duplican las de los hombres y ellas entre los 45 y 64 años son las máximas consumidoras (45). De acuerdo con estos datos el consumo de tranquilizantes habría crecido un 25% en el intervalo del estudio actual 2000-4. Sin embargo en nuestro estudio el crecimiento supera el 50% (pasa de 302 casos a 459) las mujeres fueron más proclives con casi las 3/4 partes También los IS con benzodiazepinas crecieron en otros países: 20% en 1978, 39 en 1987 en Noruega (17) aunque en este caso unos años más tarde bajaban hasta el 20%. Un debate clásico (11,21,22,46,47) hacía pensar que aumentarían los antidepresivos y disminuirían los tranquilizantes, pero no parece cumplirse (24,47). Dentro del grupo de psicotropos,

TABLA IV

TÓXICOS IMPLICADOS: MEDICAMENTOS, GÉNERO Y TIPO DE INTOXICACIÓN

Tóxicos: medicamentos	Total	Hombre	Mujer	IAVIS	IAVE	IAVD	IAVSD	IAAD
Depresión	249	71	178	195	16	9	28	1
Ansiedad	52	14	38	34	11	-	6	1
Drogadicción	128	96	32	38	8	75	7	-
Alcoholismo	154	119	35	36	92	19	7	-
Miscelánea	118	46	72	78	18	7	14	1
I. previo suicidio	72	23	49	67	2	1	2	-
Total antecedentes	773	369	404	448	147	111	64	3

los antidepresivos ocupan el segundo lugar con el 18% lo que representa un aumento con respecto al 12% de los años anteriores (4-6) y a otros publicados en IS (30,37,48). El tratamiento antidepresivo puede disminuir los IS (8,9,11) aunque no está suficientemente estudiado. Los ISRS parecen haber sustituido a los tricíclicos sin que hayamos observado diferencia de género. Los restantes psicofármacos: neurolépticos, barbitúricos y otros, sólo suponen el 10% de este grupo. El grupo de analgésicos (14%) aumenta un 20% con respecto a 2000 (6) sobre la base del aumento cada uno de sus componentes y más concretamente los no narcóticos; el paracetamol asciende hasta el 23% de los analgésicos permaneciendo aún muy lejos del 43% en el Reino Unido (11); Aspirina® y AINE se mantienen y los restantes se diversifican con varios casos de adyuvantes y miorrelajantes. Los analgésicos narcóticos menores están poco representados. *No Fármacos (NF)*: En 1979 (1) sólo un 0,2% de los IAVIS fueron por NF, en 2004, son el 7%. El origen es la creciente influencia del rol masculino, pues mientras el 81% de las mujeres usan fármacos únicamente, los hombres solos en el 59% de modo antitético; 13% de los hombres usaron NF solos en su IAVIS, frente al 4% de las mujeres. El uso de asociaciones de fármacos y no-fármacos es también un modo de actuación masculino ($p < 0,001$). Es más, las mujeres usan tanto los fármacos que aunque los asocien y se tenga en cuenta esta asociación también existe diferencia significativa con los hombres (como hemos dicho, ellos usan más asociaciones y parten de un número menor de fármacos). De los IAVIS por NF destaca el etanol, con un 21% de los casos (solo o asociado); las drogas en un 5% y los restantes venenos 3,6% (4 casos de IS con gases, 10 con cáusticos y los 8 restantes corresponden al grupo de miscelánea. Un 24% de los IS utilizaron asociaciones de F y NF, cifra intermedia respecto al 20% publicado por Duce y cols. (43) y al 36% de Verstraete y Buylaert (57). Un 80% de estos casos incluían alcohol como NF, en línea con otros estudios (37). Un 20% restante ha sido drogas y venenos tradicionales. La vía oral ocupa el 95% de los casos, respiratoria en un 4% y parenteral en sólo 5 casos. No falleció ningún paciente de las IAVIS en este año. La mortalidad, al menos hospitalaria, de este tipo de IA es baja o nula (12,14,16,17,23,46) según los estudios. La mortalidad extrahospitalaria ha sido poco estudiada en nuestro país, pero si nos atenemos a los datos publicados por Lardeur y cols. (42) entre los años 97-99 encontró un 1% en Vienne (Francia). *Tipología de las IAVIS*: Se han recogido 448 antecedentes, cifra mayor que otras publicadas (17,20,54). En la valoración psiquiátrica (realizada al 88% sin diferencia de sexo) durante el ingreso se diagnosticó depresión al 32% de los pacientes con IAVIS, las tres cuartas partes mujeres, como es habitual, por otra parte ya que en ellas los antecedentes psiquiátricos más comunes son los trastornos emocionales y adaptativos (49). El 11% admitieron intentos previos, cifra muy inferior a los 18 habituales (5,6) y a otras publicadas (25), pero este año tenemos el triste récord de un paciente con trece intentos previos. Las toxicomanías, tanto alcohol como drogas, en los varones son un importante factor de riesgo para el IS (61-63) y lo mismo cabe decir de la esquizofrenia (49), en la presente serie 24% eran adictos a drogas o alcohol. Está establecido que el 40% de los alcohólicos lo intentan (52-53) y es más frecuente en los mayores de 50 años que viven solos, parados, y con aislamiento social (60,61). La modificación de estos factores pueden ser considerados factores protectores frente al suicidio de los alcohólicos (53,54). Trece de los IAVIS se pro-

dujeron en pacientes con trastorno alimentario, la misma cantidad que de esquizofrenia o trastornos adaptativos. Además embarazo, ludopatía o malos tratos son circunstancias a tener en cuenta junto con las patologías orgánicas, como la diabetes. *Destino de los IS*: 1% ingresó en planta y 2% en UCI (9 mujeres y 2 hombres) frente al 1% de la serie general, pero los ingresos por IAVIS han supuesto el 61% de los ingresos en UVI por IA. No hubo fallecimientos. Un 20% no pertenecían al área de influencia del hospital.

—*IAVE*: 49,6‰ 319 casos, 70% no bebedores. *Edad y género*: Es una IA típicamente masculina (20) (72%) y significativamente ($p < 0,001$) diferente del Censo (41). Su número disminuye un 15% con respecto a nuestra última serie (6) disminución que venía ocurriendo desde 1997(4) con una pérdida acumulada de 103 casos (30%). La mejor asistencia prehospitalaria, seguramente justifica la reducción de las IAVE hospitalarias ya que según el trabajo de Arnal y cols. (51) sólo trasladan a un centro hospitalario al 42,6% de los atendidos por SAMUR-PC. Este descenso se viene produciendo por reducción de varones, mientras que los casos en mujeres se mantienen, aunque no significativa. Las medias de edad no difieren de la serie general, pero los hombres son ahora algo más jóvenes, con lo que las cifras se sitúan por debajo de 1997 (4) y 2000 (6). Al igual que ocurría con el número, también se mantiene la edad en mujeres, que son tradicionalmente más jóvenes que los hombres en la IAVE. Desde 1994 (4) el número de IAVE en el grupo de edad más joven disminuye progresivamente en hombres, mientras que aumenta en mujeres. Se han recogido 5 casos de alcohólicos menores de 25 años sin diferencia de género, edad temprana para lo que se considera habitualmente (52), quizás por la influencia del “botellón”. En el grupo de alcohólicos encontramos menos casos de depresión, ansiedad, drogadicción e intentos previos de suicidio que entre los no alcohólicos pero la diferencia no es significativa y esto parece habitual (53,54). No hubo fallecimiento ni tampoco ingresos en UVI. La gravedad de los casos lógicamente es mayor con el mejor filtrado prehospitalario (51) pero este tratamiento extrahospitalario también mejora el resultado de la Urgencia. Rechazaron asistencia prehospitalaria urgente un 21% (51) y en nuestro Centro un 12% fueron altas voluntarias. Una vez más hay diferencia numérica, no estadística, en la frecuentación según los días y en la comparación de alcohólicos y no alcohólicos

—*IADV*: 34‰ habitantes. En el año 2004 duplican las del 2000 (6) y superan en cuatro veces las de 1994 (4) y casi alcanzan los datos de 1990 (3) cuando el *boom* de la heroína (21,33) en España. Han pasado de ser el 2% de las IAV en el 79 (1) o 12% en el 2000 (6) al 15% de todas las voluntarias. Es conocido el elevado consumo de drogas en nuestro país, aparentemente el mayor de Europa. *Edad y género*: La edad de las mujeres es significativamente menor que en las restantes IA. (1-6). Al igual que las IAVE las intoxicaciones agudas por drogas son de predominio masculino, crece un 100% con respecto a los valores de 2000 (6) (167 frente a 83) y parece concluir el mayor crecimiento del género femenino de años anteriores, aunque la evolución en estos 25 años ha sido 2; 42;13;19;33;52 casos. *Tóxicos*: La heroína ha sido la causa de las 2/3 de los ingresos por drogas en urgencias. En la publicación anterior (6) pronosticábamos el aumento de la MDMA y en efecto, ha pasado de cinco casos en 1997 (5) y catorce en el 2000 (6) a los veintidós actuales. Aparecen nuevas drogas, como el pegamento, sin duda efecto de la inmigración, que

también aporta sus tóxicos; la GHB, éxtasis líquido o ketamina ya descrita en Barcelona por Espinosa y cols. en el 2001 (57) de la que hasta ahora no habíamos recogido ningún caso, por lo que debe haber diferencias locales. Cuatro casos no pudieron ser etiquetados por la dispersión de contenidos de las pastillas ilícitas. La media de tóxicos consumidos en las IAVD fue de 1,8, lo que supone que casi todos los pacientes habían mezclado más de un elemento (40 alcohol, 16 medicamentos y 20% mezclas de drogas). Algo más de un tercio de los pacientes intoxicados reconocieron ser adictos a las drogas (43% si sumamos drogas y alcohol) y el resto eran consumidores accidentales o negaban su adicción, esta misma proporción se ha encontrado en las IAVE por lo que aproximadamente dos tercios de los que se intoxican con alcohol o drogas serían consumidores más o menos recientes y por tanto toxicómanos potenciales. La valoración psiquiátrica permitió encontrar nueve casos de depresión y un intento previo de suicidio. El destino de los pacientes intoxicados por drogas fue: alta previa valoración psiquiátrica 15% y tres ingresaron en UVI, por lo que las drogas causaron el 17% de los ingresos en UCI. 23 casos alta voluntaria sin concluir estudio, situación bien conocida en las salas de urgencias y en la asistencia pre-hospitalaria

—IAVSD 14‰: en el año 2004 hay 92 casos, su número crece cada año y así en 1997 (5) fueron 37 y 55 en el 2000 (6) pero este crecimiento es menor que el de la serie general de modo significativo. Es un colectivo en el que predominan las mujeres pero sin diferencia significativa con respecto al grupo Censo χ^2 y sí de las IAVIS χ^2 de las que se diferencia. Las edades medias son algo superiores a la media general y hay casos desde los 15 a los 97 años. Los tóxicos que las causan son ansiolíticos en las dos terceras partes, analgésicos 11% y un grupo de varios 16%. Destacar trece pacientes que sobredosificaron antidepresivos y 15 que añadieron alcohol a sus medicamentos. Se solicitó valoración psiquiátrica en un tercio encontrando 28 casos de depresión. En este colectivo había también siete alcohólicos, 7 drogadictos, cuatro demencias y psicopatías y otras tantas enfermedades orgánicas como EPOC, gota o hipertiroidismo. Un paciente precisó ingreso en UVI. Las IAVSD tiene características propias y no se aseme-

jan a las restantes IAV ni a las IAA y es frecuente que haya variaciones poco explicables en las series que componen VEIA Este grupo quizás refleje la menor tolerancia de las personas al “malestar” (el insomnio ha sido el síntoma más habitual a resolver); pero también el desconocimiento de los fármacos como en el caso que se sobredosificó heparina o bien los que mezclan medicamentos para potenciar su efecto (1,4 de promedio, 1,9 en los IS)

—IAA: representan sólo el 17% del total de la serie con 262 casos 41‰. Un paciente de cada tipo de accidente precisó ingreso en UVI. La mayoría (78%) son accidentes domésticos. Es habitual el predominio femenino en este tipo de IA pero en esta ocasión la diferencia no es significativa. Y tampoco es significativa la diferencia al comparar el reparto de edades aunque sea apreciablemente mayor a las de las IAV —media 44 ± 19 frente a 35 ± 14 las voluntarias.

—IAAD: accidentes domésticos 205 de los cuales 136 son mujeres y esa diferencia es significativa con respecto a la serie general. Existe una distribución de los casos con respecto a la edad bimodal como ya hemos descrito con anterioridad (3-5). Gases y cáusticos son la mayoría quedando un 25% que se reparte entre medicamentos, alcohol y un resto muy variado.

—IAAL: se atendieron 47 hombres y 10 mujeres, la mayoría por gases de combustión y cáusticos. Son más jóvenes que los pacientes por accidentes domésticos.

Queda por ultimo un grupo de 6 pacientes que no hemos podido etiquetar correctamente dentro de los epígrafes anteriores Uno de ellos es un “body packet” al que no podemos identificar como voluntario ni accidental exclusivamente, nosotros no habíamos tenido ningún caso por que estas personas una vez detectadas en la aduana de Madrid son llevadas al HGM que es el hospital de referencia Villalba et al han publicado su dilatada experiencia de 445 casos (58) Este caso podría hacer pensar que existe trafico de este modo también para movimientos dentro del país. Un segundo caso se produjo al ingerir un preso unas pilas para poder salir de la cárcel, a otro en un atraco le obligaron tomar metadona y a otro le dieron una benzodiazepina sin que lo supiera también con fines delictivos. Los dos restantes tomaron por error medicamentos o dosis equivocadas.

Bibliografía

- Caballero PJ, Dorado MS, Alonso F. Intoxicación aguda: estudio de 673 casos. *Med Clin (Barc)* 1981; 77: 139-45.
- Caballero PJ, Gutiérrez F, Dorado MS. Epidemiología de la intoxicación aguda: Estudio comparativo 1979-1985 en el área sur de la Comunidad Autónoma de Madrid. *Rev Clin Esp* 1987; 181: 334-9.
- Dorado MS, Álvarez R, Caballero PJ, Medina J, Casanova C, Granado JA. Epidemiología de la intoxicación aguda: Estudio de 815 casos habidos en 1990 en el área sur de la Comunidad de Madrid. *Rev Clin Esp* 1992; 191: 131-6.
- Dorado MS, Martín J, Sabugal G, Caballero PJ. Epidemiología de la intoxicación aguda: estudio de 613 casos habidos en 1994 en el área sur de la Comunidad de Madrid. *Rev Clin Esp* 1996; 196: 150-6.
- Caballero PJ, Dorado MS, Brusint B, Jerez B, Medina M. Vigilancia epidemiológica de la intoxicación aguda 1997 (estudio de 1.140 casos del área sur de la Comunidad de Madrid). *Rev Clin Esp* 1999; 199: 424-30.
- Caballero PJ, Dorado MS, Jerez B, Medina M, Brusint B. Vigilancia epidemiológica de la intoxicación aguda en el área sur de la comunidad de Madrid: Estudio Veia 2.000 An Med Interna (Madrid) 2004; 21: 62-8.
- Dorado S. Variaciones epidemiológicas en las intoxicaciones agudas voluntarias atendidas en el hospital Doce de Octubre de Madrid desde 1979-1994. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid; 1998.
- Muñoz J y Guerrero JE. Intoxicaciones: panorama actual: *Rev Clin Esp* 1996; 196: 141-2.
- McEvedy CJ. Trends in self-poisoning: Admissions to a central London hospital, 1991-1994. *J R Soc Med* 1997; 496-8.
- Settimi L, Davanzo F, Carbone P, Sesana F, Locatelli C, Farina ML, et al. Surveillance of toxic exposures: the pilot experience of the Poison Control Centers of Milan, Pavia and Bergamo in 2006. *Ann Ist Super Sanita* 2007; 43: 287-94.
- Bialas MC, Reid PG, Beck P, et al. Changing patterns of self-poisoning in a UK health district. *Q J M* 1996; 89: 893-901.

12. Schmidtke A, Bille-Brahe U, De Leo, et al. Attempted suicide in Europe: Rates, trends and sociodemographic characteristic of suicide attempters during the period 1989-1992. Results of the WHO/EURO Multicentre Study on parasuicide. *Acta Psychiatr Scand* 1996; 93: 327-38.
13. Kelly CB, Weir J, Rafferty T, Galloway R. Deliberate self-poisoning presenting at a rural hospital in Northern Ireland 1976-1996: relationship to prescribing. *Eur Psychiatry* 2000; 15: 348-53.
14. Carvajal A, Bachiller A, Rallo R, García L. Intoxicaciones agudas en Valladolid. Estudio epidemiológico de los casos atendidos en el Hospital Clínico desde 1978 a 1984. *Med Clin (Barc)* 1987; 88: 135-9.
15. Tejedor MC, Díaz AM, Álvarez E, Castellón JJ, Pericay JM. Intento de suicidio: Cambios epidemiológicos entre 1969 y 1996. Estudio retrospectivo de 1.150 casos. *Actas Esp Psiquiatr* 1999; 27: 292-7.
16. Rynnestad T y Faberhaug O. Acute deliberate self-poisonings in the area of Trondheim 1978-2002. *Tidsskr Nor Laegeforen* 2004; 124: 2736-9.
17. Dieserud G, Loeb M, Ekeberg O. Suicidal behaviour in the municipality of Baerum, Norway: A 12-year prospective study of parasuicide and suicide. *Suicide Life Threat Behav* 2000; 30: 61-73.
18. Rodríguez M A, Barrio G, De la Fuente L, et al. Urgencias relacionadas con el consumo de drogas, alucinógenos y anfetaminas atendidas en quince hospitales españoles durante 1994. *Rev Clin Esp* 1997; 197: 804-9.
19. Caballero PJ, Dorado MS. Factores epidemiológicos de la intoxicación. *Medicine (Madr)* 1980; 59: 3691-9.
20. Woolfenden S, Dossetor D, Williams K. Children and adolescents with acute alcohol intoxication/self-poisoning presenting to the emergency department. *Arch Pediatr Adolesc Med* 2002; 156: 345-8.
21. Crombie IK, McLoone P. Does the availability of prescribed drugs affect rates of self poisoning? *Br J Gen Pract* 1998; 433: 1505-6.
22. Carlsten A, Allebeck P, Brant L. Are suicide rates in Sweden associated with changes in the prescribing of medicines? *Acta Psychiatr Scand* 1996; 94: 94-100.
23. Fleischmann A, bertolote JM, De Leo D, Phillips M, Sisask M, Vijayakumar L, et al. Characteristics of attempted suicides seen in emergency-care settings of general hospitals in eight low- and middle-income countries. *Psychol Med* 2005; 35: 1467-74.
24. Mairata S, Morey A, Ladaria A, Ballesteros JA, De la Calle F. Intoxicación medicamentosa aguda voluntaria. Estudio epidemiológico en Mallorca. *Rev Clin Esp* 1981; 163: 307-10.
25. Palop R, Morales FJ, Rodríguez C, Esplugues J. Intoxicaciones agudas y reacciones alérgicas medicamentosas. Estudio de 532 casos. *Med Clin (Barc)* 1984; 82: 651-55.
26. Bundo M, Fandós JM, Diez J, Ferrán M, Mundet X, Ibáñez L. Intoxicación voluntaria farmacológica en Barcelona: 110 casos. *Atención Primaria* 1987; 4: 402-6.
27. Fuentes J, García-Galán A, Muñoz JR, et al. Intoxicaciones agudas en la unidad de urgencias de un hospital general. *Arch. Fac Med Zaragoza* 1990; 1: 27-30.
28. Pascual A, Fuentes F, Castellano M, Ferrer A, López A. Estudio epidemiológico de las intoxicaciones agudas en la población de Zaragoza. *An Med Interna (Madrid)* 1992; 9: 381-5.
29. Arruga C, Almirall J, Bassa J, Balanzó X. Intoxicaciones agudas en un hospital comarcal. *Med Clin (Barc)* 1992; 98: 117-8.
30. Cabo M, Martí JB, Miralles S, Martí JL. Etiology of intoxication: A study of 557 cases. *Eur J Epidemiol* 1993; 4: 361-7.
31. Bajo A, Santos ME, Sanz F, et al. Estudio epidemiológico sobre intoxicaciones agudas y dotaciones de botiquines de antidotos. *An Med Interna (Madrid)* 1999; 16: 285-9.
32. Carpintero JM, Ochoa FJ, Ruiz JI, Bragado L, Palacios G, Ramallegómar E. Prevalencia de las intoxicaciones agudas en Urgencias de La Rioja. *Emergencias* 2000; 12: 92-7.
33. Palazón C, Segura J, Renedo A, Palazón EL, Pardo JC, Felices F. Intoxicaciones agudas graves en un Servicio de Medicina Intensiva 1986-1997. *Rev Esp Salud Pública* 2000; 74 (1).
34. Roca de Togores A, Rubio P, Sánchez P, Rodríguez D, Villar A. Intentos de suicidio atendidos en un centro de salud. *Atención Primaria* 2002; 29: 547-52.
35. Bugarín RR, Galego P, Fernández JL, Mariño AS Consideraciones acerca del tratamiento de las intoxicaciones agudas en Atención Primaria. *MEDIFAM* 2002; 12: 247-59.
36. Marín Lozano, et al. Tentativas de suicidio en la urgencia del hospital general: un estudio epidemiológico y clínico. *An Psiquiatría (Madrid)* 1995; 1: 259-63.
37. Duce S, López E, Navas V, et al. Intoxicaciones medicamentosas voluntarias atendidas en un Servicio de Urgencias. *Emergencias* 1998; 10: 225-33.
38. Bugarín R, Galego P, Gude F, García A, Galban C. Estudio de las intoxicaciones etílicas agudas en un servicio de urgencias. *An Med Interna (Madrid)* 2000; 17: 588-91.
39. Carpintero JM, Ochoa FJ, Ruiz JI, Bragado L, Palacios G, Ramallegómar E, et al. Prevalencia de las intoxicaciones agudas en Urgencias de La Rioja. *Emergencias* 2000; 12: 92-7.
40. Riquelme A, Burillo-Putze G, Jiménez A, Hardisson A. Epidemiología global de la intoxicación aguda en un Área de Salud. *Aten Primaria* 2001; 28: 506-6.
41. Anónimo: Memoria 2004. Edita Hospital Universitario 12 de Octubre. www.h12o.es
42. Lardeur JY, Compain C, Baudier D, Baudier: Régulation et prise en charge des intoxications volontaires par un service d'aide médicale d'urgence (Pre-hospital emergency management of self-poisoning). *Press Med* 2001; 30: 626-30.
43. Palazzolo J, Favre P, Julerot JM, Bougerot T. Caractéristiques des patients hospitalisés dans un centre hospitalier spécialisé après une tentative de suicide (About volunteer medicinal intoxication admitted in specialized hospital): *Encephale* 2002 28: 39-50.
44. Beck P, Lazarus J, Scorer R, Smith P, Routledge P. Increasing rate of deliberate self poisoning. *B M J* 1994; 308: 789.
45. Rayón P, Montero D, Santamaría B, Madurga M, De Abajo FJ. Benzodiazepine consumption in Spain. *Eur J Clin Pharmacol* 1997; 52: 321-3.
46. McLoone P, Crombie IK. Hospitalisation for deliberate self-poisoning in Scotland from 1981 to 1993: Trends in rates and types of drug used. *Br J Psychiatr* 1996; 169: 81-5.
47. Carlsten A, Waern M, Allebeck P. Suicides by drug poisoning among the elderly in Sweden 1969-1996. *Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol* 1999; 609-14.
48. Blanc PD, Jones MR, Olson KR. Surveillance of poisoning and drug overdose through hospital discharge coding, poison control center reporting, and the Drug Abuse Warning Network. *Am J Emerg Med* 1993; 11: 14-9.
49. Hidalgo Rodrigo MI, Santiago Guervos M, García Serna B, González Manjavacas C. Las conductas autoagresivas en el servicio de urgencias. *Aten Primaria* 1995; 15: 412-3.
50. Verstraete AG y Buylaert WA. Survey of patients with acute poisoning seen in the Emergency Department of the University Hospital of Gent between 1983 and 1990. *Eur. J Emerg Med* 1995; 4: 217-23.
51. Arnal D, Bernardino M, León JA, Velayos C, Gómez JC, Gilarranz JL. Atención por intoxicación etílica en un Servicio de Emergencia Médica prehospitalario en Madrid. *Emergencias* 1998; 10: 381-7.
52. Del Río Mc. Consumo de alcohol y problemas relacionados con el alcohol en España. *Jano* 1998; 54: 197-203.
53. Sher L. Risk and protective factors for suicide in patients with alcoholism. *ScientificWorld Journal*. 2006; 6: 1405-11.
54. Soukas J, Lönnqvist J. Suicide attempts in which alcohol is involved: A special group in general hospital emergency rooms. *Acta Psychiatr. Scand* 1995; 91: 36-40.
55. Carter GL, Whyte IM, Ball K, et al. Repetition of deliberate self-poisoning in an Australian hospital-treated population. *Med J Aust* 1999; 170: 307-11.
56. Kapur N, House A, Creed F, Feldman E, Friedman T, Guthrie E. General hospital services for deliberate self-poisoning: An expensive road to nowhere? *Postgrad Med J* 1999; 888: 599-602.
57. Espinosa G, Miró O. Intoxicación por éxtasis líquido: estudio de 22 casos. *Med Clin (Barc)* 2001; 117: 56-8.
58. Gómez Antúnez, Cuenca C, Farfán A, Villalba MV, Del Toro J, García J. Complicaciones en transportadores intestinales de paquetes con cocaína. Estudio de 215 casos. *Med Clin (Barc)* 1998; 111: 336-7.