Hernia vesical inguinoescrotal detectada en rastreo gammagráfico

J. Cortés Hernández, J. Extramiana Cameno, J.I. Alonso Colmenares, S. Álvarez Ruiz,
M^a P. Alcorta Armentia

Servicios de Medicina Nuclear y Urología. Hospital Santiago Apóstol. Vitoria.

Actas Urol Esp 29 (3): 338

Varón de 73 años diagnosticado de adenocarcinoma de próstata (grado 4 de Gleason) clínicamente T1cN0M0, al que se le realiza un rastreo óseo gammagráfico (Tc^{99m} -hidroximetilendifosfonato 25mCi/925MBq). Como antecedente personal destacable es portador de una prótesis coxofemoral derecha. El rastreo isotópico muestra una gran acumulación patológica de orina radiomarcada en hemiescrotal derecho, no existiendo alteraciones destacables a nivel óseo. La exploración física pone de manifiesto la existen-

cia de una hernia inguino-escrotal derecha de gran tamaño. Ante la sospecha de una herniación inguinal de la mayor parte de la vejiga se realiza una cistografía miccional que confirma el diagnóstico.

Dr. J. Cortés Hernández
Servicio de Medicina Nuclear
Hospital Santiago Apóstol
Olaguibel, 29
01004 Vitoria (Álava)