Fístula uretero-uterina

E. Mallén Mateo, C. Sancho Serrano, P. Serrano Frago, M. Allúe López,
A. Marco Valdenebro. R. Espilez Ortiz

Servicio de Urología. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

Actas Urol Esp 2006; 30 (2): 235

Mujer de 27 años de edad. Tras 32 semanas de gestación gemelar se le practica cesárea. Al tercer día postoperatorio comienza con síndrome febril y molestias lumbares izquierdas que ceden con tratamiento antibiótico y analgésico.

En la segunda semana postintervención comienza con incontinencia vaginal.

En primer lugar se descarta fístula vesicovaginal introduciendo azul de metileno en vejiga. Posteriormente se realiza UIV, observando ureterohidronefrosis izquierda con paso filiforme en cabo distal atrapado hacia cavidad uterina, sugestivo de fístula uretero-uterina.

Se intentó cateterismo ureteral sin conseguir paso de catéter ni guía por trayecto ureteral, por lo que se colocó nefrostomía percutánea como derivación. Permittiéndonos así la opacificación y corroboración del diagnóstico.

A las tres semanas se realiza reimplantación ureterovesical según técnica de Leadbetter-Politano y vejiga psoica, permaneciendo la paciente totalmente asintomática.

FIGURA 1

Dra. E. Mallén Mateo

San Antonio M^a Claret, 66 2^ºI - 50005 Zaragoza

E-mail: evamallen@mixmail.com

(Trabajo recibido el 13 de mayo 2005)