Litiasis en ureteroceles

Álvarez Múgica M*, Jalón Monzón A*, González Álvarez RC*, Bulnes Vázquez V**,
Escaf Barmadah S*, Fernández Gómez JM*.

*Servicio de Urología I. **Servicio de Radiodiagnóstico I. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

Actas Urol Esp 2006; 30 (6): 647

Mujer de 74 años, sin antecedentes urológicos previos, ingresada de urgencia por cuadro de cólico renoureteral izquierdo complicado, por lo que se realizó un scanner de urgencia (Fig. 1) que evidenció un gran cálculo en uréter distal izquierdo, procediéndose a colocación de nefrostomía izquierda. Tras superar la fase aguda, se le realizó una pielografía descendente a través del catéter de nefrostomía, observándose un cálculo de 2,2 cm en el interior de un ureteroceles izquierdo (Fig. 2).

Para la resolución del cuadro se procedió a la extracción de la litiasis mediante cirugía endoscópica (Figs. 3 y 4).

Dr. M. Álvarez Múgica
Servicio de Urología I.
Hospital Universitario Central de Asturias
Celestino Villamil, s/n
33006 Oviedo (Asturias)
E-mail: malvarez79@mixmail.com

(Trabajo recibido el 27 de julio 2005)

FIGURA 1. Excisión endoscópica sobre ureteroceles y extracción de litiasis de su interior.

FIGURA 2. UIV: imagen en "cabeza cobra" con cálculo en su interior.

FIGURA 3. Excisión endoscópica sobre ureteroceles y extracción de litiasis de su interior.

FIGURA 4. Litiasis de 2,2 cm extraída.