Quiste hidatídico renal

Ballesteros Sampol JJ

Servicio de Urología. Hospital Nuestra Señora de la Esperanza. Barcelona.

Actas Urol Esp. 2006;30(9):967

La localización renal del quiste hidatídico sólo se presenta en el 2%-3% de todas las hidatidosis. Es, pues, afección poco frecuente y con tendencia a disminuir en los países desarrollados aunque pueden existir zonas más o menos endémicas en las que no ha sido posible la erradicación como en nuestra cuenta del Ebro donde la incidencia epidemiológica alcanza una 10,6/100.000 h.

Nuestra experiencia se limita a 2 casos vividos en la década de los 80. Exponemos las imágenes

de su diagnóstico radiológico por UIV (Figs. 1 y 2), la pieza operatoria (cellectomía renal) (Fig. 3) y el característico aspecto al corte con la cavidad quística y las típicas vesículas (Fig. 4).

Dr. J.J. Ballesteros Sampol

Bori i Fontestà, 43 - 8º 2ª

08017 Barcelona

E-mail: jballesteros@imas.imim.es

(Trabajo recibido el 12 de diciembre de 2005)

FIGURA 1. Radio simple de abdomen con imagen quística calcificada.

FIGURA 2. U.I.V. El quiste ocupa el hemirriñón inferior del RI.

FIGURA 3. Pieza de "cellectomía" renal como si se tratara de un tumor renal.

FIGURA 4. La misma pieza abierta con la cavidad quística repleta de vesículas.