

Hernia vesical

Rijo Mora EA, Vallmanya Llena FR, Hernández Pozo H, Del Canto Aguirre M, Lorente Garín JA, Gelabert Mas A.

Servicio y Cátedra de Urología. Hospital del Mar. Universidad Autónoma de Barcelona.

Actas Urol Esp. 2007;31(8):938

Varón de 67 años remitido al Servicio de Urología por masa escrotal indolora de larga evolución. El paciente refería micción en dos tiempos

- a) espontánea
- b) a la compresión escrotal.

Exploración física: Aumento de tamaño de hemiescrotal derecho por hernia inguino-escrotal. Tras la manipulación del saco herniario el paciente refirió necesidad de micción. Se realizó cistografía (Fig. 1) donde se evidenció hernia vesical derecha.

Tras incisión de Gregoire ampliada se objetivó hernia inguino-escrotal directa con deslizamiento de la vejiga urinaria e intestino, que se corrigió con 2 mallas según técnica de Lichtenstein.



FIGURA 1

Correspondencia autor: Dr. E.A. Rijo Mora
Servicio de Urología. Hospital del Mar
Passeig Marítim, 25-29 - 08003 Barcelona
Tel.: 932 483 000
E-mail autor: rijo_enrique@yahoo.es
Información artículo: Imágenes en Urología
Trabajo recibido: septiembre 2006
Trabajo aceptado: octubre 2006