

Hematoma en riñón hidronefrótico

Carrión López P, Donate Moreno MJ, Pastor Navarro H, Giménez Bachs JM, Salinas Sánchez A, Virseda Rodríguez. JA.

Servicio de Urología. Hospital General Universitario. Albacete.

Actas Urol Esp. 2008; 32(5):672

Mujer de 68 años de edad, con antecedentes de MHTA, que acude a Urgencias por presentar dolor en hemiabdomen izquierdo tras caída y contusión sobre dicha zona. A la exploración, la paciente se encuentra hemodinámicamente estable, presentando dolor a la palpación abdominal en hipocondrio izquierdo. Analíticamente destaca CR: 1,9, Hto: 52%, y hematuria en el sedimento de orina. Se realiza TAC que informa de gran riñón izquierdo hidronefrótico con litiasis ureteral y colección perirrenal izquierda sugestiva de hematoma (Figs. 1, 2 y 3).

Tras 10 días de ingreso hospitalario y tratamiento conservador, habiendo precisado únicamente la transfusión de un concentrado de hematíes por descenso de Hto, se decide alta hospitalaria y cirugía diferida.



FIGURA 1



FIGURA 2



FIGURA 3

Un mes más tarde se practica Nefrectomía Izquierda por riñón hidronefrótico secundario a litiasis ureteral.

Correspondencia autor: Dr. P. Carrión López
 Servicio de Urología. Hospital General Universitario de Albacete
 Hermanos Falcó, s/n - 02006 Albacete. Tel.: 967 597 100
 E-mail autor: pedrocarrion1980@hotmail.com
 Información artículo: Imágenes en Urología
 Trabajo recibido: enero 2007
 Trabajo aceptado: febrero 2007