

*Imágenes en Urología***Tumores de la fosa navicular**

Enrique Peyrí Rey

Clínica Delfos. Barcelona. España.

**L**os tumores de la fosa navicular, son de presentación rara. Los más frecuentes son los condilomas acuminados en la infección por VPH (afecta al 3% de los varones que padecen esta infección).

Presento imágenes semejantes macroscópicas de un pólipos fibroepitelial (Fig. 1) y de una eritroplasia de Queyrat o carcinoma in situ (Fig. 2) con afectación exclusivamente en la fosa navicular.

La histología nos confirmó el diagnóstico de estos tumores, por lo que recomiendo realizar siempre la

resección biopsia de estos tumores. No destruirlos con tratamientos tópicos (podofilino, imiquimod, 5 fluorouracilo), electrocoagulación, crioterapia o láser, sin tener una histología previa del tumor.

---

Correspondencia autor: Dr. Enrique Peyrí Rey  
Clínica Delfos. Barcelona.  
Avda. Vallcarca, km. 151 - 08023 Barcelona. Tel.: 932 545 000  
E-mail autor: 7956epr@comb.es  
Información artículo: Imágenes en Urología  
Trabajo recibido: febrero 2008  
Trabajo aceptado: marzo 2008



**FIGURA 1. Pólipos fibroepitelial (talla verde).**



**FIGURA 2. Eritroplasia de Queyrat.**