Hematocele

Hematocele

Imagen 1 – Ecografía testicular: hemiescroto derecho ocupado de por un contenido de una ecogenicidad intermedia, móvil con los cambios posturales. No se identifica el testículo derecho (posible estallido testicular) por lo que se solicita RMN.

Imagen 2 – RMN: hemiescroto derecho con una formación quística de hasta 18 cm de diámetro cráneo-caudal identificándose el parénquima testicular en la porción más declive (Hematocele).

Aníbal Rincón Mayans*, Beatriz Zudaire Diaz-Tejeiro,
Luis Romero Vargas, Javier Barba Abad y
Egoitz Tolosa Eizaguirre

*Departamento de Urología, Servicio de Radiodiagnóstico,
Clínica Universidad de Navarra, Navarra, España*

**Autor para correspondencia.*

*Correo electrónico: arinconmayans@gmail.com (A. Rincón Mayans)
doi: 10.1016/j.acuro.2010.02.050*

Cistitis enfisematosa: entidad de fácil diagnóstico en TAC

Emphysematous cystitis: entity of easy diagnosis in CT

Figuras 1 y 2 – Cortes axiales de TC pélvico con doble ventana. Se identifica la existencia de una importante cantidad de burbujas de aire distribuidas por toda la pared vesical, hallazgo que sugiere cistitis enfisematosa.

Agustina Vicente-Bártulos* y José María García-Cabero

*Servicio de Radiodiagnóstico, Hospital Universitario Ramón y Cajal,
Madrid, España*

**Autor para correspondencia.*

*Correo electrónico: avicente.hrc@salud.madrid.org
(A. Vicente-Bártulos)
doi: 10.1016/j.acuro.2010.02.051*