PICTURES IN DIGESTIVE PATHOLOGY

Apoptosis: a rapid and silent form of death

J. A. Solís Herruzo

Department of Gastroenterology. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. Spain

Cells die by two different mechanisms: a) *necrosis*, by which the release of intracellular proteolytic enzymes induces tissue damage and inflammatory response; or b) *apoptosis* (Greek meaning *apo*, off; *ptosis*, falling), where the cell remnants quietly disappear as they are phagocytosed by surrounding cells. The latter, first described, in 1972, by Kerr et al. (1), is the process by which cells are removed under normal conditions when they reach the end of their life span, are damaged or are superfluous. It is estimated that normal apoptotic cell removal take place at a rate of 1×10^{11} cell per day, which is equivalent to the turnover of an adult's total body weight every 18-24 months.

In cells undergoing apoptosis, there is shrinkage, lost of specialized surface features (microvilli), ruffling, membrane blebbing, condensation and margination of nuclear chromatin and nuclear fragmentation (Fig. 1a). Afterwards, there is cellular fragmentation into membrane-enclosed "apoptotic bodies" that are engulfed rapidly by tissue macrophages and neighboring cells. This process is typically complete in only 30 to 60 minutes. As no cytosolic contents are released during apoptosis, inflammation is not triggered. The microscopic appearance of an apoptotic cell consists of intense eosinophilic cytoplasm, condensed chromatin masses and picnotic nucleus (2). Councilman bodies (Fig. 1b), a well known pathological feature of hepatocellular death, represent apoptotic bodies. In the final stage of apoptosis, endonucleases cleavage DNA in the internucleosomal linker regions giving rise to about 200-base-pair fragments. Separation of these fragments by agarose gel electrophoresis reveals the characteristic DNA ladder pattern of apoptosis (Fig. 1c), which is in contrast to the smudge pattern seen with cell necrosis caused by the fully degraded DNA.

Apoptosis is an integral part of normal tissue development and homeostasis, eliminating redundant cells during embryogenesis. Furthermore, apoptotic cell death can be induced by multiple stimuli, including oxidative stress, radiation,

absence of growth factors, and exposition to chemotherapeutic agents, transforming growth factor β , Fas/Fas ligand system or tumor necrosis factor α (3). These factors fire the enzyme system responsible for an ATP-dependent cell death called caspase cascade (*c-asp-ase*: *c*-, cysteine; *-asp*, aspartic acid; *ase*, protease) (4). These highly conserved family of proteases “cut” cytoplasmic and nuclear content for packing in apoptotic bodies. Proteolysis by caspases is restricted to specific aspartic acid residues, producing disassembling of proteins, but not general proteolysis. A group of caspases are located close to the plasma membrane (“*initiator caspases*”) and are upstream activators of the other group of caspases (“*effector caspases*”), which degrade cytoskeletal proteins, lamins (nuclear protein), poly-(adenosine-diphosphate-ribose) polymerase (DNA repair), histones, ribonuclear proteins, and nucleolins, among others, and activate caspase-activated DNAase (cleavage of DNA). Cleavage fragments of DNA and histone proteins are called oligonucleosomes, which contain about 200 base pair or integral multiples of 200 base pairs. This cleavage pattern is responsible for the characteristic DNA laddering seen in agarose gels.

REFERENCES

1. Kerr JFR, Wyllie AH, Currie AR. Apoptosis: a basic biology phenomenon with wide-ranging implications in tissue kinetics. *Br J Cancer* 1972; 26: 239-57.
2. Allen RT, Hunter WJ III, Agrawal DK. Morphological and biochemical characterization and analysis of apoptosis. *J Pharmacol Toxicol Meth* 1997; 37: 215-28.
3. Salvesen GS, Dixit VM. Caspase activation: The induced-proximity model. *Proc Nat Acad Sci USA* 1999; 96: 10964-7.
4. Thornberry NA, Lazebnik Y. Caspases: Enemies within. *Science* 1998; 281: 1312-6.
5. Yu J, Zhang L. Apoptosis in human cancer cells. *Curr Opin Oncol* 2003; 16: 19-24.

Apoptosis: una forma rápida y silenciosa de morir

J. A. Solís Herruzo

Servicio de Gastroenterología. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Las células mueren por dos vías diferentes: a) necrosis, por la cual la liberación de las enzimas proteolíticas intracelulares provoca lesión tisular y respuesta inflamatoria; o b) apoptosis (del griego *apo*, fuera; *ptosis*, caer), donde los residuos celulares desaparecen silenciosamente al ser fagocitados por las células vecinas. Esta última forma de muerte, descrita por primera vez, en 1972, por Kerr y cols. (1), es un proceso por el que las células son eliminadas en condiciones normales cuando llegan al final de su vida, están dañadas o son superfluas. Se considera que cada día se renuevan por apoptosis unas 1×10^{11} células, lo que equivale a la renovación de todas las células de un adulto cada 18-24 meses.

En las células en proceso de apoptosis se produce retracción, pérdida de estructuras superficiales especializadas (microvillus), arrugamiento, vesiculación de la membrana, condensación y marginación de la cromatina nuclear y fragmentación del núcleo (Fig. 1a). Tras ello, hay fragmentación celular en cuerpos apoptóticos cubiertos por membrana, que son rápidamente englobados por los macrófagos titulares y por las células vecinas. El proceso de apoptosis típicamente se completa en tan sólo 30 a 60 minutos. Como el contenido celular no es liberado durante la apoptosis, no se produce respuesta inflamatoria. El aspecto microscópico de las células apoptóticas es el de células con intensa eosinofilia del citoplasma, con masas de cromatina condensada y núcleos picnóticos (2). Los cuerpos de Councilman (Fig. 1b), una expresión bien conocida de muerte hepatocelular, representan en realidad cuerpos apoptóticos. En la fase final de la apoptosis, las endonucleasas provocan la partición del ADN a nivel de las regiones internucleosomales, lo que origina fragmentos de unos 200 pares de bases. La separación de estos fragmentos mediante electroforesis en gel de agarosa revela el patrón característico de apoptosis de ADN en forma de “escalera” (Fig. 1c). Este patrón contrasta con el patrón en mancha difusa que se encuentra en la muerte por necrosis y que es originado por la completa degradación del ADN.

La apoptosis forma parte integral del normal desarrollo tisular y homeostasis, eliminando las células redundantes durante la embriogénesis. Además, la muerte celular por apoptosis puede ser inducida por estímulos múltiples, entre los que figura el estrés oxidativo, la radiación, la ausencia de factores de crecimiento y la exposición al factor transformador del crecimiento β , el sistema Fas/Ligando Fas o el factor de necrosis tumoral α (3). Estos factores ponen en marcha el sistema enzimático, dependiente del ATP, responsable de la muerte celular denominado cascada de las caspasas (*c-asp-ase*: c-, cisteína; *asp*-, ácido aspártico; *ase*, proteasa) (4).

Esta familia de proteasas, altamente conservada, fragmenta el contenido citoplásmico y nuclear para empaquetarlo después en los cuerpos apoptóticos. La proteólisis provocada por las caspasas se limita a residuos específicos en los que figura el ácido aspártico, provocando el desmontaje de esas proteínas pero no su total proteólisis. Un grupo de estas caspasas se localizan en la vecindad de la membrana plasmática ("*caspasas efectoras*") y se comportan como activadoras de otro grupo de caspasas ("*caspasas efectoras*") que degradan las proteínas del citoesqueleto, lamins (proteínas nucleares), poli-(adenosina-difosfato-ribosa) polimerasa (reparación del ADN, histonas, proteínas ribonucleares y nucleolinas, entre otras, y activa la ADNasa activada por caspasas (fragmentación del ADN). Los fragmentos de ADN liberados y las histonas asociadas a ellos forman lo que se denomina nucleosomas, que contienen unos 200 pares de bases o múltiplos de 200 pares de bases. Este patrón de fragmentación es el responsable del aspecto característico en escalera del ADN que se observa cuando se separa por electroforesis en gel de agarosa.