¿Cuál es su diagnóstico?

What is the diagnosis?

Paciente varón de 64 años de edad, con antecedentes de hipertensión arterial, úlcera duodenal antigua, apendicitis con peritonitis intervenida y varices en extremidades inferiores, que es remitido por el anestesta al observar en la exploración oral una tumoración en la lengua, desapercibida por el paciente desconociendo el tiempo de evolución. No refería dolor ni otra clínica regional ni general acompañante.

A la exploración intraoral se evidencia tumoración en borde lateral derecho de lengua, redondeada, submucosa, no ulcerada, de coloración amarillenta y de consistencia dura de aproximadamente 2 cm de diámetro (Fig. 1). Era indolora y la sensibilidad de la región estaba conservada. Las glándulas submaxilares y el suelo de la boca eran normales. No se evidenciaron adenopatías cervicales.

Ante el aspecto benigno de tumor de partes blandas y la ausencia de clínica y datos concluyentes, se decidió realización de biopsia excisional mediante láser de CO₂ en modo continuo a 10 watt de potencia (Fig. 2), obteniéndose la enucleación completa del tumor, vaporizando con posterioridad el lecho muscular en modo desenfocado a 10 watt, sin necesitar puntos de sutura (Fig. 3).

Figura 1. Lingual tumor.
Figure 1. Tumoración lingual.

Figura 2. Biopsia excisional.
Figure 2. Excisional biopsy.

Figura 3. Enucleación completa y vaporización del lecho muscular con láser CO₂.
Figure 3. Complete enucleation and vaporization of the muscle bed with CO₂ laser.

Male patient, 64 years old, with a history of arterial hypertension, having a duodenal ulcer for some time. He had been operated for appendicitis with peritonitis, had varicose veins in the lower extremities, and had been referred to us by the anesthetist on observing during oral examination a tumor-like growth in the tongue. This had not been noticed by the patient who was unable to say how long he had had it for. It was painless and there was no additional regional or general clinical [observations].

During the intraoral examination, a tumor-like growth was observed on the edge of the right side of the tongue which was round, submucosal, non-ulcerated, yellowish in color, hard and with a diameter of approximately 2 cm (Fig. 1). It was painless and there was no loss of sensitivity in the area. The submaxillary glands and the floor of the mouth were normal. Cervical adenopathies were not observed.

An excisional biopsy was decided upon using a CO₂ laser in a continuous mode with a strength of 10 watts (Fig. 2), as it appeared to be a benign tumor of soft tissues and there was a lack of clinical [symptoms] and conclusive data. Complete enucleation of the tumor was achieved, the muscle bed was then widely vaporized using 10 watts, and suturing was not necessary (Fig. 3)

Liposarcoma lingual

Lingual liposarcoma

V. Ordóñez¹, A. González¹, J. Giner¹, L. Maniegas¹, R. Martín-Granizo²

El análisis microscópico reveló la presencia de adipocitos con variabilidad de tamaño (Fig. 4), en su mayoría bien diferenciados, con presencia de lipoblastos en número variable (Fig. 5) y ocasionales atípicos.

El nódulo se correspondía con una neoplasia de adipocitos, en concreto de un liposarcoma bien diferenciado «lipoma like».

La lesión estaba rodeada por una fina capa de tejido conectivo, estando totalmente extirpada en la cirugía. Posteriormente, se decidió un seguimiento clínico y radiológico del paciente, sin evidenciarse recidiva a los 6 meses de evolución.

Discusión

Actualmente, el liposarcoma es considerado el sarcoma de partes blandas más común, suponiendo el 20% de todos los tumores malignos mesenquimales de partes blandas en el adulto.¹

Las localizaciones más comunes incluyen muslos, nalgas y retroperitoneo.¹ Los liposarcomas de la cabeza y el cuello son infrecuentes, constituyendo en distintas series publicadas del 5,6 al 9% del total.^{1,2} Los liposarcomas intraorales son sumamente raros constituyendo el 10% de los de cabeza y cuello.³

Las localizaciones de cabeza y cuello publicadas en la literatura son: cuero cabelludo (12 casos), laringe (29 casos), hipofaringe (8 casos), esófago (6 casos), cavidad oral (81 casos), cuello (22 casos) y órbita (26 casos).⁴⁻⁶

Dentro de la cavidad oral la localización más frecuente varía de unas series publicadas a otras (Tabla 1).

El liposarcoma aparece más frecuentemente en el varón.^{5, 7} La edad de presentación oscila de 28 a 83 años (media de 49,5 años).⁵

Microscopical analysis revealed the presence of adipocytes of different sizes (Fig. 4), generally well-differentiated, a variable number of lipoblasts (Fig. 5) and some atypia.

The nodule corresponded with a neoplasia of adipocytes, and more precisely with a lipoma-like, well-differentiated liposarcoma.

The lesion was surrounded by a fine layer of connective tissue, which had been completely removed during the surgery. Clinical and radiological following of the patient was later decided upon, and after 6 months there was no evidence of any recurrence.

Discussion

Liposarcoma is currently considered the most common sarcoma of soft tissues, accounting for 20% of all mesenchymal malignant tumors of soft tissues in adults.¹

It is most commonly found on the thighs, buttocks and retroperitoneum.¹ Liposarcomas of the head and neck are infrequent, representing in the different series that have been published, between 5.6 and 9% of the total.^{1,2} Intraoral liposarcomas are extremely rare representing 10% of those of the head and neck.³

Those located in the head and neck which have been published in the literature are: scalp (12 cases), larynx (29 cases), hypopharynx (8 cases), esophagus (6 cases), oral cavity (81 cases), neck (22 cases) and orbit (26 cases).⁴⁻⁶

Within the oral cavity the most frequent locations differ from one published series to another (Table 1).

Liposarcoma appears more frequently in males,^{5,7} the age range being between 28 and 83 years (median 49.5 years).⁵ In most patients the tumor is diagnosed after the fifth decade of life.⁵

Although the specific etiology of liposarcoma is unknown, its association with trauma and the resulting hematoma, approximately a year before the development of the tumor, has been published.^{5, 8}

In the case we are reporting there could be a connection, as the location in a free part of the tongue towards the

¹ Médico Residente

² Médico Adjunto

Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial (Jefe de Servicio: Dr. a. Berguer)
Hospital Clínico San Carlos. Madrid, España

Correspondencia:

Dr. Rafael Martín-Granizo López

Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial. Hospital Clínico San Carlos

C/ Profesor Martín Lagos s/n. 28040 Madrid

e-mail: rmartín.hcsc@salud.madrid.org.

En la mayoría de los pacientes el tumor es diagnosticado después de la quinta década de la vida.⁵

Aunque la etiología específica del liposarcoma es desconocida, se ha publicado una asociación con el traumatismo y subsiguiente hematoma, precediendo en un año aproximadamente al desarrollo del tumor.^{5,8}

En nuestro caso, podría estar relacionado, ya que la localización, en la zona libre posterior de la lengua, se correspondía con una posible área de roce por mordedura.

En la mayoría de los casos publicados, el liposarcoma oral cursa como una masa de lento crecimiento e indolora.

El marcador más importante del comportamiento clínico y pronóstico del liposarcoma es el subtipo histológico.⁷

Actualmente la clasificación histopatológica del liposarcoma de la OMS (1994)⁹, distingue 5 variantes (Tabla 2) y no difiere demasiado de la propuesta por Enzinger y Winslow, 8 a principios de los años 60, salvo en un quinto subtipo (liposarcoma indiferenciado).

Histología

En la localización intraoral, las series publicadas más recientemente muestran una marcada predominancia por el tipo histológico bien diferenciado «lipoma like» (95%).⁵ El subtipo «lipoma-like», está compuesto por adipocitos maduros que muestran variación de tamaño celular y escasa atipia nuclear.

Durante mucho tiempo, la presencia y el número de lipoblastos multivacuolados se consideró criterio diagnóstico de liposarcoma bien diferenciado, sin embargo actualmente se sabe que el número de lipoblastos puede variar desde varios a ninguno, no siendo requisito absoluto para su diagnóstico.¹⁰ Por otra parte, un número importante de tumores adipocíticos benignos presentan lipoblastos, como son: lipoma tipo «spindle cell», lipoma pleomórfico, lipoblastoma y condrolipoma.

El liposarcoma bien diferenciado está caracterizado por un riesgo de recurrencia local del 30%, aunque es incapaz de metastatizar, a menos que sufra una indiferenciación.

Figura 4. La gran variabilidad en el tamaño de los adipocitos es una de las características morfológicas que más ayudan al diagnóstico del liposarcoma bien diferenciado.

Figure 4. The great variety in the sizes of the adipocytes is one of the morphological characteristics that is of most help in diagnosing a well-differentiated liposarcoma.

Figura 5. En el liposarcoma bien diferenciado, es característica la presencia de lipoblastos, su número puede ser muy variable y su presencia no es necesaria para hacer un diagnóstico morfológico.

Figure 5. The presence of lipoblasts is a characteristic of the well-differentiated liposarcoma. Their numbers may be very variable and their presence is not necessary for a morphological diagnosis.

back, could have been related to friction from biting.

In the majority of the studies published, the oral liposarcoma evolves as a slow growing, painless mass.

The most important marker in clinical behavior and prognosis of liposarcoma is the histological subtype.⁷

The current histopathological classification of liposarcoma by the WHO (1994)⁹, distinguishes 5 variants (Table 2) which do not differ too much from the proposals of Enzinger and Winslow, 8 at the beginning of the 60s, except in a fifth subtype (the undifferentiated liposarcoma).

Histology

The series published more recently show a clear predominance in intraoral location of the well-differentiated lipoma-like histological type (95%).⁵ The lipoma-like subtype is composed of mature adipocytes displaying variations in cellular size and little nuclear atypia.

For a long time, the presence and number of multivacuolated lipoblasts was considered a diagnostic criteria for well-differentiated liposarcoma. However, we now know that the number of lipoblasts can vary from several to none, and that they are not an essential requirement for a diagnosis.¹⁰

On the other hand a considerable number of benign adipocyte tumors have lipoblasts, such as: spindle-cell type lipoma, pleomorphic lipoma, lipoblastoma and chondrolipoma.

The well-differentiated liposarcoma is characterized by a risk of local recurrence of 30%, although it is unable to spread unless it becomes undifferentiated.

Cytogenetics

The well-differentiated liposarcoma is characterized by the presence of giant chromosomes and ring chromosomes

Citogenética

El *liposarcoma bien diferenciado* se caracteriza por la presencia de cromosomas gigantes y cromosomas en anillo derivados del brazo largo del cromosoma 12.¹¹ En estos cromosomas hay amplificación y subsiguiente sobreexpresión de genes de la región 12q13-15,¹² llamados MDM2, CDK4 y SAS, que se relacionan con la tumorigénesis de varios sarcomas de hueso y de tejidos blandos, incluyendo el liposarcoma.¹²

El inmunofenotipo negativo MDM2 en los lipomas puede ser usado para distinguir entre lipoma y liposarcoma bien diferenciado «lipoma-like».¹¹

Diagnóstico

Está bien documentada la dificultad de diagnóstico del liposarcoma mediante PAAF e incluso con biopsia.⁶ La histología de un liposarcoma bien diferenciado puede asemejarse fielmente a la del lipoma, pues los lipoblastos pueden estar ausentes o presentes de forma difusa en el tumor, por lo que una PAAF o una biopsia pueden no contener estas células. De aquí que a menudo se precise la resección completa de la masa para el diagnóstico definitivo histopatológico (Fig. 6).

El aspecto radiográfico de los liposarcomas varía enormemente. El tipo bien diferenciado, típicamente tiene una apariencia homogénea en la TC, semejante a la del lipoma, con una intensa demarcación de los tejidos circundantes. Los otros tipos histológicos de liposarcoma tienen una apariencia más heterogénea.¹³

Las características de los liposarcomas en la RM, también han sido publicadas, aunque el diagnóstico preciso con esta modalidad aún no es posible.¹⁴

Recientes estudios se han mostrado prometedores en el uso de espectroscopia RM de protones para el diagnóstico de liposarcoma. Esta técnica puede predecir la histología del tumor, basándose en la cantidad de triglicéridos y fosfatidilcolina del tumor.¹⁵

Tabla 1. Localizaciones de liposarcoma en la cavidad oral

	Nikitakis (43 casos) ⁴	Nascimento (23 casos) ⁵
• Mejilla	22 (50%)	5
• Lengua	7	12 (50%)
• Suelo de boca	4	2
• Paladar	4	1
• Encía mandibular	3	1
• Encía maxilar	2	0
• Labio	1	2

Table 1. Locations of liposarcoma in the oral cavity

	Nikitakis (43 cases) ⁴	Nascimento (23 cases) ⁵
• Cheek	22 (50%)	5
• Tongue	7	12 (50%)
• Floor of mouth	4	2
• Palate	4	1
• Mandibular gums	3	1
• Maxillary gums	2	0
• Lip	1	2

Tabla 2. Clasificación de liposarcoma de la OMS (1994)⁹

1. Liposarcoma bien diferenciado:
 - «lipoma-like»
 - Esclerosante
 - Inflamatorio
2. Liposarcoma mixoide
3. Liposarcoma «round-cell»
4. Liposarcoma indiferenciado
5. Liposarcoma pleomórfico

Table 2. Liposoma classification of the WHO(1994)⁹

1. Well-differentiated liposarcoma:
 - Lipoma-like
 - Sclerosing
 - Inflammatory
2. Myxoid liposarcoma
3. Round-cell liposarcoma
4. Undifferentiated liposarcoma
5. Pleomorphic liposarcoma

derived from the long arm of chromosome 12.¹¹ In these chromosomes there is amplification and the subsequent overexpression of genes of the 12q13-15 region,¹² labeled MDM2, CDK4 and SAS, which are related with the tumorigenesis of various bone and soft tissue sarcoma, including liposarcoma.¹²

The MDM2 negative immunophenotype of the lipomas can be used to distinguish between lipoma and well-differentiated lipoma-like liposarcoma.¹¹

Diagnosis

The difficulty in diagnosing liposarcoma using FNAB and even with biopsy, is well documented.⁶ The histology of a well-differentiated liposarcoma can be extremely like that of a lipoma, as lipoblasts may be absent or completely widespread in the tumor. A FNA or a biopsy may not contain these cells. Often complete resection of the mass is therefore necessary for a definitive histopathologic diagnosis (Fig. 6).

The radiographic appearance of liposarcomas varies enormously. The well-differentiated type, has a typical homogenous appearance on the CT scan, similar to that of the lipoma, with sharp demarcation

from surrounding tissues. Other histological types of liposarcomas have a heterogeneous appearance.¹³

The characteristics of liposarcomas in MRI, have also been published, although precise diagnosis with this modality is still not possible.¹⁴

Recent studies with proton NMR spectroscopy have showed promise regarding the diagnosis of liposarcoma. This technique can forecast the histology of the tumor, based on the amount of triglycerides and phosphatidylcholine in the tumor.¹⁵

Diagnóstico diferencial

Cuando se examina un tumor graso en una localización intraoral, hay que tener en cuenta *tumores benignos con componente adipocítico* (hibernoma, angiolipoma, condrolipoma, fibrolipoma, lipoma, lipoma «spindle cell»), *otros tumores benignos* (mixoma, adenomas pleomórficos), *tumores malignos* (mixo-fibrosarcoma, histiocitoma maligno, mesenquimoma maligno), *granuloma de silicona y necrosis grasa*.¹ El diagnóstico diferencial es puramente histológico.

Los granulomas de silicona empiezan a ser comunes debido a su uso frecuente en cirugía plástica de implantes de silicona en labios y mejillas. Se trata de una inflamación granulomatosa con formación de vacuolas rodeadas por células gigantes multinucleadas, que puede simular lipoblastos.

Figura 6. Pieza quirúrgica.
Figure 6. Surgical sample.

Differential diagnosis

When a fatty tumor with an intraoral location is examined, one has to take into consideration benign tumors with adipocyte component (hibernoma, angiolipoma, chondrolipoma, fibrolipoma, lipoma, spindle cell lipoma), other benign tumors (myxoma, pleomorphic adenomas) malignant tumors (myxofibrosarcoma, malignant histiocytoma, malignant mesenchymoma), silicone granuloma and fat necrosis.¹ The differential diagnosis is purely histological.

ly histological.

Silicone granulomas are starting to become common due to their frequent use in plastic surgery for silicone lip and cheek implants. They consist in a granulomatose inflammation with vacuoles surrounded by multinucleated giant cells that can mimic lipoblasts.

Tratamiento

El tratamiento recomendado para el liposarcoma es la extirpación radical con márgenes libres de tumor, asegurando los mismos de forma intraoperatoria.^{3,7,13} La simple enucleación del tumor aumenta la probabilidad de recidiva. Aunque la mayoría de las veces la recurrencia tumoral es del mismo tipo histológico, también puede recurrir como un tumor de más alto grado. Si es difícil obtener márgenes limpios, debido a la envoltura de estructuras neurovasculares, algunos autores consideran el uso de radioterapia adyuvante para reducir la probabilidad de recidiva local.¹⁶ La quimioterapia puede ser eficaz en el tratamiento de tumores irresecables o como tratamiento adyuvante.¹⁶ La disección ganglionar no está indicada en estos tumores, a menos que exista una clara evidencia de metástasis, las cuales son extremadamente raras.^{1,16}

Pronóstico

Dentro de los distintos tipos histológicos de liposarcoma, son de bajo grado el bien diferenciado y el mixoide, y de alto grado el tipo «round cell», el indiferenciado y el pleomórfico.

El pronóstico del liposarcoma está directamente relacionado su localización y sobre todo con el tipo histológico. Las variantes de liposarcoma bien diferenciado y mixoide de bajo grado, tienen el mejor pronóstico, con una tendencia a la recurrencia local pero con pequeño o nulo potencial metastásico. Las variantes «round cell», indiferenciado y pleomórfico tienen peor pronóstico, con una elevada incidencia de metástasis y fallecimientos.

Hasta ahora en distintas series publicadas, hay una marcada predominancia por los liposarcomas de bajo grado. Así en una revisión de 76 pacientes con liposarcomas de cabeza y cuello, se identificó

Treatment

The treatment recommended for liposarcoma is radical extirpation of the tumor, with intraoperative confirmation of free margins.^{3, 7, 13} Simply enucleating the tumor increases the risk of a relapse. Even though on most occasions tumor recurrence is of the same histological type, it can recur as a higher grade tumor. If obtaining clear margins is difficult, due to the membrane of neurovascular structures, some authors consider the use of adjuvant radiotherapy [to be necessary] in order to reduce the probability of local recurrence.¹⁶ Chemotherapy can be efficient in the treatment of tumors that cannot be resectioned or as adjuvant therapy.¹⁶ Ganglionic dissection is not indicated for these tumors, unless there is clear evidence of metastasis which would be extremely unusual.^{1,16}

Prognosis

Within the different histological types of liposarcoma, well-differentiated and myxoid are low grade, and round cell, undifferentiated and pleomorphic are high grade.

The prognosis of liposarcoma is directly related to location and particularly to histological type. Low grade, well-differentiated and myxoid variants have a better prognosis, with a tendency for local recurrence, but with a small or non-existent metastatic potential. Round cell, undifferentiated and pleomorphic variants have a worse prognosis, with a higher rate of metastasis and death.

un 62% de bajo grado y un 38% de alto grado.⁷ En otra revisión de 44 pacientes con liposarcoma oral, un 80% era de bajo grado y un 20% de alto grado. La tasa de supervivencia a largo plazo está más relacionada con la recidiva local incontrolada que con la diseminación metastásica.

Aunque el marcador más importante del comportamiento clínico del liposarcoma es el tipo histológico, debido a la dificultad de clasificación del liposarcoma mediante criterios microscópicos, algunos autores han propuesto identificar marcadores pronósticos a través de análisis moleculares y citogenéticos. Varios estudios han revelado modelos de cambio molecular que son muy útiles para especificar los distintos tipos de liposarcoma, así como para aclarar patogénesis, proponer un nuevo sistema de clasificación y determinar el pronóstico del liposarcoma.

Conclusiones

Los liposarcomas son poco frecuentes en las regiones de cabeza y cuello y sumamente raros en la cavidad oral. Las localizaciones intraorales más frecuentes son la lengua y la mejilla. El diagnóstico de confirmación es anatomopatológico. El principal marcador de comportamiento clínico y pronóstico es el tipo histológico. En la cavidad oral el tipo histológico más frecuente es el liposarcoma bien diferenciado «lipoma like», el cual está caracterizado por un riesgo de recidiva local alto (30%), aunque tiene bajo o nulo potencial metastático. El tratamiento de elección debe ser la resección radical con márgenes libres de tumor, para disminuir la probabilidad de recidiva. Aún así, es necesario un seguimiento a largo plazo del paciente.

Bibliografía

1. Enzinger F M, Weiss S W. *Soft Tissue Tumours*. 3rd ed. St. Louis: Mosby 1995.
2. Enterline HT, Culbertson JD, Rochlin DB, Brady LW. Liposarcoma. A clinical and pathological study of 53 cases. *Cancer* 1960;13:932-50.
3. Sadeghi EM, Sauk JJ. Liposarcoma of the oral cavity. Clinical tissue culture and ultrastructure study of a case. *J Oral Pathol* 1982;11:263-75.
4. Nikitakis NG, Lopes MA, Pazoki AE, et al. MDM2+ / CDK4+ / p53+ oral liposarcoma: case report and review of the literatura. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 2001;92:194-201.
5. Nascimento AF, McMenamin ME, Fletcher CD. Liposarcomas/atypical lipomatous tumours of the oral cavity: a clinicopathologic study of 23 cases. *Ann Diagn Pathol* 2002;6:83-93.
6. Collins BT, Gossner G, Martin DS, y cols. Fine needle aspiration of well differentiated liposarcoma of neck in young female. A case report. *Acta Cytol* 1999; 43:452-6.
7. McCulloch TM, Makielski KM, McNutt MA. Head and neck liposarcoma. A histopathologic reevaluation of reported cases. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1992;118:1045-9.
8. Enzinger FM, Winslow DJ. Liposarcoma: a study of 103 cases. *Virchows Arch* 1962;335:367-88.
9. Weiss SW (ed). *Histological Typing of Soft Tissue Tumours*: World Health Organization (ed 2). Berlin, Springer-Verlag, 1994.

In the different series that have been published, there has been up until now, a marked predominance of low grade liposarcomas. During the following of 76 patients with liposarcomas of the head and neck, 62% were low grade and 38% were high grade.⁷ In another following of 44 patients with oral liposarcoma, 80% were low grade and 20% were high grade. Long term survival is related more with uncontrolled local recurrence than with metastatic dissemination.

Even though the most important marker in the clinical behavior of liposarcoma is histological type, due to the difficulty in classifying liposarcoma using microscopical criteria, some authors have proposed identifying prognosis markers using molecular and cytogenetical analysis. Several studies have revealed models of molecular change which are very useful for specifying the different types of liposarcoma, as well as for clarifying pathogenesis, proposing a new classification system and determining the prognosis of liposarcoma.

Conclusions

Liposarcoma are very infrequent in the regions of the head and neck and extremely rare in the oral cavity. The most frequent intraoral locations are in the tongue and cheek. Confirmation is through anatomicopathological diagnosis. The principle marker of clinical behavior and prognosis is the histological type. In the oral cavity the most frequent histological type is the well-differentiated (lipoma-like) liposarcoma, which is characterized by high local recurrence (30%), although it has a low or non-existent metastatic potential. The treatment of choice should be radical resection with tumor free margins, in order to reduce the probabilities of recurrence. A long term following of the patient is, nevertheless, necessary.

10. Fletcher CDM. Adipocytic tumors, En: *Diagnostic Histopathology of Tumors* (ed). London, Churchill Livingstone 2000;1474-85.
11. Pilotti S, Della Torre G, Lavarino C, Di Palma S, Sois G, Minoletti F, y cols. Distinct mdm2/p53 expresion patterns in liposarcoma subgroups: implications for different pathogenetic mechanisms. *J Pathol* 1997;181:14-24.
12. Leach FS, Tokino T, Meltzer P, Burrell M, Oliner JD, Smith S, y cols. p53 mutation and MDM2 amplification in human soft tissues sarcomas. *Cancer Res* 1993; 53:2231-4.
13. Newlands SD, Divi V, Stewart CM. Mixed Myxoid/Round cell Liposarcoma of the Scalp. *Am J Otolaryngol* 2003;24:121-7.
14. Sung MS, Kang HS, Suh JS, y cols. Myxoid liposarcoma: appearance at MR imaging with histological correlation. *Radiographics* 2000;20:1007-9.
15. Millis K, Weybright P, Campbell N, y cols. Classification of human liposarcoma and lipoma using ex vivo proton NMR spectroscopy. *Magn Reson Med* 1999; 41:257-67.
16. Zagars GK, Goswitz MS, Pollack A. Liposarcoma: outcome and prognostic factors following conservation surgery and radiation therapy. *Int J Rad Oncol Biol Phys* 1996;36:311-9.