¿Cuál es su diagnóstico?

What is the diagnosis?

Varón de 32 años de edad, sin antecedentes de interés para el proceso actual, que acude a nuestra consulta de Cirugía Oral y Maxilofacial remitido desde la consulta de Oftalmología por presentar proptosis ocular izquierda progresiva, de aproximadamente tres años de evolución. El paciente refiere además dolor retroocular ocasional y diplopia de reciente comienzo.

En la exploración física se palpa una tumoración de aproximadamente 3 cm de diámetro en ángulo súpero-externo de órbita izquierda, acompañada de distopia ocular, exoftalmos unilateral izquierdo, discreta restricción a la supraducción y diplopia en mirada superior (Fig.1), presentando pupilas isocóricas y normorreactivas.

Como exploraciones complementarias se realizaron TC y RM donde se evidenció la presencia de una masa extraconal superolateral izquierda, superior a la glándula lagrimal, con diámetros de 3.1x2x2.5 cm, de bordes lobulados, con señales internas discretamente heterogéneas, hiperintensas en secuencias T1 y en secuencias T2 muestran zonas intensas entremezcladas con otras hipointensas (Figs. 2 y 3). La lesión condiciona una compresión y desplazamiento del globo ocular en sentido inferior e interno, sin signos de infiltración de estructuras musculares o del globo ocular. Las pruebas de imagen también muestran remodelación ósea, y adelgazamiento de huesos frontal y malar izquierdos. Todo ello compatible con un tumor dermoide.

Figura 1. Imagen del paciente donde se aprecia el exoftalmos unilateral izquierdo y la distopia ocular.

Figure 1. Image of the patient in which left-sided unilateral exophthalmos can be appreciated together with ocular dystopia.

Figura 2. Corte coronal de RM.
Figure 2. MR showing coronal cut.

Figura 3. Corte sagital de RM.
Figure 3. MR showing sagittal cut.

Thirty-two year old male with no history of interest to this case, was referred to our Oral and Maxillofacial department by the Ophthalmology department because of presentation of progressive ocular proptosis of the left [orbit] which had been evolving over the past three years. The patient had occasional retro-ocular pain and had recently started experiencing diplopia. On physical examination a tumor with a diameter of approximately 3 cm was felt at a supero-external angle to the left orbit, together with ocular dystopia, unilateral exophthalmos of the left [orbit], with slight limitation of supraduction, and diplopia on upgaze (Fig. 1). The patient presented isochoric and normoreactive pupils.

Complementary explorations were performed with CT and NMR and a superolateral extraconal mass in the left superolateral [orbit] was observed above the lacrimal duct, measuring 3.1x2x2.5 cm. It had lobulated borders and internal signals that were mildly heterogeneous, hyperintense on T1 weighted sequences and intense areas mixed with others that were hypointense (Fig. 2 and 3) on T2 weighted sequences. The lesion was compressing and displacing the ocular globe downwards and inwards, but there were no signs of it extending into muscle structures nor into the ocular globe. Imaging tests also revealed bone remodeling and thinning of the frontal and left malar bones. Everything was compatible with a dermoid tumor.

Quiste hemático crónico orbitario

Chronic hematic cyst of the orbit

B. Peral Cagigal¹, J.I. Crespo Pinilla¹, R. Álvarez Otero¹, L.M. Redondo González²,
L.A. Sánchez Cuéllar², A. Verrier Hernández³

Ante éste diagnóstico de sospecha se decide realizar extirpación quirúrgica de la masa orbitaria para posterior análisis anatomopatológico de la lesión. El paciente fue sometido a intervención quirúrgica realizándose incisión hemicoronal izquierda para abordar la masa orbitaria, y posterior resección de la tumoración y del reborde supraorbitario en bloque, debido al gran adelgazamiento óseo producido por la masa tumoral. El tumor era de color pardo con áreas amarillentas en su interior, y de consistencia muy friable (Fig. 4). Posteriormente, el reborde supraorbitario fue reconstruido con autoinjerto de calota fijado con microplacas y cubierto con colgajo de galea.

El estudio anatomopatológico describió la existencia de una formación quística de pared fibrosa y con abundante contenido hemático, antiguo y reciente, en el que se identifican abundantes cristales de colesterol, un acúmulo focal de histiocitos de citoplasma amplio y espumoso, e infiltrado inflamatorio asociado de carácter mixto con predominio de linfocitos (Figs. 5 y 6). Con técnicas de inmunohistoquímica la lesión no muestra índice de proliferación y se reconocen histiocitos que se marcan con el CD68, no reconociéndose epitelio en ninguno de los fragmentos estudiados. Todo ello confirma el diagnóstico de quiste hemático crónico orbitario.

Discusión

El quiste hemático orbitario, también llamado *granuloma de colesterol orbitario*, *colegranuloma* o *colesteatoma de órbita*, es una afección poco frecuente (menos del 1% de los tumores orbita-

With this suspected diagnosis a decision was made to surgically remove the orbital mass for posterior anatomopathological analysis of the lesion. The patient underwent surgery, and a left hemicoronal incision was made in order to approach the orbital mass. The tumor was then resected as a block together with the supraorbital border due to the considerable thinning of the bone produced by the tumor mass. The tumor was dark in color with yellowish areas inside, and with a very friable consistency (Fig. 4). The supraorbital border was later reconstructed with an autograft of skullcap that was fixed with microplates and covered with a galea flap.

The anatomopathological study showed the existence of a cystic formation with a fibrous wall, abundant hematic content which was old and recent, and in which numerous cholesterol crystals could be identified. There was a focal accumulation of histiocytes with wide, frothy cytoplasm and associated inflammatory infiltrates, with mixed characteristics and a predominance of lymphocytes (Figs. 5 and 6). The lesion showed no evidence of proliferation using immunohistochemical techniques, and histiocytes stained [positive] with CD68 were reported, with no evidence of epithelium in any of the fragments studied. This all confirmed the diagnosis of chronic hematic cyst of the orbit.

Discussion

The hematic cyst of the orbit, which is also called cholesterol granuloma of the orbit, cholegranuloma or cholesteatoma of the orbit, is a rare condition (less than 1% of orbital tumors) and with an unclear pathogenesis.¹ Characterized by the presence of a progressive enlarging lesion due to the incomplete reabsorption of a hemorrhage through trauma, surgery, a foreign body or vascular lesion (lymphangioma or hemangioma) which sets off a granulomatous reaction against the metabolites in the blood, [leading to a] fibrous encapsulation and recurring hemorrhages.²

Middle aged males are particularly affected by the lesion, as in our case, which typically results in progressive prop-

1 Médico Residente.

2 Médico Adjunto.

3 Jefe de Servicio.

Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial.

Hospital Universitario del "Río Hortega". Valladolid. España.

Correspondencia:

Dra. Peral Cagigal

Servicio Regional de Cirugía Oral y Maxilofacial,

Hospital Universitario del Río Hortega,

C/ Cardenal Torquemada s/n, 47010 Valladolid, España.

E-mail: beaperal77@yahoo.es

rios) y de patogénesis no clara.¹ Caracterizada por la presencia de una lesión expansiva progresiva debida a la incompleta reabsorción de una hemorragia causada por un traumatismo, cirugía, cuerpo extraño o lesión vascular (linfangioma o hemangioma) lo cual origina una reacción granulomatosa contra los metabolitos hemáticos, con encapsulación fibrosa y hemorragias recurrentes.²

La lesión afecta sobre todo a varones de edad media, como en nuestro caso, y se caracteriza por producir proptosis progresiva (siendo éste el síntoma más frecuente),³ edema periorbitario, diplopia por restricción a la elevación y malestar ocular que puede durar desde semanas a años. En algunos casos puede aparecer dolor, sobre todo supraorbitario, ya que la tumoración se localiza con mayor frecuencia en el techo orbitario,⁴ como ocurría en nuestro paciente.

En la TC se suele apreciar una masa extraconal, homogénea, subperióstica, bien definida, no realzada, con expansión sobre el techo óseo orbitario que produce osteólisis del hueso frontal.⁵ Esta erosión del hueso orbitario, a veces contribuye a sospechar que estamos ante una lesión maligna.

La RM es la prueba más específica, mostrando los productos de desecho sanguíneos dentro de una lesión quística con erosión ósea. La RM suele mostrar una masa bien definida, isointensa en T-1 e hiperintensa en T-2 respecto a la grasa orbitaria,⁶ aunque existe mucha variabilidad al respecto. La confirmación diagnóstica se lleva a cabo por el estudio anatomopatológico, que revela una pseudocápsula densa y fibrosa con ausencia de células epiteliales, que envuelve sangre antigua y reciente, productos de degradación sanguíneos, células inflamatorias y cristales de colesterol.⁷

En el diagnóstico diferencial hay que tener en cuenta entidades como el quiste dermoide, quiste epidermoide, mucocoele, lipoma, linfangioma, tumores de la glándula lagrimal y cualquier otra entidad que pueda producir una expresión clínica y/o radiológica similar. De todos ellos, la patología más importante a tener en cuenta es el quiste dermoide.

El quiste dermoide es el tumor congénito más frecuente de la órbita, se suele localizar en la parte súpero-temporal y anterior de la órbita o en la cola de la ceja, y contiene generalmente estructuras epidérmicas y anejos de la piel con material sebáceo variable;

Figura 4. Detalle de la tumoración durante su extirpación, donde se aprecia el adelgazamiento que provoca en el reborde supraorbitario.

Figure 4. Tumor detail during extirpation, showing the thinning caused on the supraorbital border.

Figura 5. Trabéculas óseas en relación con una reacción fibrosa e inflamatoria con abundantes espículas de colesterol y restos de hemosiderina.

Figure 5. Bone trabeculae compared with a fibrous and inflammatory reaction with several spicules of cholesterol and hemosiderin remains.

tosis (this being the most frequent symptom),³ periorbital edema, diplopia because of limitation of elevation and ocular discomfort that can last from weeks to years. In some cases pain can appear, especially supraorbital pain, as the most frequent location of the tumor is in the orbital roof,⁴ as in the case of our patient.

An extraconal mass tends to appear on the CT scan which is homogenous, subperiosteal, well-defined, smooth, extending over the bone of the orbital roof, which produces osteolysis in the frontal bone.⁵ The erosion of the orbital bone can sometimes lead to the suspicion that the lesion is malignant.

MR is the most specific test, showing blood residue products within the cystic lesion together with bone erosion. MR tends to show a well-defined mass, isointense on T1 weighted sequences and hypointense on T2 with regard to orbital fat⁶ although there is much variability in this respect. Diagnostic confirmation was reached by means of an anatomopathological study, which revealed a dense fibrous pseudo-capsule with no epithelial cells and which was enveloping old and recent blood, blood degradation products, inflammatory cells and

cholesterol crystals.⁷

In the differential diagnosis entities such as the dermoid cyst, epidermoid cyst, mucocoele, lipoma, lymphangioma, tumors of the lacrimal duct and any other entity that can produce a similar clinical and/or radiological expression have to be taken into account. Of all of these, the most important to keep in mind is the dermoid cyst.

The dermoid cyst is the most frequent congenital cyst of the orbit. It tends to be located in the supero-temporal and anterior part of the orbit, or in the tail end of the eyebrow, and it generally contains epidermal structures and skin appendages with variable sebaceous material; it is present from birth and it progresses very slowly during early life producing a painless, unilateral exophthalmos. Dermoid cysts

está presente desde el nacimiento y progresa muy lentamente durante la juventud produciendo un exoftalmos unilateral no doloroso. Éstos quistes dermoides están acompañados a menudo de una reacción inflamatoria importante, a veces similar a la de un granuloma coles-terolínico. Por ello, cuando se extirpa se debe tener cuidado en no romper la cápsula, ya que aumenta el riesgo de recidivas y además los restos de la pared del quiste continuarán secretando queratina lo cual puede provocar una severa respuesta inflamatoria granulomatosa.⁸

El curso evolutivo habitual del quiste hemático orbitario es el crecimiento gradual, en nuestro caso llevaba 3 años de desarrollo progresivo, provocándole exoftalmos y diplopia, por lo que el momento de la extirpación vendrá determinado por las molestias visuales y/o estéticas que provoquen al paciente, extirpándose generalmente por orbitotomía, con aspiración del contenido quístico y curetage del lecho.⁹ Dicho tratamiento generalmente es definitivo, ya que éstas lesiones no suelen tener tendencia a la recidiva,¹⁰ y por lo tanto tienen un excelente pronóstico. En nuestro caso, el paciente se encuentra asintomático, y con una exploración física y radiológica normales tras 6 meses de seguimiento postquirúrgico.

Por tanto, el quiste hemático orbitario es una entidad poco frecuente, pero con unas características clínicas y radiológicas típicas; siendo el estudio histológico decisivo tras determinar la presencia de un acúmulo quístico de células inflamatorias, productos de degradación sanguínea y cristales de colesterol en ausencia de células epiteliales.

Agradecimientos

A la Dra. Ángeles Torres Nieto, anatomopatóloga del Hospital Río Hortega de Valladolid, por su ayuda en el análisis y obtención de imágenes histológicas.

Bibliografía

1. Loeffler KU, Kommerell G. Cholesterol granuloma of the orbit. Pathogenesis and surgical management. *Int Ophthalmol* 1997;21:93-8.
2. McNab AA, Wright JE. Orbitofrontal cholesterol granuloma. *Ophthalmology* 1990;97:28.
3. Ehlinger P, Peeters L, Kockx M, Daems L, Fossion E. Hematic cyst of the orbit. *Acta Stomatol Belg* 1993;90:177-9.
4. Vashisht S, Ghai S, Hatimota P, Betharia SM. Cystic lesions of the orbit- A CT spectrum. *Ind J Radiol Imag* 2003;13:139-44.
5. Arat YO, Chaudhry IA, Boniuk M. Orbitofrontal cholesterol granuloma: distinct diagnostic features and management. *Ophthal Plast Reconstr Surg* 2003;19:382-7.

Figura 6. Detalle de las espículas de colesterol, con células gigantes multinucleadas a su alrededor.

Figure 6. Detail of the spicules of cholesterol surrounded by giant multinucleated cells.

are often accompanied by a considerable inflammatory reaction, which is sometimes similar to a cholesterolinic granuloma. It is therefore important not to break the capsule when it is extirpated, as this would increase the risk of recurrence and, in addition, the remains of the cyst wall would continue to secrete keratin, which would result in a serious granulomatous inflammatory response.⁸

The normal course of evolution of the hematic cyst of the orbit is of gradual growth. In this case there

had been three years of progressive development that had produced exophthalmos and diplopia. When extirpation is carried out depends on the visual and/or aesthetic discomfort of the patient. Extirpation is generally carried out through an orbitotomy, together with aspiration of the cystic content and curettage of the bed.⁹ This treatment is generally definitive, as these types of lesions do not tend to recur,¹⁰ and the prognosis is therefore excellent. In the case we are reporting, the patient is asymptomatic, and his physical and radiological examinations have proved normal during the six months of postsurgical follow-up.

The hematic cyst of the orbit is therefore a rare entity, but with typical clinical and radiological characteristics; the histological study is decisive in determining the presence of a cystic accumulation of inflammatory cells, which are a product of blood degradation and cholesterol crystals in the absence of epithelial cells.

Acknowledgements

To Dr. Angeles Torres Nieto, anatomopathologist at the Rio Hortega Hospital in Valladolid, for her help in the analysis and in obtaining histologic images.

B. Peral Cagigal y cols.

Rev Esp Cirug Oral y Maxilofac 2004;26 329

6. Kersten RC, Kersten JL, Bloom HR, Kulwin DR. Chronic hematic cyst of the orbit. Role of Magnetic Resonance Imaging in Diagnosis. *Ophthalmology* 1988; 95:1549-53.
7. Karim MM, Inoue M, Hayashi Y, Nishizaki M, Hanioka K, Imai Y, y cols. Orbital cholesterol granuloma with destruction of the lateral orbital roof. *Jpn J Ophthalmol* 2000;44:179-82.
8. Kronish W, Dotzbach RK. Upper eyelid crease surgical approach to dermoid and epidermoid cysts in children. *Arch Ophthalmol* 1988;106:1625-7.
9. Mercado GV, Shields CL, Gunduz K, Shields JA, Eagle RC. Giant cell reparative granuloma of the orbit. *Am J Ophthalmol* 1999;127:485-7.
10. Parke DW, Font RL, Boniuk M, McCrary JA. Cholesteatoma of the orbit. *Arch Ophthalmol* 1982;100:612-6.