Cirugía Preprotésica. Análisis crítico

Preprosthetic surgery. A critical analysis

J.I. Salmerón Escobar

Resumen: Uno de los mayores problemas en la implantología dental son los diversos defectos de los huesos maxilares, que pueden impedir o hacerlo en forma defectuosa, la colocación de los implantes. Han sido y son diversos los métodos de aumento óseo y a veces aparecen productos mágicos para la regeneración ósea de dudosa eficacia.

El propósito de este artículo es analizar los principales métodos de cirugía preprotésica, como son los injertos óseos y la distracción alveolar y hacer un análisis crítico de la misma, basado en la experiencia personal y en la literatura vigente.

Palabras clave: Cirugía preprotésica; Injerto óseo; Distracción alveolar; Implantes dentales.

Recibido: 03.01.07

Aceptado: 29.01.07

Abstract: One of the greatest problems in dental implantology is the various defects of the jaw bones, which can hinder the placement of implants or that can lead to faulty placement. The methods for bone augmentation have been, and still are, diverse and sometimes magical products appear for regenerating bone that are of dubious efficiency.

The aim of this article is to analyze the principal methods of preprosthetic surgery such as bone grafts and alveolar distraction, and to carry out a critical analysis based on personal experience and the current literature.

Key words: Preprosthetic surgery; Bone graft; Alveolar distraction; Dental implants.

Médico Adjunto
Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial
Hospital Universitario Gregorio Marañón. Madrid, España

Correspondencia:

José Ignacio Salmerón
Clínica SP
C/ Rodríguez Marín 71. 28016 Madrid, España
Email: jjsalmeron@clinicasp.com

Introducción

Las causas principales de la pérdida ósea son: pérdidas dentarias -caries, enfermedad periodontal, traumatismos dentarios, exodoncias-, traumatismos faciales y tumores, además de otras causas como las enfermedades sistémicas.

El estado de edentulismo genera una pérdida progresiva del tejido óseo, que produce cambios en el esqueleto facial y la cara que conducen al envejecimiento en los casos extremos,¹ y que dificulta la colocación de implantes en una situación buena para la posterior rehabilitación protética, o incluso lo impide. No solo debemos corregir el defecto estructural, sino también los problemas funcionales, estéticos y satisfacer las expectativas de los pacientes,² todo un reto en los casos más complejos.

Los principales métodos de regeneración ósea en cirugía preprotésica son: la distracción alveolar y los injertos óseos y sus alternativas, principalmente los xenoinjertos de origen bovino (Bio-Oss®) los cerámicos tipo fosfato tricálcico (Cerasorb®).

Cuando hacemos un repaso a las presentaciones científicas y a los artículos en libros y revistas sobre cirugía preprotésica (en torno a 1.000 referencias), los resultados y los casos son óptimos, pero ausentes en su mayoría de espíritu crítico y rigor científico. En una revisión reciente sobre regeneración ósea de la Cochrane, Esposito y cols.,³ solo seleccionan 13 ensayos ECA (Ensayo Control Aleatorio), rigurosos y de los que se pueden obtenerse conclusiones extrapolables, pero incluso éstos adolecen en su mayoría de un escaso seguimiento y número de pacientes.

Tipos de injertos óseos

Autoinjertos

Sínfisis de mandíbula-mentón

Permite la obtención de injertos cortico-esponjosos (sobre todo corticales), de mediano tamaño. En su técnica debemos ser cuidadosos para evitar las lesiones del nervio mentoniano y de las raíces dentarias.^{4,5}

Es un injerto ideal para defectos óseos pequeños y medianos. Proporciona hueso de tipo membranosos y, por tanto, con menor reabsorción que el hueso endocondral' por otro lado al ser un hueso fundamentalmente cortical se reabsorbe menos que los de tipo esponjoso debido a su revascularización más lenta, a lo largo de meses, mientras que los esponjosos se hace en semanas.^{6,7}

El injerto de mentón tiene la ventaja de obtenerse de una localización intraoral y, de ser un procedimiento no complejo que puede ser realizado con anestesia local.

Las desventajas estriban en su morbilidad con una posible lesión del nervio mentoniano o de las raíces de los incisivos.

Rama ascendente (Fig. 1)

De la rama ascendente obtenemos injertos exclusivamente corticales de pequeño tamaño. Obtenemos solo la cortical externa, para así evitar la lesión del nervio dentario. Presenta una morbilidad significativamente menor que el injerto de mentón, en cuan-

Introduction

The principal causes of bone loss are: tooth loss -caries, periodontal disease, dental trauma, extractions-, facial trauma and tumors, in addition to other reasons such as systemic disease.

Being edentulous generates a progressive loss of bone tissue, which produces changes in the facial skeleton and face leading to ageing in the more extreme cases.¹ This makes placing the implants in an optimal position for subsequent prosthetic rehabilitation somewhat difficult, and sometimes this may even not be possible. Not only has the structural defect to be corrected, but also functional and aesthetic problems have to be addressed. And, the expectancies of the patient have to be met,² which is quite challenging in the more complex cases.

The principal methods of bone regeneration in preprosthetic surgery are: alveolar distraction and bone grafts, and their alternatives, mainly bovine-derived xenografts (Bio-Oss®) and ceramic alternatives such as tricalcium phosphate (Cerasorb®).

When the scientific presentations are reviewed together with articles in books and journals on preprosthetic surgery (around 1,000 references), the results and the cases are very good, but most of these lack a critical approach and scientific rigor. In a recent review of bone regeneration by Cochrane, Esposito and cols.,³ only 13 RCT's were selected that were rigorous and from which conclusions could be extrapolated, but even these suffered in general from limited follow-ups and patient numbers.

Type of bone graft

Autografts

Mandible-chin-symphysis

This permits obtaining cortical-spongy bone grafts (especially cortical grafts) of a medium size. When using this technique, care should be taken not to damage the mental nerve and dental roots.^{4,5}

It is an ideal graft for small and medium defects. It provides bone of a membranous type and, as a result, there is less resorption than in endochondral bone and, as it is a bone that is basically cortical, there is less resorption than with the spongy bone type due to slower revascularization taking place over months, while in spongy bone this takes place in weeks.^{6,7}

The chin graft has the advantage of being obtained from an intraoral site, and being an uncomplicated procedure it can be carried out with local anesthesia.

The disadvantages are that there is morbidity and possible damage to the mental nerve or to incisor roots.

Ascending ramus

From the ascending ramus purely cortical grafts can be obtained that are of a small size. Only the external cortical

to a la posible lesión nerviosa,⁸ a la hora de decidir su obtención es preciso valorar la altura del nervio dentario en la zona retromolar, ya que en los casos en los que tiene una disposición alta nos vamos a encontrar el nervio en la zona de obtención del injerto pudiendo presentarse hipoestesias transitorias o anestias en caso de una técnica poco cuidadosa.

Es un injerto de origen membranoso y, por lo tanto, con poca tasa de reabsorción, sus ventajas son la facilidad de la técnica, que puede ser realizada con anestesia local a través de una incisión similar a la de la extracción del tercer molar y su escasa morbilidad.

Calota craneal

Se obtiene de la tabla externa de la calota craneal. Es de origen membranoso, de tipo cortical y por tanto con escasa reabsorción.⁹

Proporciona gran volumen de hueso, lo que le hace apto para la reconstrucción en grandes defectos.

Sus ventajas radican en las escasas molestias postoperatorias, cicatriz oculta en el pelo y el volumen óseo que se puede obtener.

Sus inconvenientes radican en la técnica que precisa un entrenamiento adecuado, dificultad de modelación del injerto, necesidad de anestesia general y posibles complicaciones que, aunque muy infrecuentes, pueden ser graves: hematomas epidurales, lesión cerebral y fístulas de líquido cefalorraquídeo.^{4,6}

Cresta Iliaca

Es el injerto más utilizado en la reconstrucción maxilofacial;¹⁰ proporciona un gran volumen de hueso córtico-esponjoso, apto para grandes reconstrucciones. Habitualmente se utiliza la técnica de la trampilla o sobre, "trap door technique", que evita una depresión inestética de la cresta y se

Figura 1. Injerto de rama ascendente para recuperar implantes fenestrados realizados previamente por otro profesional. A) Imagen tridimensional (Simplant®) de TC. Se aprecian los implantes fenestrados colocados previamente y la planificación de implantes añadidos. B) Toma del injerto de rama ascendente. C) Aspecto en la cirugía de los implantes fenestrados. D) Aposición del injerto y fijación con un tornillo. E) Aspecto del injerto en la reentrada a los 4 meses.

Figure 1. Ascending ramus graft for retrieving fenestrated implants previously carried out by another professional. A) Tridimensional image (Simplant®) from CT scan. The fenestrated implants previously placed can be appreciated and the plan for the additional implants. B) Harvesting of graft from ascending ramus. C) Appearance of surgery for fenestrated implants. D) Aposition of the graft and fixation with a screw. E) Appearance of the graft and reentry at 4 months.

bone is obtained in order to avoid any damage to the dental nerve. There is noticeably less morbidity than with the chin graft, with regard to possible nerve damage.⁸ When deciding from which area the graft should be obtained, the height of the dental nerve in the retromolar area should be assessed, as in most cases the area with most availability is where we will find the nerve, and transitory hypoesthesia may arise, or anesthesia if the technique is not carried out with care. This graft is membranous and therefore the rate of resorption is low. Its advantages are the ease with which the technique is carried out, as it can be carried out with local anesthesia through an incision that is similar to that used for a third molar, and its low morbidity.

Calvarial bone

This graft is obtained from external calvarial plate. It is membranous and of the cortical type. Resorption is therefore low.⁹ It provides a large volume of bone, which makes it appropriate for reconstructing large defects. Its advantages are low post-operative discomfort, hidden scar in hair, and the bone volume that can be obtained. The inconveniences are that the technique requires appropriate training, the graft is difficult to mold, general anesthesia is needed and there are possible complications which, although very infrequent, can be serious: Epidural hematomas, brain damage and cephalorrhachidian fistulas.^{4,6}

debe evitar desinsertar la musculatura glútea para evitar problemas en la deambulación.

El hueso es de origen endocondral y el material es fundamentalmente esponjoso, y por lo tanto, va a sufrir un proceso de reabsorción mucho mayor que los injertos membranosos y de tipo cortical.¹¹

La gran ventaja de este injerto estriba en el gran volumen de hueso cortical y esponjoso, en bloques o chips, que se puede obtener.

Las desventajas son: la necesidad de anestesia general y, molestias postoperatorias durante la deambulación. Otro tipo de complicaciones como el íleo paralítico son excepcionales.

Tibia

El injerto de tibia proporciona hueso esponjoso particulado, se puede obtener mediante un acceso lateral o medial a la tuberosidad tibial,^{12,13} trefinado posterior de la cortical y legrado de la esponjosa. La indicación fundamental de este injerto es el relleno en la elevación sinusal y en las cavidades quísticas.

Las ventajas son la facilidad de la técnica y su escasa morbilidad, siendo excepcionales las complicaciones, como la fractura de la meseta tibial.

Xenoinjertos

Se emplean sobretodo la hidroxiapatita porosa reabsorbible de origen bovino (Bio-Oss®). Con capacidad osteoconductora, permite el crecimiento de una trama ósea entre las partículas, presentando una reabsorción a largo plazo, proporcionando que la tasa de reabsorción final del injerto sea baja.

Su indicación fundamental es el relleno de cavidades, sobre todo en la elevación sinusal,¹⁴ Es también muy empleada en implantes inmediatos postextracción y en implantes fenestrados.

Distracción alveolar

La técnica se basa en los principios de Ilizarov,¹⁵ que observó como en pacientes con problemas de consolidación de fracturas, a los que sometía el callo de fractura a compresión mediante un aparato ortopédico, como estos accidentalmente por error giraban en sentido contrario los tornillos y al final se producía un alargamiento de los miembros inferiores. Demostró como se puede formar hueso mediante la realización de una osteotomía y posterior distracción, para formar en el *gap* del callo óseo, finalmente hueso. Los primeros estudios se realizaron en huesos largos, siendo Block¹⁶ en 1996 quien realizó la primera distracción alveolar en perros, usando como distractor los implantes, casi simultáneamente Chin¹⁷ publica las primeras distracciones alveolares en humanos, con el distractor intraóseo que diseñó.

La distracción alveolar tiene su indicación principal en el alargamiento vertical del sector anterior maxilar y mandibular, logrando un alargamiento del hueso y las partes blandas, con unos resultados muy predecibles y estables.^{2,18}

Ósea de los injertos y tasa de éxito

Un problema importante asociado a los injertos óseos es su tasa de reabsorción; ésta es menor en los injertos de origen membranoso y de tipo cortical, como ya hemos señalado. Cuando hablamos de aumentos horizontales la influencia de la tasa de reabsor-

Iliac crest

This is the most used graft in maxillofacial reconstruction,¹⁰ as a large volume of cortical-spongy bone is provided which is suitable for large reconstructions. The trap door technique is usually used, which avoids an unaesthetic depression of the crest. Releasing the gluteal muscles should be avoided in order to prevent any problems when walking.

The bone is of an endochondral origin and the material is basically spongy. The resorption process will therefore be much greater¹¹ than with membranous and cortical type grafts.

The great advantage of this graft lies in the large volume of cortical and spongy bone that can be obtained either in blocks or chips. The disadvantages are the need for general anesthesia and the postoperative discomfort when walking. Other types of complications such as paralytic ileus are exceptional.

Tibia

The tibia graft provides spongy bone chip which can be obtained by either accessing the tibial tuberosity either laterally or medially,^{12,13} and by the posterior trephination of the cortical bone and curettage of the spongy bone. The graft is basically indicated as filling material for sinus elevation and for cystic cavities. The advantages are the ease of the technique and the lack of morbidity. Complications such as fracture of the tibial plateau are exceptional.

Xenografts

Porous resorbable bovine hydroxyapatite (Bio-Oss®) is mainly used. This has osteoconductive properties, which allows bone growth among the particles, and which has long term resorption. The final rate of resorption of the graft is low. It is mainly indicated for filling cavities especially in sinus floor elevation.¹⁴ It is also used in postextraction immediate implants and in fenestrated implants.

Alveolar distraction

This technique is based on Ilizarov's¹⁵ principles, who observed patients with fracture consolidation problems, and whose fracture callus was submitted to compression using orthopedic apparatus. This resulted in the accidental turning of the screws in the opposite direction, and finally to the lengthening of the lower limbs. It showed how bone could be formed by carrying out an osteotomy and posterior distraction, and that bone would finally be formed in the gap of the bone callus. The first studies were carried out in long bones, and it was Block¹⁶ who in 1996 carried out the first alveolar distraction in dogs, using the implants as distractors, practically at the same time as Chin¹⁷ published the first human alveolar distraction osteogenesis with the intraosseous distractor that he designed.

The principal indication of alveolar distraction is for the vertical lengthening of the anterior portions of the mandible and maxilla. This achieves a lengthening of bone and soft tissue with very predictable and stable results.^{2,18}

ción en el resultado final, es relativa, habitualmente no compromete la colocación posterior de los implantes; pero en los casos de aumento vertical de cierta entidad los resultados son peores, especialmente en mandíbula donde los problemas asociados de partes blandas, las dehiscencias y la contaminación de saliva del injerto pueden hacer fracasar el procedimiento o asociar morbilidad.

Hay diversos estudios en la literatura que analizan o comparan el grado de reabsorción de injertos utilizados en cirugía preprotésica. Verhoeven,^{11,19} coloca un injerto de cresta ilíaca en mandíbula para la colocación de dos implantes y la rehabilitación posterior con una barra; en 30 pacientes seguidos durante 3 años, observa una tasa de reabsorción del 36% en el injerto; es muy interesante analizar su artículo posterior a los 10 años de carga del injerto, en los que observa sus resultados a largo plazo del estudio prospectivo, solamente un 51% de la altura del injerto permanece estable, y durante este tiempo han sido necesarias diversas intervenciones posteriores por periimplantitis asociada, sin embargo no se produce la pérdida de ningún implante.

En el hueso de origen membranoso la tasa de reabsorción es menor; Ikuza,⁹ apenas aprecia reabsorción cuando el injerto utilizado es el de calota craneal. Estos datos coinciden con los de Lenzen,²⁰ con tasas de un 10% de reabsorción.

Proussaefs y Lozada,²¹ señalan una reducción volumétrica del 17.58% en los injertos de rama ascendente utilizados para el aumento vertical en 8 pacientes, esperan un tiempo bastante variable para colocar los implantes (4-8 meses), señala exposición del injerto en 3 de los 8 casos, en uno de ellos es precoz y conduce a la necrosis del injerto.

Stellingsma,²² revisa la literatura para ver las diferentes soluciones a la mandíbula extremadamente reabsorbida: implantes transmandibulares, implantes cortos, injertos óseos y distracción alveolar. Los injertos óseos son colocados en forma *onlay* e *inlay*, y los implantes son colocados en una o dos fases. La reabsorción del injerto es menor en la técnica *onlay* y la colocación de los implantes en dos fases, a los tres o cuatro meses de la colocación del injerto. Por otro lado la colocación de los implantes en una fase, aunque acorta los tiempos quirúrgicos, dificulta la fase protésica, por la colocación no siempre adecuada de los mismos, además de la reabsorción no predecible del hueso alrededor del implante.²³ La tasa de supervivencia de los implantes que recoge Stellingsma oscila entre el 88 y el 100%. Las complicaciones locales asociadas son: dehiscencia de la herida, infección y trastornos sensitivos del nervio mentoniano.

Debido a las posibilidades de dehiscencia de la herida, contaminación y posibilidad de infección del injerto con la consiguiente pérdida del mismo, en las mandíbulas extremadamente reabsorbidas está descrito el abordaje submental extraoral con disección submucosa y disección del n.mentoniano. Además existe otro riesgo en estas mandíbulas y es la fractura del cuerpo mandibular. Bell,²⁴ realiza este método en mandíbulas extremadamente reabsorbidas con una altura inferior a los 7 mm, emplea la cresta ilíaca como injerto, reconstruyendo el cuerpo y la sínfisis mandibular y colocando los implantes en 2 fases en la zona sinfisaria. La ganancia de altura oscila entre los 9 y los 22 mm, la reabsorción de hueso antes de colocar los implantes a los 3-4 meses del injerto, es del 33% y a los 12

Bone resorption of grafts and success rate

A very important problem associated with bone grafts is the resorption rate, and this is lower in membranous and cortical grafts as previously indicated. When we refer to horizontal augmentation, the influence of resorption rates in the final result is relative, as usually this does not compromise the subsequent placement of the implants. However, in vertical augmentation cases of certain relevance the results are worse, especially in the mandible where the problems associated with soft tissues, dehiscence and saliva contamination of the graft, can lead to the procedures failing or to associated morbidity.

There are various studies in the literature that analyze or compare the rate of resorption of grafts used in preprosthetic surgery. Verhoeven,^{11,19} placed iliac crest grafts in the mandibles of 30 patients to facilitate the placement of two implants and the later rehabilitation with bars. The patients were followed for 3 years and a resorption rate was observed of 36% in the grafts. The analysis of their later article ten years after loading the grafts is very interesting, as the long term results of the prospective study are observed. Only 51% of the height of the graft remained stable and during this time various interventions were subsequently necessary for associated peri-implantitis. However, none of the implants were lost.

The rate of resorption of membranous bone is lower. Ikuza⁹ hardly noticed any resorption when calvarial bone grafts were used. This information coincides with that of Lenzen²⁰ who experienced a 10% resorption rate.

Proussaefs and Lozada²¹ reported a reduction in volume of 17.58% in grafts in the ascending ramus that were used for vertical augmentation in 8 patients. The interval before implant placement varied considerably (4 to 8 months) and they reported graft exposure in 3 out of the 8 cases. In one case there was early exposure leading to necrosis of the graft.

Stellingsma²² reviewed the literature in order to observe the different solutions for extremely resorbed mandibles: transmandibular implants, short implants, bone grafts and alveolar distraction. The bone grafts were placed using the onlay and inlay methods, and the implants were placed in one or two phases. The resorption of the graft was lower with the onlay technique and when the implants were placed in two phases, at three or four months of graft placement. On the other hand, if the implants are placed in a single phase, surgical time is shortened, but the prosthetic phase is more difficult because the implants are not always adequately placed, in addition to there being unpredictable resorption around the implant.²³ The rate of implant survival as reflected by Stellingsma varied between 88 and 100%. The associated local complications were: dehiscence of the wound, infection and sensory disturbance of the mental nerve.

Given the possibility of wound dehiscence, contamination and the possibility of graft infection and loss in extremely resorbed mandibles, the submental extraoral approach

meses de carga es inapreciable en la zona sinfisaria de carga de implantes y del 11% en el cuerpo de la mandíbula. En ningún caso hubo dehiscencia o infección del injerto. Nosotros hemos realizado este abordaje en algunos pacientes con gran reabsorción mandibular, empleando como injerto la calota, obteniendo buenos resultados, sin complicaciones locales asociadas.

Comentarios a los injertos

Desde mi punto de vista y basado en la experiencia personal y la bibliografía revisada, los injertos óseos suponen la mejor alternativa para el aumento óseo horizontal; las mejores opciones son el injerto de mentón o de rama ascendente para defectos medianos y pequeños respectivamente, y la cresta ilíaca para los casos de defectos amplios de déficit horizontal del maxilar y/o mandíbula. En los casos de defectos verticales pequeños los injertos de rama o mentón son una alternativa. En los casos de defectos verticales mayores, especialmente en el sector anterior maxilar y mandibular debemos buscar otras alternativas más predecibles, como la distracción alveolar.

Elevación sinusal: tipo de injertos a emplear y tasa de éxito (Fig. 2)

La elevación sinusal es considerada el método de elección para el aumento vertical maxilar posterior. El material de relleno a utilizar en la elevación de seno ha ido cambiando con el tiempo. Desde el inicio en que se consideraba como "gold estándar" el relleno con hueso autógeno, inicialmente con esponjosa de cadera y posteriormente con esponjosa de tibia, a las mezclas de hueso autógeno con PRP e hidroxiapatita en cócteles de

Figura 2. Elevación sinusal con hidroxiapatita bovina y colocación de implantes en una sola fase. A) Rebordado maxilar atrófico con distancia al seno de 4-5 mm, lo que permite colocar implantes simultáneos. B) Elevación sinusal. C) Colocación del injerto en la zona más interna del seno. D) Colocación de los implantes. E) Recompleta el relleno del seno.

Figure 2. Sinus floor elevation with bovine hydroxyapatite and placement of implants in a single phase. A) Atrophic maxillary ridge with a distance to the sinus of 4-5 mm, which allows placing implants simultaneously. B) Sinus floor elevation. C) Placement of graft in a more internal area of the sinus. D) Implant placement. E) Sinus once filled.

has been described with submucosal dissection and dissection of the mental nerve. There is, in addition, another risk with these mandibles, which is the fracture of the mandibular body. Bell²⁴ used this method in extremely resorbed mandibles with a height that was less than 7 mm, using iliac crest as a graft, reconstructing the mandibular body and symphysis and placing the implants in two phases in the symphyseal region. The gain in bone height varied between 9 and 22 mm. Bone resorption before placing the implants at 3 to 4 months of graft placement was 33%. At 12 months of loading it was inappreciable in the symphyseal region with the loaded implants, and 11% in the mandibular body. In none of the cases was there dehiscence or infection of the graft. We have used this approach in some of the patients with considerable mandibular resorption, using calvarial bone as graft material, achieving good results with no associated local complications.

Comments on the grafts

From my point of view and based on personal experience and the bibliography reviewed, bone grafts are the

diferentes recetas según el autor, al empleo de biomateriales en exclusividad, o incluso emplear celulosa (Surgicel®) o sólo el propio coágulo; todo ha valido para el seno maxilar. Ochandiano,²⁵ en una revisión reciente sobre el relleno de cavidades óseas en cirugía maxilofacial opina que el seno maxilar es un defecto no crítico y que los biomateriales en solitario y la estabilización el coágulo, y pueden ser suficientes para la osificación del seno.

Hallman,²⁶ realiza 36 elevaciones de seno, que aumenta con hueso particulado autógeno, hidroxiapatita bovina y mezcla de hidroxiapatita/hueso autógeno 80/20, tras un periodo de 6-9 meses coloca los implantes. En sus resultados a corto plazo, no encuentra diferencias significativas entre los tres grupos.

Schlegel,²⁷ en un estudio de boca dividida en 10 perros beagle, en los que un lado lo rellena con hueso autógeno y otro con Bio-Oss®, concluye que el Bio-Oss® es un buen material de relleno y que sufre menor reabsorción que el hueso autógeno.

Szabó,²⁸ en un estudio multicéntrico prospectivo de boca dividida, en 20 pacientes en los que emplea hueso autógeno en un lado y fosfato tricálcico (Cerasorb®) en el otro, no encuentra diferencias significativas entre ambos grupos.

Gray,²⁹ logra la regeneración del seno empleando simplemente como relleno la celulosa oxidada (Surgicel®). Lundgreen,³⁰ realiza la elevación del seno, suspende la membrana elevada y coloca implantes en reborde alveolar residual (4-10 mm), para mantener la elevación, simplemente con la estabilización de esta manera del coágulo formado, logra la osificación del seno.

Esposito,³ en su revisión de estudios ECA sobre técnicas de aumento óseo, concluye que los sustitutos óseos (Bio-Oss®, Cerasorb®) quizá sean igual de eficaces para aumentar los senos muy atróficos que los injertos autógenos.

Comentarios

Según los estudios revisados y mi propia experiencia, no existe razón actual para emplear el hueso autógeno en la elevación sinusal. El hueso autógeno tiene la desventaja de que necesita un área donante y muestra más reabsorción que el Bio-Oss®. La única desventaja de este último es que hay que diferir algo más el periodo de cicatrización para colocar los implantes, entre 6 a 9 meses.

Distracción alveolar y tasa de éxito

La distracción alveolar constituye un método predecible para el aumento vertical del hueso, y su tasa de complicaciones es muy baja,³¹ su mayor dificultad radica en dirigir adecuadamente el vector de distracción.^{2,4,32,33} Herford,³² describe diversos métodos de apoyo ortodóncico para realiza una distracción con un vector adecuado.

Bilbao,³³ realiza un total de 44 distracciones alveolares, considera un éxito 39 de ellas, porque se pudieron colocar los implantes en la forma correcta y porque se llevó el hueso a su posición deseada, sin necesitar otra técnica complementaria.

Stellingsma,²² considera a la distracción como un método eficaz de aumento anterior de la mandíbula extremadamente reabsorbida, en combinación con los implantes endo-óseos, aunque señala que son necesarios más estudios y a largo plazo.

best alternative for horizontal bone augmentation. The best options are grafts from the chin or the ascending ramus for medium and small defects respectively, and iliac crest for larger defects with horizontal deficiencies of the maxilla and or mandible. In cases of small vertical defects, ramus or chin grafts are an alternative. In cases of larger vertical defects, especially in the anterior portion of the maxilla and mandible we should look for alternatives that are more predictable such as alveolar distraction.

Sinus elevation:

type of grafts to be used and success rate

Sinus floor elevation is considered the method of choice for the vertical augmentation of the posterior maxilla. The filling material to be used in sinus floor elevation has changed over time. From the beginning in which autogenous bone was considered the gold standard, initially from spongy hip bone and spongy tibia bone, to the mixtures of autogenous bone with PRP and hydroxyapatite in cocktails with different recipes depending on the author, to the use of biomaterials on their own, or even the use of cellulose (surgicel®) or just the clot itself; everything has been tried in the maxillary sinus. In a recent review on bone filling in maxillofacial surgery, Ochandiano²⁵ was of the opinion that the maxillary sinus is a non-critical defect and that biomaterials on their own stabilize the clot and they can be sufficient for the ossification of the sinus.

Hallman²⁶ carried out 36 sinus elevations that were augmented using autogenous bone chip, bovine hydroxyapatite and a 80/20 mix of hydroxyapatite-autogenous bone. The implants were placed after a period of 6-9 months. The short term results showed no significant differences in the three groups.

Following a split mouth study involving 10 beagle dogs with autogenous bone filling in one side and Bio-Oss® in the other, Schlegel²⁷ concluded that Bio-Oss® is a good filling material and that it undergoes less resorption than autogenous bone.

Szabó²⁸ used, in a multicentric prospective split mouth study of 20 patients, autogenous bone in one side and tricalcium phosphate (Cerasorb®) in the other. Significant differences were not found between the groups.

Gray²⁹ achieved sinus regeneration using just oxidized cellulose (surgicel®). Lundgreen³⁰ carried out sinus elevation by suspending the raised membrane and by placing the implants on the residual alveolar ridge (4-10 mm) in order to maintain the elevation. Ossification of the sinus was achieved simply by stabilizing the clot that was formed in this way.

In his review of RCTs on bone augmentation techniques, Esposito³ concluded that bone substitutes (Bio-Oss, Cerasorb) were perhaps as efficient for augmenting very atrophic sinuses as autogenous grafts.

Chiapasco y cols.,³⁴ realizan un amplio estudio multicéntrico prospectivo sobre la distracción alveolar: 37 pacientes, 4 centros, 138 implantes, ganancia de hueso 9,9 mm (4-15). Los resultados que obtiene de este estudio son : tasa acumulativa de éxito tras 4 años de carga de los implantes del 94,2%, tasa acumulativa de supervivencia implantes 100%, 1 fracaso parcial con distracción incompleta, 5 casos con inclinación del fragmento de distracción, 0% infección, biopsias con osificación intramembranosa del *gap* de distracción, reabsorción ósea del fragmento distraído 0,3 mm, reabsorción periimplantaria 1,4 mm después de 4 años de carga. Concluye que la distracción es un método muy predecible y estable, se obtiene una gran ganancia ósea con baja tasa de morbilidad, la tasa de éxito y supervivencia de los implantes en el hueso generado por distracción, es similar a la del hueso normal residual alveolar.

Comentarios

La distracción alveolar es un método predecible y estable para el aumento alveolar vertical. Su mayor dificultad radica en el control del vector de distracción, que puede ser dificultoso en algunos casos. Su mayor indicación es para el sector anterior maxilar y mandibular, en el sector posterior maxilar no estaría indicada ya que la elevación sinusal es el método de elección, en el sector del cuerpo mandibular es útil si bien la técnica de distracción en esta zona es dificultosa.

Alternativas en cirugía preprotésica

Implantes cortos

Los implantes cortos de 10 mm o menos pueden suponer una alternativa válida en las mandíbulas edéntulas reabsorbidas, en las que se pueden colocar 4 implantes para una sobredentadura, y para el sector posterior mandibular, donde las otras alternativas como son los injertos o la distracción, son dificultosas o con resultados no siempre óptimos. En el caso de mandíbulas extremadamente reabsorbidas, aunque no muy frecuente, se pueden producir fracturas óseas,³⁵ de muy difícil tratamiento, al someter al estrés de la carga a un hueso tan débil, por lo que en este caso debemos valorar un reforzamiento mandibular con injertos y probablemente abordaje submental extraoral.²⁴

Stellingsma,²² en su revisión sobre los diferentes métodos para tratar la mandíbula atrófica con edentulismo, señala que los implantes cortos para sobredentadura en el sector sinfisario, tienen una tasa de supervivencia que varía del 88 al 100%, según las diferentes series y, en general, aprecia menor tasa de complicaciones asociadas que cuando se combinan los implantes con injertos óseos.

Arlin,³⁶ compara los implantes cortos de 6 u 8 mm, con los más largos de 10 a 18 mm, en sectores parcialmente edéntulos, no encontrando diferencias estadísticamente significativas en la supervivencia a los 2 años.

Espósito,³ considera a los implantes cortos, utilizados para una sobredentadura, como una alternativa de elección en los casos de mandíbulas muy reabsorbidas.

Comments

According to the studies reviewed and my own experience, there is currently no reason for using autogenous bone in sinus elevation. Autogenous bone has the disadvantage of requiring a donor site and it undergoes more resorption than Bio-Oss®. The only disadvantage of the latter is that the healing period before implant placement is delayed 6 to 9 months.

Alveolar distraction and success rate

Alveolar distraction represents a predictable method for the vertical augmentation of bone and the complication rate is very low.³¹ The major difficulty lies in suitably directing the distraction vector.^{2,4,32,33} Herford³² described various methods of orthodontic support for carrying out distraction osteogenesis with an adequate vector.

Bilbao³³ carried out a total of 44 alveolar distractions and 39 were considered a success because placing the implants correctly was possible and because bone was taken to the desired position, with no need for any complementary technique.

Stellingsma²² considered distraction osteogenesis as an efficient method for the augmentation of the anterior portion of extremely resorbed mandibles, in combination with endosseous implants, although it is pointed out that more long term studies are needed.

Chiapasco et cols,³⁴ carried out an extensive prospective multicentric study on alveolar distraction osteogenesis: 37 patients, 4 centers, 138 implants, bone gain of 9.9 mm (4-15). The results obtained in this study were: accumulated success after 4 years of loading the implants of 94.2%, accumulated rate of implant survival of 100%, 1 partial failure with incomplete distraction, 5 cases of inclination of distraction fragment, 0 % infection, biopsies with intramembranous ossification of the distraction gap, bone resorption of the distracted fragment 0.3 mm, peri-implant resorption 1.4 mm after 4 years of loading. It was concluded that distraction is a very predictable and stable method, considerable bone gain is achieved with a low rate of morbidity, and that the success and survival rate of implants in generated bone through distraction osteogenesis is similar to that of normal residual alveolar bone.

Comments

Alveolar distraction is a predictable and stable method for vertical alveolar augmentation. The greatest difficulty lies in controlling the distraction vector, which can be difficult in some cases. It is most indicated for the anterior portion of the maxilla and mandible. In the posterior portion of the maxilla it is not indicated as sinus floor elevation would be the method of choice. In the mandibular body portion it is useful, although the distraction technique in this area is difficult.

Figura 3. Atrofia maxilar después de un traumatismo dento-alveolar y del tercio medio facial. A) Imagen clínica con pérdida de incisivos y defecto de anchura. B) Imagen de la TC con reconstrucción virtual Simplant®. Nótese las miniplacas colocadas en la fractura de tercio medio. En la zona del 22 es mayor el defecto transversal, lo que provoca la fenestración palatina virtual del implante. C) Expansión con expansores roscados en la zona del 22. D) Lecho conseguido con los expansores. E) Colocación implante. F) Rehabilitación protética.

Figure 3. Maxillary atrophy after dento-alveolar trauma and trauma to the mid-third. A) Clinical view with loss of incisors and width defect. B) CAT scan with Simplant virtual reconstruction. Note the miniplates placed in the mid-third fracture. In the 22 area, the transverse defect is greater, which leads to the virtual palatine fenestration of the implant. C) Expansion with threaded expander in area 22. D) Bed achieved with expander. E) Placement of implant. F) Prosthetic rehabilitation.

Expansión cortical con osteotomos (Fig. 3)

Consiste en la expansión de las corticales del maxilar, introduciendo secuencialmente instrumentos de diámetro creciente para separar ambas estructuras óseas y crear un espacio que permita la inserción de un implante con una estabilidad primaria satisfactoria. Se utiliza en rebordes alveolares atróficos de 3-4 mm de diámetro, evitando de esta manera el empleo de un injerto óseo, en los casos de un defecto alveolar horizontal maxilar moderado.

Los dos sistemas de osteotomos que se emplean son los que se introducen mediante impactación o roscados. Estos últimos presentan la ventaja que evitan el traumatismo repetido desagradable para el paciente de los sistemas impactados durante su introducción.

Implantes angulados para evitar la elevación sinusal

En los casos en los que exista una patología del seno por sinusitis purulenta o sinusitis crónicas de repetición que la elevación sinusal no sea posible de realizar o haya fracasado, o que el paciente no desee una elevación sinusal, es posible salvar esta situación colocando un implante inclinado por delante del seno y otro por detrás (ptergoideo).

Esta técnica no debe ser realizada a ciegas, por tacto, para evitar la penetración accidental en el seno. La realizamos mediante un

Figura 4. FérulaCAD/CAM diseñada mediante software Simplant.
Figure 4. CAD/CAM splint designed using Simplant software.

Alternatives in preprosthetic surgery

Short implants

Short implants of 10 mm or under can represent a valid alternative for edentulous resorbed mandibles, in which 4 implants can be placed for one overdenture, and also in the posterior portion of the mandible, as other alternatives such as grafting or distraction are difficult and they do not always give the best results.

In extremely resorbed mandibles, which are not very common, bone fractures may occur³⁵ which are very difficult to treat, as such a weak bone is submitted to the stress of a load. In these cases mandibular reinforcement should be assessed with grafts and with, probably, an extraoral submental approach.²⁴

Stellingsma,²² in a review of different methods for treating atrophic edentulous mandibles, pointed out that short implants for overdentures in the symphyseal area, have a survival rate that varies between 88 and 100%, according to the different series, and in general a lower rate of associated complications can be appreciated than when implants are combined with bone grafts.

Figura 5. A) Caso de edentulismo con atrofia maxilar. En el lado izdo se realizó una elevación sinusal, en el lado decho no fue posible por una sinusitis purulenta. Como alternativa se planifican implantes angulados mediante sistema Simplant® con férulas CAD/CAM. B) Aspecto clínico maxilar atrófico. C) Colocación de los implantes según la planificación realizada. D) Rx post, nótese la elevación sinusal izda y los implantes angulados derechos. E) Prótesis final.

Figure 5. A) Case of edentulism with maxillary atrophy. Sinus elevation was carried out on the left side with maxillary atrophy. This was not possible on the right side due to purulent sinusitis. Angulated implants were planned using the Simplant® system with CAD/CAM splints. B) Clinical appearance of atrophic maxilla. C) Placement of implants according to the plan carried out. D) Post rx. Note sinus elevation on left side and angulated implants on right side. E) Final prosthesis.

sistema de planificación por *software*, Simplant® (Materialise) obtenido de la TC del paciente, virtualmente colocamos un implante por delante del seno y otro por detrás (en la zona de la pterigoides), damos una inclinación entre los 25-30 grados para no dificultar la rehabilitación protésica. Enviamos la planificación para conseguir unas férulas a medida mediante un sistema CAD/CAM (Fig. 4). Las 3 férulas que se obtienen permiten colocar los implantes mediante tres pasos de diámetro de fresa, con una dirección exacta a lo planificado virtualmente en el paciente; por último se colocan los implantes, logrando de esta manera rehabilitar el sector posterior maxilar en aquellos casos en los que no sea posible la elevación sinusal (Fig. 5).

Conclusiones (Tabla 1)

1. No es oro todo lo que reluce en la regeneración ósea. No existen remedios mágicos o únicos para generar hueso y cada técnica tiene su parte negativa (morbilidad y complicaciones).
2. Debemos individualizar cada caso y usar el método más adecuado según el defecto óseo que presente el paciente y sus características personales.
3. En los defectos horizontales (transversales o de anchura) la técnica de elección son los injertos óseos.

Arlin³⁶ compared short implants of 6 or 8 mm with longer ones of 10 to 18 mm in partially edentulous areas. No statistically significant differences were found in survival rates at 2 years.

Esposito³ considered short implants, used for overdentures as an alternative of choice in very resorbed mandibles.

Cortical expansion with osteotomes

This consists in expanding maxillary cortical bone, by introducing instruments with an increasing diameter in order to separate both bone structures and to create a space that will permit the insertion of an implant with satisfactory primary stability. This is used in atrophic alveolar ridges with a 3-4 mm diameter. The use of bone grafts in cases with moderate maxillary horizontal alveolar defects is in this way avoided.

The two types of osteotome techniques that are used are those that are introduced by means of pushing or screwing. The latter have the advantage of avoiding the unpleasant repetitive trauma for the patient of the pushing system when introduced.

Angled implants for avoiding sinus elevation

For cases in which there is a sinus pathology of purulent sinusitis or chronic recurring sinusitis, and sinus floor ele-

4. En el sector posterior maxilar superior la técnica de elección es la elevación sinusal y el material de relleno a emplear son los biomateriales.
5. La distracción alveolar es el método más predecible para el aumento vertical (de altura), en especial en el sector anterior.
6. En la mandíbula muy reabsorbida edéntula se deben considerar los implantes cortos como método de rehabilitación.
7. En la mandíbula extremadamente reabsorbida, se debe valorar la realización de injertos vía submental para evitar fracturas mandibulares de estrés.
8. El sector del cuerpo mandibular es el más incierto en cuanto al método de rehabilitación, se deben valorar los implantes cortos.

Tabla 1. Método de reconstrucción según el defecto óseo

Zona del defecto	Tipo defecto	Tipo reconstrucción
Anterior maxilar	Horizontal (de anchura)	Injerto óseo
Anterior maxilar	Vertical (de altura)	Distracción alveolar
Posterior Maxilar	Vertical	Elevación Sinusal
Anterior mandibular	Horizontal	Injerto óseo
Anterior mandibular	Vertical	Distracción Alveolar
Posterior mandibular	Horizontal	Injerto óseo
Posterior mandibular	Vertical	Implante corto
		Injerto óseo
		Distracción

Table 1. Reconstruction method according to bone defect

Area of defect	Type of defect	Type of reconstruction
Anterior maxilla	Horizontal (width)	Bone graft
Anterior maxilla	Vertical (height)	Alveolar distraction
Posterior maxilla	Vertical	Sinus elevation
Anterior mandible	Horizontal	Bone graft
Anterior mandible	Vertical	Alveolar distraction
Posterior mandible	Horizontal	Bone graft
Posterior mandible	Vertical	Short implant
		Bone graft
		Distraction

Bibliografía

1. Sutton DN, Lewis BRK, Patel M, Cawood JI. Changes in facial form relative to progressive atrophy of the edentulous jaws. *Int J Oral Maxillofac Implants* 2004; 33:676-82.
2. Salmerón JJ, Calderón J. Distracción alveolar. En: Navarro C. *Tratado de Cirugía Oral y Maxilofacial*. Madrid: Ed. Arán. 2004.
3. Esposito M, Grusovin MG, Coulthard P, Worthington HV. The efficacy of various bone augmentation procedures for dental implants: a Cochrane systematic review of randomized controlled clinical trials. *Int J Oral Maxillofac Implants* 2006;21:696-710.
4. Salmerón JJ, Valiente A. *Reconstrucción estructural preprotésica del maxilar superior*. En: López-Cedrún JL. *Cirugía reconstructiva y estética del tercio medio facial*. Ed. Arán Madrid 2005.
5. Clavero A, Clavero J. Regeneración del proceso alveolar: Injertos óseos. *Rev Esp Cir Oral y Maxilofac* 2002;24:285-97.
6. Baladrón J, Junquera LM, Díaz-Mauriño JC. Injertos óseos en cirugía implantológica. En: Navarro C. *Tratado de Cirugía Oral y Maxilofacial*. Madrid: Ed. Arán. 2004.
7. Zins JE, Whitaker LA. Membranous versus endochondral bone: implications for craniofacial reconstruction. *Plast Reconstr Surg* 1983;72:778-84.
8. Clavero J, Lundgren S. Ramus or chin grafts for maxillary sinus inlay and local onlay augmentation: comparison of donor site morbidity and complications. *Implant Dent Relat Res* 2003;5:154-60.
9. Iizuka T, Smolka W, Hallermann W, Mericske-Stern R. Extensive augmentation of the alveolar ridge using autogenous calvarial split bone grafts for dental rehabilitation. *Clin Oral Implants Res* 2004;15:607-15.
10. Hernández Alfaro F. *Injertos Óseos en Implantología*. Edit Quintessence Barcelona 2006.
11. Verhoeven JW, Cune MS, Terlou M, Zoon MA, de Putter C. The combined use of endosteal implants and iliac crest onlay grafts in the severely atrophic mandible; a longitudinal study. *Int J Oral Maxillofac Surg* 1997;26:351-7.

vation is not possible or it has failed, or if the patient does not desire sinus floor elevation, the situation can be salvaged by placing an angled implant in front of the sinus and another behind (pterygoid).

This technique should not be carried out blindly, using a sense of touch, so that accidentally penetrating the sinus is avoided. We carry this out using a planning system with Sim-

plise) software, obtained from the patient's CAT scan, and an implant is placed virtually in front of the sinus and another behind (in the area of the pterygoid), and they are tilted between 25-30 degrees so as not to hinder prosthetic rehabilitation. This planning analysis is sent away in order to obtain custom-made splints using a CAD/CAM system. The 3 splints that are obtained permit placing the implants with three twists of the bur's diameter. In the exact sense as was planned virtually in the patient. The implants are then placed, and the posterior portion of the maxilla is rehabilitated in those cases in which sinus floor elevation is not possible.

Conclusions (Table 1)

1. All that glitters is not gold. There are no magical or single remedies for generating bone, and each technique has its negative side (morbidity and complications).
2. Each case should be viewed individually and the most suitable method used, depending on the patient's bone defect and personal characteristics.
3. In horizontal defects (transverse or width) bone grafts are the technique of choice.
4. In the posterior portion of the upper jaw, the technique of choice is sinus floor elevation and the filling material to be used should consist of biomaterials.
5. Alveolar distraction osteogenesis is the most predictable method for vertical augmentation, especially in the anterior portion.

12. O'Keefe RM, Riemer BL, Butterfield SL. Harvesting of autogenous cancellous bone graft from the proximal tibial metaphysis: a review of 230 cases. *J Orthop Trauma* 1991;5:469-74.
 13. van Damme PHA, Merckx MAW. A modification of the tibial bone-graft-harvesting technique. *Int J Oral Maxillofac Surg* 1996;25:346-8.
 14. Riba F, del Amo A, Salmerón JI, Cuesta M. Cirugía preprotésica. En Martín-Granizo R. *Manual del residente de Cirugía Oral y Maxilofacial*. Madrid. Ed. ENE, 2004;343-65.
 15. Ilizarov GA. The tension-stress effect on the genesis and growth of tissues. Part II. The influence of the rate and frequency of distraction. *Clin Orthop* 1989;239:263-85.
 16. Block MS, Chang A, Crawford C. Mandibular alveolar ridge augmentation in the dog using distraction osteogenesis. *J Oral Maxillofac Surg* 1996;54:309-14.
 17. Chin M, Toth BA. Distraction osteogenesis in maxillofacial surgery using internal devices: review of five cases. *J Oral Maxillofac Surg* 1996;54: 45-53.
 18. Salmerón JI, Riba F. Distracción alveolar. *Gaceta Dental* 2004;150:52-63.
 19. Verhoeven JW, Cune MS, Ruijter J. Perimucosal implants combined with iliac crest onlay grafts used in extreme atrophy of the mandible: long-term results of a prospective study. *Clin Oral Implants Res* 2006;17: 58-66.
 20. Lenzen C, Meiss A, Bull HG. Augmentation of the extremely maxilla and mandible by autologous calvarial bone transplantation. *Kiefer Gesichtschir* 1999;3(supl. 1):40-2.
 21. Proussaefs P, Lozada J, Kleinman A, Rohrer M. The use of autogenous block Grafts for vertical ridge augmentation and implant placement: a pilot study. *Int J Oral Maxillofac Implants* 2002;17:238-48.
 22. Stellingsma C, Vissink A, Meijer HJA, Kuiper C, Raghoobar GM. Implantology and the severely resorbed edentulous mandible. *Crit Rev Oral Biol med* 2004;15: 240-8.
 23. Vermeeren JJF, Wismeijer D, Van Waas MAJ. One-step reconstruction of the severely resorbed mandible with onlay bone grafts and endosteal implants. *Int J Oral maxillofac Surg* 1996;25:112-5.
 24. Bell RB, Blakey GH, White RP, Hillebrand DG, Molina A. Staged reconstruction of the severely atrophic mandible with autogenous bone graft and endosteal implants. *Int J Oral Maxillofac Surg* 2002;60:1135-41.
 25. Ochandiano S. Relleno de las cavidades óseas en cirugía maxilofacial con materiales aloplásticos. *Rev Esp Cir Oral y Maxilofac* 2007;29:21-32.
 26. Hallman M, Sennerby L, Lundgren S. A clinical and histologic evaluation of implant integration in the posterior maxilla after sinus floor augmentation with autogenous bone, bovine hydroxyapatite, or 20:80 mixture. *Int J Oral Maxillofac Implants* 2002;17:635-43.
 27. Schlegel KA, Fichtner G, Schultze S, Wiltfang J. Histologic Findings in sinus augmentation with autogenous bone chips versus a bovine bone substitute. *Int J Oral Maxillofac Implants* 2003;18:53-8.
 28. Szabó G, Huys L, Coulthard P, Maiorana C, Garagiola U, Barabás J, Nemeth Z, Hrabak K, Suba Z. A prospective multicenter randomized Clinical trial of autogenous bone versus, -tricalcium phosphate graft alone for bilateral sinus elevation: histological and histomorphometric evaluation. *Int J Oral Maxillofac Implants* 2005;20:371-81.
 29. Gray CF, Redpath TW, Bainton R, Smith FW. Magnetic resonance imaging assessment of a sinus lift operation using reoxidised cellulose (Surgicel®) as graft material. *Clin Oral Impl Res* 2001;12:526-30.
 30. Lundgren S, Andersson S, Gualini F, Sennerby L. Bone reformation with sinus membrane elevation: a new surgical technique for maxillary sinus floor augmentation. *Clin Impl Dent Res* 2004;6:165-73.
 31. Garcia A, Somoza M, Gándara P, López J. Minor complications arising in alveolar distraction osteogenesis. *J Oral Maxillofac Surg* 2002;60: 496-501.
 32. Herford A, Audia F. Maintaining Vector control during alveolar distraction osteogenesis: A technical note. *Int J Oral Maxillofac Implants* 2004;19:758-62.
 33. Bilbao A. Regeneración del proceso alveolar: Distracción ósea. *Rev Esp Cir Oral y Maxilofac* 2002;24:298-303.
 34. Chiapasco M, Consolo U, Bianchi A, Ronchi P. Alveolar distraction osteogenesis for the correction of vertically deficient edentulous ridges: a multicenter prospective study of humans. *Int J Oral Maxillofac Implants* 2004;19:399-407.
 35. Raghoobar GM, Stellingsma K, Batenburg RH, Vissink A. Etiology and management of mandibular fractures associated with endosteal implants in the atrophic mandible. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 2000;89:533-59.
 36. Arlin M. Short dental implants as a treatment option: results from an observational study in a single private practice. *Int J Oral Maxillofac Implants* 2006;21:769-76.
6. In very resorbed edentulous mandibles, short implants should be considered as a rehabilitation method.
 7. In extremely resorbed mandibles, placing grafts using a submental approach should be assessed in order to avoid mandibular stress fractures.
 8. The mandibular body is the most unpredictable with regard to rehabilitation and the use of short implants should be considered.