¿Cuál sería su diagnóstico y su manejo terapéutico?

What should the diagnosis and treatment be?

Presentamos el caso de un varón de 35 años sin antecedentes personales de interés intervenido 8 años antes en el Hospital Universitario del Valle Calí (Colombia) de un meningioma frontal, desconociéndose datos quirúrgicos y radiológicos de la cirugía de exéresis tumoral. En el primer año tras la cirugía el paciente refiere crisis comiciales. Posteriormente recibió tratamiento complementario con radioterapia, retirada del colgajo óseo frontal y reconstrucción frontal con malla de titanio. Tras sufrir repetidos cuadros de celulitis frontal es remitido a nuestro servicio desde su Hospital de referencia para tratamiento quirúrgico definitivo y reconstrucción frontal.

En la exploración física se aprecia el relieve que produce la malla de titanio y la supuración crónica a nivel frontal (Fig. 1). Al paciente se le realizó un CT craneal en el que se observa la malla de titanio colocada entre la piel y la duramadre cubriendo el defecto óseo frontal (Fig. 2).

Ante una situación como ésta ¿cuál sería su plan terapéutico?

Figura 1. Imagen preoperatoria.
Figure 1. Preoperative image.

Figura 2. CT axial preoperatorio.
Figure 2. Preoperative axial CT.

We report the case of a 35 year-old man with no relevant medical history who had undergone surgery 8 years earlier at the Valle Calí University Hospital (Colombia) for frontal meningioma. Surgical and radiological information about the intervention to excise the tumor was unavailable. The patient suffered seizures in the first year after surgery. The patient later received complementary treatment consisting of irradiation, removal of the frontal bone flap, and frontal reconstruction with titanium mesh. After experiencing repeated episodes of frontal cellulitis, he was referred to our department by his reference hospital for definitive surgery and frontal reconstruction.

The texture of the titanium mesh and chronic frontal supuration were appreciable in the physical examination (Fig. 1). Cranial CT revealed the titanium mesh positioned between the skin and dura mater covering the frontal bone defect (Fig. 2).

In this situation, what therapeutic strategy would you use?

Posibilidades reconstructivas en cirugía de base-bóveda craneal frontal. A propósito de 1 caso

Reconstructive possibilities in surgery of the frontal skull base and cavity. A case report

I. Heras Rincón¹, I. Zubillaga Rodríguez², G. Sánchez-Aniceto², R. Gutiérrez Díaz², J.J. Montalvo Moreno³

Dada la situación del paciente se plantea un tratamiento quirúrgico y reconstructivo frontal. Tras realizar un CT craneal y de macizo facial previo se decidió optar por el siguiente procedimiento quirúrgico bajo anestesia general e intubación orotraqueal: reapertura de abordaje coronal sobre cicatriz previa y retirada de malla de titanio frontal (Fig. 3) observándose la impronta dejada por el material de osteosíntesis en la duramadre (Fig. 4), disección de vasos temporales superficiales, obtención de colgajo libre microvascularizado de epiplon (Fig. 5) y colocación del mismo en fosa craneal anterior obliterando el espacio muerto (Fig. 6) con microanastomosis termino-terminal de arteria y vena temporal superficial a vasos epiploicos (Fig. 7). Al mismo tiempo se coloca parche de Tutopatch para reparar un defecto dural.

El paciente fue dado de alta debido a la buena evolución clínica (Fig. 8) y se decide esperar para realizarle una cranioplastia. Como veremos más adelante el problema fundamental, llegados a este punto, es la elección del biomaterial a utilizar ya que aunque existe bastante bibliografía al respecto no existe un consenso entre autores. Ocho meses después se decide intervenir al paciente para tratamiento reconstructivo de su defecto óseo frontal. De nuevo bajo anestesia general e intubación orotraqueal se realiza reapertura del abordaje coronal, legrado de la mucosa del seno frontal y obturación del mismo con colgajo libre remanente de epiplon y colocación de implante preformado de acrílico (Fig. 9) (Synthes®) fijado con 4 placas 1,3 mm (Synthes®). Finalmente el paciente es dado de alta con CT de control realizado en su centro de referencia con el excelente resultado estético y funcional que se muestra 6 meses después de realizar la cranioplastia (Figs. 10 y 11).

Frontal surgery and reconstruction were planned due to the patient's situation. After CT of the skull and facial massif, the following surgical procedure was performed under general anesthesia with orotracheal intubation: reopening of the previous scar using a coronal approach and removal of the frontal titanium mesh (Fig. 3), which revealed the imprint of the osteosynthetic material on the dura mater (Fig. 4); dissection of superficial temporal vessels to obtain a microvascularized free omental flap (Fig. 5) that was positioned in the cranial fossa after obliterating the dead space (Fig. 6); and completion with end-to-end microanastomosis of the superficial temporal artery and vein to omental vessels (Fig. 7). A Tutopatch was used to repair a dural defect.

The patient was released as a result of his favorable clinical course (Fig. 8) and cranioplasty was deferred. The fundamental problem, which we will examine in greater detail below, is the choice of biomaterial to be used. There is sufficient bibliography on the matter, but no consensus among authors. Eight months later, the patient underwent surgery to reconstruct the frontal bone defect. The skull was reopened again, under general anesthesia with orotracheal intubation, using a coronal approach. Curettage of the frontal sinus mucosa was performed and the sinus was closed with a free residual omental flap and a performed acrylic implant (Fig. 9) (Synthes®) fixed with four 1.3 mm plates (Synthes®). Finally, the patient was released with CT follow-up in the reference hospital. The aesthetic and functional result 6 months after cranioplasty was excellent (Figs. 10 and 11).

Discussion

We report a case that was technically complicated and a therapeutic challenge for several reasons. Firstly, a solution to a sequela of neurosurgical resection had to be devised without any knowledge of the tumoral exeresis performed or any report on the intervention, histopathology, or radiography. Secondly, the surgical bed (anterior cranial fossa) had to be isolated from a contaminated area, the paranasal sinuses. Thirdly, the dural defect derived from tumor resec-

¹ Médico Residente.

² Médico Adjunto.

³ Jefe del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial.
Hospital Universitario 12 de octubre. Madrid, España

Correspondencia:

Dr. Ignacio Heras Rincón
Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial.
Hospital Universitario 12 de octubre.
Avenida de Córdoba s/n, 28041 Madrid, España
Email: nachohr1@hotmail.com

Discusión

Planteamos un caso de un paciente complicado no sólo técnicamente sino también en la actitud terapéutica a tomar que plantea un reto por varios motivos. En primer lugar el intentar solucionar una secuela de una resección neuroquirúrgica sin conocer datos de la exéresis tumoral ni aportar ningún informe ni de la cirugía, ni de anatomía patológica ni de la radioterapia recibida. En segundo lugar se plantea la necesidad de aislar el lecho quirúrgico (fosa craneal anterior) de un ambiente contaminado, como son los senos paranasales. En tercer lugar hay que cerrar el defecto dural derivado de la resección tumoral y en cuarto y último lugar es necesario reconstruir el defecto óseo frontal. Sin olvidar finalmente que se trata de un paciente radiado, hecho que empeora considerablemente la vascularización local y que limita nuestras posibilidades reconstructivas.

La cirugía de base de cráneo se ha visto sometida a una revolución en las dos últimas décadas debido al desarrollo de nuevos abordajes a éste complejo área anatómico. Los neurocirujanos, en concierto con los nuevos cirujanos de cabeza y cuello, han cambiado los parámetros de aquello considerado hasta ahora como "no resecable"¹ creando cada vez defectos mayores en la base craneal. Sin embargo dicha revolución no hubiese sido posible sin nuevas técnicas de reconstrucción. Los recientes avances en radiología, técnica microquirúrgica y de reconstrucción han permitido que la cirugía craneofacial se haya convertido en el tratamiento de elección de la patología tumoral en la fosa craneal anterior.²⁻⁶

Cualquier defecto en la base craneal que ponga en comunicación el contenido intracraneal con la cavidad nasal o senos paranasales tiene que ser reconstruido. Clásicamente dicho defecto era cubierto con capas de tejido no vascularizado (fascia lata o materiales sintéticos...). Esto puede producir necrosis, fístula de LCR e infección que puede tener fatales consecuencias en forma de meningitis o absceso cerebral. El uso de tejidos vascularizados como colgajos locales o libres vascularizados ha disminuido considerablemente la morbilidad y mortalidad asociadas.⁷

Figura 3. Malla retirada.
Figure 3. Removal of mesh.

Figura 4. Duramadre con impronta de la malla de titanio.
Figure 4. Dura mater with titanium mesh imprint.

Figura 5. Obtención de colgajo libre de epiplon.
Figure 5. How free omental flap was obtained.

tion had to be closed, and fourthly and finally, the frontal bone defect had to be reconstructed. In addition, we could not overlook the fact that the patient had been irradiated, which considerably worsens local vascularization and reduces the reconstructive options.

Surgery of the skull base has been revolutionized in the last two decades because of the development of new approaches to this complex anatomical area. Neurosurgeons, hand-in-hand with the new head and neck surgeons, have changed the parameters of what was once considered "nonresectable."¹ Increasingly larger defects are being created in the skull base. This revolution, however, would not have been possible without new reconstruction techniques. Recent advances in radiology, microsurgical techniques, and reconstruction have made craniofacial surgery the treatment of choice for tumoral pathology of the anterior cranial fossa.²⁻⁶

Any defect in the skull base that communicates the intracranial content with the nasal cavity or paranasal sinuses must be reconstructed. Traditionally, such defects were covered with layers of nonvascularized tissue (fascia lata or synthetic materials, among others). This can produce necrosis, CSF fistula, and infection, which may have fatal consequences in the form of meningitis or cerebral abscess. The use of vascularized tissue in local or free vascularized flaps has considerably diminished associated morbidity and mortality.⁷

Local flaps, like galea-pericranial aponeurosis or temporal muscle, can be used successfully to close small cranial defects of the anterior cranial fossa. Medium-to-large defects require the use of free flaps, which provide reliable vascu-

Los colgajos locales, como la galea-pericráneo o el músculo temporal, pueden ser utilizados con éxito en los defectos craneales de pequeño tamaño en la fosa craneal anterior. Defectos moderados y mayores requieren el uso de un colgajo libre que además de aportar una vascularización fiable y un mayor volumen, tiene una adaptabilidad y flexibilidad mayor que permite obliterar mejor el espacio muerto y conseguir un mejor resultado estético. Ante un paciente radiado previamente, es imperativo el uso de un colgajo libre debido al estado deficiente de la vascularización local.

La cirugía de la base craneal requiere el esfuerzo de un equipo multidisciplinar. Tras la resección es fundamental aislar adecuadamente el Sistema Nervioso Central. Dicho aislamiento comienza por la duramadre. Si existe un desgarró dural debe ser suturado si es posible, si no lo es o existe un defecto dural secundario a la resección debe ser reparado con un injerto de fascia lata del propio paciente o parches heterólogos. A continuación el tejido dural debe ser cubierto con una capa de tejido bien vascularizado. Una reparación con éxito del defecto dural no parece depender necesariamente del material que se utilice sino de que aporte de verdad un sellado eficaz (*watertight-seal*).^{8,9} La elección del colgajo libre a utilizar depende de varios factores como son el tamaño del defecto, la longitud del pedículo que se necesita, y las preferencias del cirujano. Los vasos receptores locales de elección suelen ser ramas de la arteria carótida externa (especialmente la arteria occipital) y la venas yugular externa, yugular interna o alguna de sus ramas. La monitorización post-quirúrgica del colgajo puede hacerse por eco-doppler o con un tutor que comunique con el exterior. El colgajo libre de elección para muchos continúa siendo el recto anterior del abdomen debido a su alta vascularización y el gran volumen que aporta y la longitud y tamaño de su pedículo, aunque se han descrito innumerables colgajos. En nuestro paciente nos decidimos por un colgajo libre de epiplon que tiene una mayor adaptabilidad y nos permite obliterar mejor el espacio muerto. De ese modo evitaremos la formación de colecciones que pueden

Figura 6. Colocación de colgajo libre de epiplon obliterando el espacio muerto en fosa craneal anterior.

Figure 6. Positioning of free omental flap to obliterate dead space in anterior cranial fossa.

Figura 7. Anastomosis de vasos temporales a vasos epiplóicos.

Figure 7. Anastomosis of temporal vessels to omental vessels.

Figura 8. Imagen clínica tras la colocación de colgajo libre de epiplon antes de realizar la cranioplastia.

Figure 8. Clinical image after positioning free omental flap and before cranioplasty.

larization and more volume, are more adaptable and flexible, better obliterate dead space, and improve the aesthetic outcome. Free flaps must be used imperatively in previously irradiated patients because of the deficient state of their local vascularization. Surgery of the skull base requires the efforts of a multidisciplinary team. It is essential to properly isolate the central nervous system after resection. Isolation begins with the dura mater. Dural tears must be sutured, if possible. If not possible or in the case of dural defects secondary to resection, the defect must be repaired with an autologous fascia lata graft or with heterologous patches. The dural tissue then must be covered with a well vascularized layer of tissue. Successful repair of the dural defect seems to depend less on the material used than on achieving a truly watertight seal.^{8,9} Choice of the free flap to be used depends on several factors, such as the defect size, required pedicle length, and preferences of the surgeon. The local receptor vessels of choice are usually branches of the external carotid artery (especially the occipital artery) and external jugular or internal jugular veins and their branches. The flap can be monitored postoperatively by echo-Doppler or a tube that communicates with the outside. The free flap of choice for many continues to be the rectus abdominis, due to its good vascularization, large volume, and the length and size of the pedicle. Nonetheless, innumerable

flaps have been described. We decided to use a free omental flap in our patient because it is adaptable and allows us to obliterate dead space more effectively. This prevents fluid accumulations that can become infected and cause therapeutic

sobreinfectarse y hacer fracasar nuestro plan terapéutico. Independientemente del colgajo libre utilizado hay una menor tasa de complicaciones que cuando se utilizan colgajos locales y ello se traduce en una mejor cicatrización, menor tasa de fístula de LCR y de meningitis y una menor estancia hospitalaria.¹⁰

Una vez hemos conseguido separar adecuadamente la fosa craneal anterior de los senos paranasales debemos reconstruir el defecto óseo frontal por debajo del colgajo libre que utilizemos.

Las indicaciones fundamentales para realizar una cranioplastia son la protección frente al trauma y mejorar el aspecto estético.¹¹ Actualmente defectos mayores de 16 cm² deben ser reconstruidos, defectos menores a nivel fronto-orbitario pueden ser reconstruidos con una finalidad estética. A nivel frontal, el problema no lo plantea la indicación de la reconstrucción sino el material a utilizar. En un CT realizado antes de la cranioplastia puede apreciarse el defecto frontal que presenta nuestro paciente (Fig. 12).

Desde la antigüedad muchos han sido los materiales a utilizar y hasta hoy en día no existe ninguno que sea de clara elección. El hueso autógeno tiene varios inconvenientes que limitan su uso como son la morbilidad de la zona donante, la limitada cantidad de hueso y que se ve sometido a una reabsorción variable. A pesar de ello para muchos autores continúa siendo el biomaterial de elección para defectos de poco tamaño. El Metilmetacrilato es una buena opción por su relativo bajo coste, gran disponibilidad y alta resistencia a la infección (Manson et al. publicaron que era el biomaterial de elección en adultos con partes blandas de buena calidad sin historia previa de infección)¹² aunque no deja de ser una sustancia inerte que no se adapta al hueso cambiante (lo cual limita su uso en población pediátrica) ni promueve regeneración ósea alguna. Hard Tissue Replacement (HTR) tiene la gran ventaja de que puede ser fabricado a medida del paciente por medio de

Figura 9. Imagen intraoperatoria de la cranioplastia.
Figure 9. Intraoperative cranioplasty image.

Figura 10. Imagen a los 6 meses de realizar la cranioplastia.
Figure 10. Image 6 months after cranioplasty.

Figura 11. CT axial a los 6 meses de realizar la cranioplastia.
Figure 11. Axial CT 6 months after cranioplasty.

failure. Regardless of the free flap used, there is a lower rate of complications than with local flaps, which translates into better healing, a lower rate of meningitis and CSF fistula, and a shorter hospital stay.¹⁰

When we have properly isolated the anterior cranial fossa from the paranasal sinuses, we must reconstruct the frontal bone defect below the free flap.

The main indications for cranioplasty are protection against injury and improved aesthetic outcome.¹¹

Defects greater than 16 cm² must be reconstructed, whereas minor fronto-orbital defects may be reconstructed for aesthetic purposes. The problem in the frontal area is not the indication for reconstruction, but the most appropriate material to be used for reconstruction. A CT made before cranioplasty shows our patient's frontal defect (Fig. 12).

Since ancient times, many materials have been used to close frontal defects, but even now there is no clear choice. Autologous bone has several disadvantages that restrict its use, such as the morbidity of the donor zone, the limited amount of bone available, and variations in resorption. It is the biomaterial of choice for small defects for many authors. Methylmetacrylate is a good option due to its relatively low cost, availability, and resistance to infection (Manson et al. reported that it was the biomaterial of choice in adults with soft tissues of good quality and no history of infection).¹² However, it is an inert substance that cannot adapt to changes in the bone (thus limiting its use in children) or promote bone regeneration.

modelos estereolitográficos por ordenador. Además su porosidad y sus características hidrofílicas promueven crecimiento vascular en él. Pastas de Hidroxiapatita pueden ser utilizadas, tanto en forma de cerámicas (no reabsorbibles) como en forma de cemento (que sí que son reabsorbibles). Aunque suponen un excelente biomaterial no existe evidencia histológica hasta el momento de que en pastas de cemento de hidroxiapatita se produzca crecimiento óseo significativo (sólo se ha descrito invasión ósea en la periferia del implante)¹³ o reabsorción en humanos en un periodo de seguimiento de hasta tres años. Tampoco se ha visto crecimiento óseo significativo en estudios en animales tras tres años de seguimiento.¹⁴ Pueden ser utilizadas tanto en adultos como en niños y su punto débil es su fragilidad que las predisponen a infección por fracturarse ante mínimos traumatismos. Es ésta fragilidad lo que ha llevado a combinarlas con mallas de titanio, fijadas con osteosíntesis al hueso circundante, que actúen como andamiaje por debajo de las mismas en defectos craneales de espesor total.

Las características ideales de éste material incluirían: biocompatibilidad, ausencia de respuesta inflamatoria o a cuerpo extraño, radiolúcido, fácilmente moldeable, no reabsorbible, osteoactivo y fácilmente disponible.

Como ocurre en nuestro paciente, en muchas ocasiones el defecto craneal es consecuencia de una resección tumoral. Se podría pensar que es mejor para el paciente una cranioplastia en el primer acto quirúrgico sin embargo esto no es así por varios motivos. En la resección pueden darse circunstancias que desaconsejen una reconstrucción primaria como defectos duros y comunicación con cavidades contaminadas como los senos paranasales. Introducir un cuerpo extraño eleva considerablemente el riesgo de sufrir una infección local que además de poner en riesgo la vida del paciente puede estropear cualquier procedimiento reconstructivo previo en la zona y obliga a retirar el implante. Además el cierre del defecto frontal puede contribuir junto con el edema cerebral del post-operatorio inmediato a una elevación de la presión intracraneal. Infecciones locales son una contraindicación para realizar una cranioplastia. Se recomienda esperar como mínimo menos seis meses y después de un tratamiento antibiótico adecuado, para asegurar la cranioplastia. Del mismo modo se recomienda esperar al menos seis meses para reabrir un abordaje coronal.

Por lo mencionado anteriormente, en nuestro paciente se esperó ocho meses después de la colocación del colgajo libre de epiploon para colocar un implante preformado de acrílico fabricado a medida del paciente con modelos estereolitográficos por ordenador y fijado con microplacas de titanio.

Figura 12. CT 3D en el que se aprecia el defecto frontal de nuestro paciente.

Figure 12. 3-D CT showing patient's frontal defect.

The advantage of hard tissue replacement (HTR) is that it can be custom-fitted for each patient using computerized stereolithographic models. In addition, its porosity and hydrophilic properties promote vascular penetration of the material. Hydroxyapatite paste in the form of ceramics (non-resorbibles) or cement (resorbible) can be used. Hydroxyapatite cement is an excellent biomaterial, but there is still no histological evidence that much bone growth (osseous invasion has only described on the periphery of implants)¹³ or bone resorption occurs in humans in a follow-up period of up to three years. Little bone growth has been observed in

animal studies after three years of follow-up.¹⁴ Hydroxyapatite pastes can be used in both adults and children. Its weak point is a predisposition to infection because the material fractures with minimal trauma. This fragility has inspired combinations with titanium mesh affixed by osteosynthesis to the surrounding bone, which acts as scaffolding for the material in total thickness cranial defects.

The ideal characteristics of a material would include: biocompatibility, absence of foreign-body inflammatory response, radiolucency, malleability, nonresorbible, osteoactive, and easily available.

Cranial defects often are the consequence of a tumor resection, as in the case of our patient. One would think that cranioplasty in the first surgical intent would be better for the patient, but this is not so for several reasons. The circumstances of the resection, such as dural defects and communication with contaminated cavities like the paranasal sinuses, may make primary reconstruction inadvisable. Introduction of a foreign body considerably raises the risk of local infection that, aside from being life-threatening for the patient, can spoil any previous reconstructive procedure in the area and make it necessary to remove implants. Closure of the frontal defect also can contribute, together with the immediate postoperative cerebral edema, to raising intracranial pressure. Local infections are a contraindication to cranioplasty. A wait of at least six months and suitable antibiotic treatment is recommended for successful cranioplasty. A six-month wait before reopening a coronal approach is recommended.

As mentioned above, our patient waited eight months after the free omental flap was installed before a preformed acrylic implant that was custom-fitted for the patient with computerized stereolithographic models was positioned and fixed with titanium microplates.

Bibliografía

1. Theodoros Teknos N, Jonathan Smith C, Terry Day A, James Netterville L, Brian Burkey B. Microvascular Free Tissue Transfer in Reconstructing Skull Base Defects: Lessons Learned. *Laryngoscope* 2002;112:1871-6.
2. Torres A, Acebes JJ, López L, Marnov A, Viñals J, Serra JM, Maños M, Monner A. Complicaciones de la cirugía craneofacial en tumores de base craneal anterior. *Neurocirugía* 2005;16:492-8.
3. Días FL, Sa GM, Kligernan J, et al. Complication of craneofacial resection. *Head Neck* 1999;21:12-20.
4. Gutierrez Díaz R, Sánchez Aniceto G, Romance A, Lobato R, Cabrera A, Alday R. Resección craneofacial anterior. *Neurocirugía* 1999;10:277-83.
5. Nelly MBH, Waterhouse D, Slade E, et al. A 5-year review of 71 consecutive anterior skull base tumors. *Br J Plastic Surg* 1999;53:184-90.
6. Patel SG, Singh B, Polluri A, Bridger PG, et al. Craniofacial surgery for malignant skull base tumors. Report of an international Collaborative study. *Cancer* 2003;98:1179-87.
7. Georgantopoulou A, Hodkinson PD, Gerber CJ. Cranial-base surgery: a reconstructive algorithm. *Br J Plastic Surg* 2003;56:10-3.
8. West CA, Towns G, Bachelor AG, Liddington MI. Reconstruction of skull base and dura using rectus abdominis muscle combined with a vascularised fascial perforator flap. *Journal of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery* 2006;59:631-5.
9. Chang DW, Langstein HN, Gupta A, De monte F, Do KA, Wang X, Robb G. Reconstructive Management of Cranial Base Defects after Tumor Ablation. *Plast Reconstr Surg* 2001;107:1346-55.
10. Neligan PC, Mulholland S, Irish J, y cols. Flap selection in cranial base reconstruction. *Plast Reconstr Surg* 1996;98:1159-08.
11. Gladstone HB, McDermott MW, FRCSC, Cooke DD. Implants For Cranioplasty. *Otolaryngologic Clinics of North América April* 1995;28:2:381-400.
12. Manson PN, Crawley WA, Hoopes JE. Frontal Cranioplasty: Risk factors and choice of cranial vault reconstruction. *Plast Reconstr Surg* 1986;77:888-904.
13. Gosain AK. Biomaterials for reconstruction of the cranial vault. *Plast Reconstr Surg* 2005;116:663-6.
14. Gosain AK, Riordan PA, Song L, Amarante MT, Kalantarian B, Nagy PG, Wilson CR, Toth JM, McIntyre BL. A 1-year study of osteoinduction in hydroxyapatite-derived biomaterials in an adult sheep model: part II. Bioengineering implants to optimize bone replacement in reconstruction of cranial defects. *Plast Reconstr Surg* 2004;114:1155-63;discussion 1164-5.