¿Cuál es su diagnóstico?

What's your diagnosis?

Mujer de 29 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas y sin antecedentes médicos de interés, que acude a urgencias por inflamación hemifacial de una semana de evolución. La paciente refería dolor crónico a nivel mandibular izquierdo, trismo moderado y disfagia leve.

En la exploración física se objetiva un severo trismus y evidentes signos de inflamación a nivel del ángulo mandibular izquierdo, palpándose masa de consistencia firme y dolorosa. No se apreció movilidad patológica ni dolor a la percusión de ninguna pieza dentaria.

En la ortopantomografía se identificaba una imagen radiolúcida de bordes definidos y aspecto multilocular que ocupaba el cuerpo, ángulo, rama y cóndilo mandibular izquierdo, que incluía las raíces de la pieza 37. Adyacente a la imagen quística se observaba la pieza 38 incluida (Fig. 1).

Se realizó estudio de TC cervicofacial con contraste en el que se identificó una lesión de agresividad alta en hemimandíbula izquierda con expansión ósea, adelgazamiento de corticales y rotura de la cortical medial de la rama ascendente, con lesión de partes blandas asociada de dimensiones 2 x 0,8 x 0,5 cm. adyacente a la rama ascendente (Fig. 2).

Con el diagnóstico de presunción de quiste mandibular sobreinfectado con colección adyacente, se instauró tratamiento antibiótico.

Figura 1. OPG preoperatoria.
Figure 1. Preoperative OPG.

Figura 2. TC preoperatoria.
Figure 2. Preoperative CAT.

A 29-year-old woman without any known drug allergies or medical history of interest was seen in the emergency room for hemifacial inflammation that had begun one week earlier. The patient referred chronic left mandibular pain, moderate difficulties opening her mouth (trismus), and mild dysphagia.

In the physical examination, severe trismus and evident signs of inflammation at the level of the left mandibular angle were observed. A painful mass of firm consistency was palpated. No abnormal tooth mobility or pain was noted when her teeth were tapped.

In the orthopantomography, a radiolucent image with well defined edges and multilocular aspect was identified that occupied the body, angle, ramus, and condyle of the left mandible and included the roots of tooth 37. An impacted tooth 38 was found adjacent to the cystic image (Fig. 1).

Cervicofacial CAT with contrast identified a highly aggressive lesion in the left mandible with bone expansion, cortical thinning, and rupture of the medial cortical of the ascending ramus. A soft-tissue lesion measuring 2 x 0.8 x 0.5 cm was located adjacent to the ascending ramus (Fig. 2).

Antibiotic therapy was begun with a presumptive diagnosis of infected mandibular cyst and adjacent inflammatory accumulation.

Queratoquiste odontogénico mandibular. Presentación como trismus de larga evolución

Mandibular odontogenic keratocyst. Presentation as gradually developing trismus

R. Sánchez Burgos¹, J.L. Del Castillo Pardo de Vera², M.J. Morán Soto², L. Pingarrón Martín¹,
M. Burgueño García³

La paciente fue intervenida bajo anestesia general para la extirpación de lesión. Se realizó un abordaje intraoral a través de incisión crestal. Se realizaron exodoncias de piezas 37 y 38, y se llevó a cabo la extirpación del quiste y fijación con solución de Carnoy en la zona del cuerpo y el cóndilo mandibular. Se realizó una sección del nervio lingual incluido en el tejido tumoral que se resuturó.

En la intervención se obtuvieron dos muestras que se remitieron para estudio histológico. La primera muestra de partes blandas adyacentes no evidenció infiltración tumoral. En la segunda muestra se identificó el tejido lesional como queratoquiste con reacción granulomatosa a la queratina.

La ortopantomografía de control posquirúrgica mostró la eliminación del quiste con ausencia de fracturas mandibulares (Fig. 3).

La paciente fue mejorando del trismus a lo largo del ingreso y hasta la intervención. A lo largo del ingreso se mantuvo alimentación enteral por sonda nasogástrica. Al alta presentaba trismus leve y tolerancia alimentaria adecuada. La paciente es seguida mediante revisiones periódicas de forma ambulatoria, siendo su evolución favorable, sin presentar recidivas.

Discusión

El queratoquiste odontogénico también denominado quiste primordial es definido como un quiste del desarrollo de estirpe odontogénica. Su interés radica en su alto índice de recidivas, que se estima en un 20-30%. Representan el 3-11% de los quistes mandibu-

The patient underwent surgery with general anesthesia to resect the lesion. An intraoral approach via a crest incision was used. Teeth 37 and 38 were extracted and the cyst in the area of the mandibular body and condyle was resected and fixed with Carnoy solution. The lingual nerve included in the tumoral tissue was sectioned and resutured.

Two specimens were obtained in the intervention and studied histologically. The first specimen of adjacent soft tissue showed no tumoral infiltration. The second specimen was identified as a keratocyst with granulomatous reaction to keratin.

Postoperative follow-up orthopantomography showed that the cyst had been eliminated and mandibular fractures were absent (Fig. 3).

The patient's trismus improved during hospitalization and up until the intervention. Throughout the hospital admission, the patient was fed enterally by nasogastric tube. She had mild trismus and adequate tolerance of feeding at discharge. Follow-up with regular outpatient visits disclosed a favorable evolution without recurrence.

Discussion

Odontogenic keratocyst, also known as primordial cyst, is defined as a developmental cyst of odontogenic origin. Its interest lies in the high recurrence rate, which is estimated at 20-30%. Odontogenic keratocysts represent 3-11% of mandibular cysts. They occur most frequently in the second, third, and fourth decades of life and there was a higher incidence in men than in women (1:1.4) and predilection for the mandibular angle and ramus (65-80%).

According to the histologic origin, keratocysts can be divided into two types: keratocysts of primordial origin (60% of cases), which develop from the remains of the dental lamina without any association with the teeth, and keratocysts of dentigerous origin (40%), which arise from the reduced enamel organ and are associated with impacted teeth.

Histologic study revealed a thin wall of stratified squamous-cell epithelium with cuboid or columnar cells in pal-

¹ Médico Residente.

² Médico Adjunto.

³ Jefe de Servicio.

Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial.

Hospital Universitario La Paz, Madrid. España

Correspondencia:

Rocío Sánchez Burgos

Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial

Hospital Universitario La Paz

Pº Castellana 261. 28046 Madrid. España

Email: ro_sb@hotmail.com

lares. Se presenta más frecuentemente en la segunda, tercera y cuarta décadas de la vida, con mayor incidencia en hombres que en mujeres (1:1,4), con predilección por el ángulo y la rama mandibular (65-80%).

Según su origen histológico se pueden dividir en dos tipos: los de origen primordial (60% de los casos), a partir de restos de la lámina dental, no asociados a piezas dentales y los de origen dentígero (40%), que tienen su origen en el órgano reducido del esmalte y se asocian a piezas incluidas.

La histología muestra una delgada pared de epitelio escamoso estratificado con células cuboideas o columnares en empalizada, sin infiltrado inflamatorio. Estas células presentan habitualmente paraqueratosis (80%), describiéndose también una minoría de casos con ortoqueratosis, los cuales presentarían un comportamiento menos agresivo, con menor tasa de recurrencia. El interior del quiste está relleno de un material cremoso de aspecto blanco sucio y olor característico constituido por queratina.

Los queratoquistes se caracterizan por un alto potencial proliferativo celular, regulado por proteínas relacionadas con la apoptosis celular como la p53, bcl-2, ki67 y PCNA, que se encuentran aumentadas en este tipo de quistes, así como la producción de IL-1, IL-6, TNF y prostaglandinas intraluminales, que justifican su comportamiento recidivante y su alto índice de crecimiento con respecto a otros quistes odontogénicos.

A pesar de este alto índice proliferativo, raramente afectan a las corticales óseas, por lo cual pueden mantenerse largo tiempo asintomáticos, siendo en muchos casos hallazgos radiológicos. La sintomatología puede comenzar debido a una sobreinfección del quiste, debutando con signos de inflamación local y, en casos muy evolucionados, con abscesos, fístulas o trismus. Pueden producirse perforaciones de las corticales hasta en un 25% de los casos dado su potencial de crecimiento, pudiendo debutar como una fractura patológica.

Radiográficamente pueden presentarse como lesiones uniloculares o multiloculares radiolúcidas de bordes nítidos, asociando una pieza dental no erupcionada hasta en un 40% de los casos. Pueden desplazar raíces de dientes adyacentes pero no se describen fenómenos de rizoclasia. En caso de lesiones multiloculares es necesario descartar que se asocie a un Sd. de Gorlin, displasia ectomesodérmica de origen hereditario autosómica dominante que se caracteriza por múltiples nevus basocelulares, malformaciones esqueléticas y queratoquistes.

Radiológicamente es necesario hacer el diagnóstico diferencial con lesiones mandibulares que cursan con radiolucidez como el ameloblastoma, entidad tumoral benigna que se presenta en su mayoría de casos en forma de quiste multilocular radiotransparente que puede provocar erosión de raíces adyacentes y expansión cortical, asociados en ocasiones con piezas incluidas. Asimismo, es necesario diferenciarlos de otros quistes odontogénicos que presentan las mismas características radiológicas como es el caso de los quistes foliculares, relacionados con la corona de piezas inclui-

Figura 3. OPG postoperatoria.
Figure 3. Postoperative OPG.

isade, but no inflammatory infiltrate. These cells usually present parakeratosis (80%), but orthokeratosis has been described in a minority of cases that behave less aggressively and have a lower rate of recurrence. The cyst is filled with a creamy, dirty white-colored material of characteristic odor, constituted by keratin.

Keratocysts are characterized by high cellular proliferation

potential that is regulated by proteins related to cellular apoptosis, like p53, bcl-2, ki67, and PCNA, which are increased in this type of cysts. Keratocysts also produce IL-1, IL-6, TNF, and intraluminal prostaglandins, which explains their recurrent behavior and high growth rate with respect to other odontogenic cysts.

Despite their high proliferative rate, they rarely affect the bone cortex, so that they may remain asymptomatic for a long time. In many cases they are a radiologic finding. Symptoms may begin as a result of cyst infection, debuting with signs of local inflammation and, in advanced cases, abscess, fistula, or trismus. Cortical perforation may occur in up to 25% of cases, given the growth potential of keratocysts. In this case the condition may debut as a pathologic fracture.

Radiographically, they may present as radiolucent unilocular or multilocular lesions with sharp edges. An unerupted tooth is associated in up to 40% of cases. Adjacent tooth roots may be displaced, but root resorption phenomena have not been described. In the case of multilocular lesions, it is necessary to rule out the association with Gorlin syndrome, an ectomesodermal dysplasia of autosomal dominant hereditary origin that is characterized by multiple basal-cell nevi, skeletal malformations, and keratocysts.

Radiologically, the differential diagnosis must be made with mandibular lesions that course with radiolucency, such as ameloblastoma, a benign tumor that presents in the majority of cases as radiolucent multilocular cysts that can cause erosion of adjacent dental roots and cortical expansion. Ameloblastoma sometimes is associated with impacted teeth. Likewise, keratocysts have to be differentiated from other odontogenic cysts with the same radiologic characteristics, such as follicular cysts directly related to the crown of impacted teeth, in contrast with keratocysts.

The treatment of keratocysts consists of tumor enucleation and curettage of the bed. The most important aim is to reduce the high recurrence rates, as keratocysts can recur up to ten years after surgery.

The therapeutic possibilities include simple enucleation (not recommended due to high recurrence rates, 17-56%). Coadjuvant techniques can be used, such as the application of Carnoy solution after enucleation (absolute alcohol, chlo-

das directamente, en contraste con los queratoquistes.

El tratamiento del queratoquiste se basa en la enucleación de la lesión y curetaje posterior. La finalidad más importante es disminuir las altas tasas de recidiva de esta entidad, que pueden presentarse hasta diez años tras la cirugía.

Las posibilidades de tratamiento incluyen la enucleación simple (no recomendada dadas las altas tasas de recidiva a las que se asocia 17-56%). Pueden emplearse técnicas coadyuvantes como la aplicación de solución de Carnoy tras la enucleación (alcohol absoluto, cloroformo, ácido acético al 98% y cloruro férrico), o la crioterapia, disminuyendo así los índices de recidiva (1-8,7%). Así mismo, se han empleado técnicas descompresivas derivadas de la marsupialización previas a la cirugía, con el fin de disminuir el tamaño del quiste y la presión intraluminal, permitiendo así una cirugía menos agresiva y con menores tasas de recidivas. En casos agresivos puede realizarse una resección mandibular en bloque.

Es necesario un seguimiento postoperatorio del paciente con el fin de vigilar las posibles recidivas, que pueden explicarse tanto por una enucleación o curetaje incompletos debidos a la debilidad de la pared del quiste o la invasión de tejidos blandos adyacentes, o bien por quistes satélites dada la alta actividad mitótica de la entidad, no detectados en el momento de la cirugía.

roform, 98% acetic acid, and ferric chloride) or cryocautery, which diminishes the recurrence rate (1–8.7%). Likewise, decompressive techniques derived from marsupialization can be used before surgery to reduce the cyst size and intraluminal pressure, allowing less aggressive surgery and reducing the recurrence rate. In aggressive cases, mandibular block resection may be performed.

The patient has to be followed up postoperatively to detect possible recurrences, which can be attributed to incomplete enucleation or curettage due to the weakness of the cyst wall, the invasion of adjacent soft tissues, or the presence of satellite cysts, given the high mitotic activity of the entity, which was not detected at the time of surgery.

Bibliografía

1. Chirapathosakul P, Sastravaha D, Jansisyanont P. A review of odontogenic keratocyst and the behaviour of recurrences. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 2006; 101:5-9.
2. Kolokythas A, Fernández RP, Pazoki A, Ord OA. Odontogenic Keratocyst: to decompress or not to decompress? A comparative study of decompression and enucleation versus resection/peripheral osteotomy. *J Oral Maxillofac Surg* 2007; 65:640-4.
3. Blanas N, Freund B, Schwartz M, Furst B. Systematic review of the treatment and prognosis of the odontogenic keratocyst. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 2000;90:553-8.
4. Morgan T, Burton C, Qian F. A retrospective review of treatment of the Odontogenic Keratocyst. *J Oral Maxillofac Surg* 2005;63:635-9.
5. Kichi E, Enokiya Y, Muramatsu T, Hashimoto S, Inoue T, Abiko Y, Shimono M. Cell proliferation, apoptosis and apoptosis-related factors in odontogenic keratocysts and in dentigerous cysts. *J Oral Pathol Med* 2005;34:280-6.
6. Kolar Z, Geierova M, Bouchal J, Pazdera J, Zboril V, Tvrky P. Immunohistochemical analysis of the biological potential of odontogenic keratocysts. *J Oral Pathol Med* 2006;35:75-80.
7. Chi A, Owings J, Muller S. Peripheral odontogenic keratocyst: report of two cases and review of the literature. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 2005;99:71-8.