Abordaje subcraneal discusión y revisión histórica de la técnica quirúrgica

Anterior subcranial approach. Discussion and historical review of the surgical technique

I. Zubillaga Rodríguez¹, G. Sánchez Aniceto¹, J.J. Montalvo Moreno², R. Díaz Lobato³

Resumen: Introducción. La cirugía de la base craneal es en la actualidad una realidad que se ha ido consolidando en las últimas décadas. El vertiginoso avance tecnológico desarrollado ha actuado como motor en la evolución de las técnicas quirúrgicas que abordan dicha región anatómica. Su impulso definitivo se ha cimentado en el concepto básico de equipo multidisciplinario.

Material y métodos. Se describe el abordaje subcraneal como alternativa a los tradicionales abordajes a la base craneal anterior. Discusión y revisión histórica de los distintos pasos claves en la realización del mismo.

Discusión. La elección del abordaje más adecuado a la base craneal en cada caso es esencial para la obtención de resultados quirúrgicos globales satisfactorios. Inicialmente dependerá de la localización anatómica exacta de la lesión dentro de la base craneal y de su extensión tridimensional, así como de la naturaleza de la misma. El abordaje subcraneal representa un paso importante en el desarrollo de las técnicas quirúrgicas de la base craneal.

Conclusiones. El abordaje subcraneal permite una amplia y óptima exposición de todos los planos de la fosa craneal anterior, desde el techo etmoidal anterior hasta el clivus-planum esfenoidale incluyendo los techos orbitarios. Este objetivo se logra sin retracción de los lóbulos frontales evitando de esta manera la morbilidad asociada que dicha maniobra conlleva. Favorece el manejo precoz preciso de patología oncológica con afectación intra-extradural y el tratamiento de fracturas tras impactos de alta energía con afectación de la fosa craneal anterior.

Palabras clave: Abordaje subcraneal, fosa craneal anterior.

Recibido: 27.11.07

Aceptado: 17.12.08

1 Médico Adjunto. Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial.

2 Jefe de Servicio. Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial.

3 Jefe de Servicio. Servicio de Neurocirugía.

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. España.

Correspondencia:

Ignacio Zubillaga Rodríguez.

Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial.

Hospital Universitario 12 de Octubre.

Avda. de Córdoba s/n

28041. Madrid. España

e-mail: ignaciozubillaga@yahoo.es

Abstract: Introduction. Skull base surgery is now a reality that has become consolidated over the last decades. The dizzyingly rapid technological advances that have taken place have served as a motor for the development of surgical techniques to approach this anatomic region. The foundation for the definitive push forward of this technique was multidisciplinary teamwork.

Material and methods. The subcranial approach is described as an alternative to traditional approaches to the skull base. The history of different key steps in the subcranial approach is described and discussed.

Discussion. The selection of the most suitable approach to the skull base in each case is essential for obtaining satisfactory surgical results overall. Initially, the selection of an approach depends on the exact anatomic location of the lesion in the skull base, its three-dimensional extension, as well as the nature of the lesion. The subcranial approach is an important step in the development of surgical techniques for the skull base.

Conclusions. The anterior subcranial approach provides ample and optimal exposure of all the planes of the anterior cranial fossa, from the anterior ethmoidal roof to the clivus-sphenoid plate, including the orbital roofs. This objective is achieved without having to retract the frontal lobes, thus avoiding the associated morbidity and mortality that this maneuver entails. The anterior subcranial approach makes precise earlier management of oncologic pathology with intradural and extradural involvement possible, as well as the treatment of fractures produced by high-energy impact with involvement of the anterior cranial fossa.

Key words: Subcranial approach; Anterior cranial fossa.

Introducción

La cirugía de la base craneal es en la actualidad una realidad que se ha ido consolidando en las últimas décadas. El vertiginoso avance tecnológico desarrollado, incluyendo técnicas de imagen preoperatorias más específicas, ha actuado como motor en la evolución de las técnicas quirúrgicas que abordan dicha región anatómica. La mejora en el conocimiento de la anatomía de la base craneal también ha estimulado el desarrollo de nuevos abordajes quirúrgicos. Su impulso definitivo se ha cimentado en el concepto básico de equipo multidisciplinario.¹ Se ha establecido desde el punto de vista técnico y ético como imprescindible la presencia de equipos cualificados integrados por neurorradiólogos, incluyendo su vertiente intervencionista, anestesiistas, neurocirujanos y cirujanos maxilofaciales aptos para tratar con criterio y garantías este complejo enclave anatómico.

La elección del abordaje más adecuado a la base craneal en cada caso es esencial para la obtención de resultados quirúrgicos globales satisfactorios. Inicialmente dependerá de la localización anatómica exacta de la lesión dentro de la base craneal y de su extensión tridimensional, así como de la naturaleza de la misma. Las opciones posibles deben ser depuradas finalmente en función del status global del paciente, planificación reconstructiva y experiencia del equipo quirúrgico.

El abordaje subcraneal fue descrito en 1978 por Raveh² para el tratamiento de traumatismos con afectación de la base craneal anterior como alternativa a los tradicionales abordajes transcraneales-transfaciales empleados para acceder a dicha región. Se cimenta en estudios pioneros de Frazier, Smith y Ketcham quienes demuestran las posibilidades de los abordajes transfaciales y tras los avances obtenidos por Tessier y Derome en relación al abordaje transbasal. Trabajos posteriores de Lawton, Fukuta, Janecka y Sekhar³ contribuyen al desarrollo definitivo de dicho abordaje, que fue posteriormente utilizado para la corrección de malformaciones craneofaciales congénitas y en 1980 se describe por primera vez su uso en cirugía oncológica basicraneal.

El abordaje subcraneal representa un paso importante en el desarrollo de las técnicas quirúrgicas de la base craneal. Es un avance lógico en el progreso de las osteotomías disponibles fruto del esfuerzo y cooperación simultánea entre las distintas especialidades que tratan la base del cráneo. Permite una amplia y óptima exposición de todos los planos de la fosa craneal anterior, desde el techo etmoidal anterior hasta el clivus-planum esfenoidale incluyendo los techos orbitarios. Este objetivo se logra sin retracción de los lóbulos frontales evitando de esta manera la morbilidad asociada que dicha maniobra conlleva. Favorece el manejo precoz y preciso de patología oncológica con afectación intra-extradural, el tratamiento de fracturas tras impactos de alta energía con afectación de la fosa craneal anterior, incluso con desgarros duros y herniación del tejido cerebral, la descompresión del nervio óptico, la corrección de malformaciones craneofaciales y el aislamiento estricto y reconstrucción de la base craneal.

Un aspecto importante en la "supervivencia" de un nuevo campo de la medicina, es su aceptación como una alternativa práctica a los estándares históricos. Este objetivo se consigue a través de la

Introduction

Skull base surgery is now a reality as a result of its consolidation over the last decades. The dizzyingly rapid technological advances that have taken place, including more specific preoperative imaging techniques, have served as a motor for the development of surgical techniques to approach this anatomic region. Increased knowledge of the anatomy of the skull base also has stimulated the development of new surgical approaches. The foundation of its definitive push forward was the fundamental concept of multidisciplinary teamwork¹. The presence of qualified teams consisting of neuroradiologists, including interventional specialist, anesthesiologists, neurosurgeons, and maxillofacial surgeons has been established as technically and ethically necessary for treating pathology of this complex anatomic area with strict competence and guarantees.

The selection of the most suitable approach to the skull base for each patient is essential for obtaining satisfactory surgical results overall. Initially, the selection depends on the exact anatomic location of the lesion in the skull base and its three-dimensional extension, as well as the nature of the lesion. Possible options must be discussed in the light of the patient's overall status, the planned reconstruction, and the experience of the surgical team.

The anterior subcranial approach was described in 1978 by Raveh² for the treatment of trauma that affected the anterior skull base and as an alternative to the traditional transcranial-transfacial approaches used to obtain access to this region. The approach is based on the pioneering studies of Frazier, Smith, and Ketcham, who demonstrated the possibilities of transfacial approaches and after the advances made by Tessier and Derome in developing the transbasal approach. Later studies by Lawton, Fukuta, Janecka, and Sekhar³ contributed to the definitive development of this approach. It later was used in the correction of congenital craniofacial malformations. In 1980 its use in oncologic surgery of the skull base was described for the first time.

The anterior subcranial approach is an important step in the design of surgical techniques for the skull base. It is a logical step forward in making osteotomies available that has resulted from the effort of and cooperation between the different specialties that work with conditions of the skull base. The anterior subcranial approach offers ample and optimal exposure of all the planes of the anterior cranial fossa, from the anterior ethmoidal roof to the clivus-sphenoid plate, including the orbital roofs. This objective is achieved without having to retract the frontal lobes, thus avoiding the associated morbidity and mortality that this maneuver entails. The subcranial approach makes possible the precise and early management of oncologic pathology with intradural and extradural involvement, the treatment of fractures after high-energy impact with involvement of the anterior cranial fossa, including dural tearing and brain tissue herniation, decompression of the optic nerve, the cor-

educación y el verdadero conocimiento de los beneficios, riesgos y limitaciones que cada día presenta su puesta en práctica.

El desarrollo de material de instrumentación ha contribuido de forma relevante al desarrollo de la cirugía de la base craneal. Ha sido clave en todas las fases de nuestra práctica clínica: desde el diagnóstico, pasando por la monitorización intraoperatoria, hasta el seguimiento postoperatorio.

El aspecto reconstructivo de la cirugía de la base craneal ha ido ganando interés hasta el momento actual. La reconstrucción es una fase indispensable de cualquier procedimiento quirúrgico complejo. Cuanto mayor es la afectación de estructuras anatómicas críticas durante la cirugía, mayor es la demanda en la integridad de la reconstrucción. Hoy día no sólo es concebible una resolución adecuada de la patología de la base craneal sino que es mandatoria la obtención de resultados estéticos y funcionales notables. Los conocimientos y técnicas actuales permiten y propugnan el tratamiento precoz, agresivo y definitivo de la patología de la base craneal en un solo tiempo quirúrgico. Cualquier defecto de la base craneal que permita una comunicación directa del contenido intracranial con la nariz y/o los senos paranasales requiere reconstrucción.⁴

El perfeccionamiento de las diferentes técnicas reconstructivas, incluyendo colgajos libres microvascularizados y materiales de osteosíntesis,⁵ ha aportado un nuevo impulso en la drástica disminución de los índices de morbilidad y mortalidad. Tanto la accesibilidad como la reconstrucción de la base craneal han sido la causa de la progresiva incorporación de los cirujanos maxilofaciales al manejo multidisciplinario de esta patología.

Material y método. Discusión

Se discuten a continuación los pasos clave en la realización del abordaje subcraneal, revisando también desde el punto de vista histórico las distintos tratamientos realizados en dicho enclave anatómico.

El abordaje coronal ofrece una mejor visión y mayor control de la región a tratar, permitiendo de la misma forma la toma de injertos óseos autólogos en el mismo campo quirúrgico. Es el abordaje de elección empleado en la inmensa mayoría de casos permitiendo el manejo de patología de la base craneal anterior. Se debe preservar el pericráneo, ya que puede ser útil para sellar la base craneal anterior.

La incisión bicoronal clásica es modificada en el momento actual realizándola en zig-zag, iniciando la misma próxima a la raíz del hélix y con dirección posterior, asegurando la preservación de los vasos temporales superficiales, útiles no sólo como pedículo nutriente de colgajos locales empleados en la reconstrucción craneal, sino también como vasos receptores, si fuera necesario emplear técnicas microquirúrgicas reconstructivas.

Gran variedad de técnicas han sido empleadas para acceder al seno frontal, como la realización de colgajos óseos o la transiluminación sinusal para desarrollar injertos óseos libres de la tabla anterior del seno frontal.

La progresión de la cirugía del seno frontal ha sido paralela al desarrollo del tratamiento de los traumatismos craneofaciales.

rection of craniofacial malformations, and rigorous isolation and reconstruction of the skull base.

An important aspect in the "survival" of a new field of medicine is its acceptance as a practical alternative to historical standards. This goal is achieved through education and by obtaining factual knowledge of the benefits, risks, and limitations that introducing it into daily practice involves.

The development of instrumentation material has been relevant to the development of surgery of the skull base. It has been a key to all the phases of our clinical practice: from diagnosis to postoperative follow-up, passing through intraoperative monitoring.

Reconstructive aspects of skull base surgery have been gaining interest. Reconstruction is an indispensable phase of any complex surgical procedure. The more that critical anatomic structures are affected by surgery, the greater is the demand for integral reconstruction. Nowadays, not only is adequate resolution of skull base pathology conceivable, but achieving notable aesthetic and functional results are mandatory. Current knowledge and techniques make possible and advisable early, aggressive and definitive treatment of skull base pathology in a single surgical intervention. Any defect in the skull base that produces direct communication of the intracranial content with the nose and/or paranasal sinuses requires reconstruction.⁴

The perfection of different reconstructive techniques, including microvascularized free flaps and osteosynthesis materials,⁵ has lent new impulse to a dramatic reduction in morbidity and mortality rates. The needs of both improving accessibility and reconstructing the skull base have progressively drawn maxillofacial surgeons into the multidisciplinary management of this conditions in this location.

Material and method. Discussion

The key steps in executing the anterior subcranial approach are discussed below and the history of different therapies applied in this anatomic region is reviewed.

The coronal approach offers more visibility and control of the region to be treated while allowing the harvest of autologous bone grafts in the same surgical field. This is the approach of choice in the immense majority of cases for the management of anterior skull base pathology. The pericranium must be preserved because it may be useful for sealing the anterior skull base.

The classic bicoronal incision is modified. At present, a zigzag incision is made that begins at the root of the helix and continues posteriorly. This ensures the preservation of the superficial, temporal vessels, which are useful not only as a nutrient pedicle for the local flaps used in cranial reconstruction, but also as receptor vessels if microsurgical reconstructive techniques are required.

A large variety of techniques have been used to access the frontal sinus, such as preparing bone flaps or sinus tran-

El proceso inicial de acceso al seno frontal incluía un drenaje simple percutáneo vía trépano en casos de sinusitis aguda. Rara vez se obtenían resultados satisfactorios.

La primera operación por fractura del seno frontal fue descrita por Reidel² en 1898. Realizó una exenteración total del seno, resecando la pared anterior, creándose así un colapso del colgajo frontal sobre la pared posterior. Para minimizar el defecto estético con el procedimiento de Reidel, Killian en 1904 realizó una operación similar pero preservaba 10 mm del reborde supraorbitario con fines estéticos. En 1921, Lynch practicó una frontoetmoidectomía resecando el suelo del seno frontal, el hueso etmoidal y los cornetes medios. La incidencia de complicaciones con este procedimiento eran comparables a los procedimientos más radicales de Reidel y Killian.

El siguiente avance significativo en el manejo de las fracturas del seno frontal ocurrió en 1951, cuando Bergara y Bergara realizaron el denominado "colgajo osteoplástico".

La técnica para realizar un colgajo óseo en cirugía del seno frontal fue descrita inicialmente por Kocher en el siglo XIX. Un intento de osteotomía de la tabla anterior como una única unidad fue practicado por Tato y posteriormente por Goodale y Montgomery² para el manejo de sinusitis crónicas frontales.

Se tomaban moldes con la forma del seno frontal basándose en radiografías simples de cráneo (es preciso valorar el factor de magnificación). Este molde se esterilizaba en el momento de la cirugía y se usaba para delinear el perímetro del seno frontal. Se realizaba una osteotomía siguiendo este perímetro y la tabla anterior se pediculaba al pericráneo frontal. Otra técnica emplea la transiluminación para delimitar los bordes del seno frontal.

Los conceptos y principios actuales se basan en la intervención quirúrgica precoz buscando obtener resultados estéticos y funcionales estables. En el momento actual, las técnicas de imagen tipo TC craneofacial permiten la evaluación de la forma y tamaño sinusal facilitando así la posterior osteotomía cuadrangular de acceso en la pared anterior del seno frontal.

El abordaje de los senos frontal, etmoidal y esfenoidal es prácticamente imposible sin que este procedimiento implique la sec-

Figura 1. El diseño de la osteotomía subcraneal puede ser modificado por el patrón de fractura existente.

Figure 1. The design of the subcranial osteotomy may be modified by the fracture pattern.

Figura 2. Diseño de abordaje subcraneal en la pared anterior del seno frontal.

Figure 2. Design of the anterior subcranial approach to the anterior wall of the frontal sinus.

sillumination to develop free bone grafts of the anterior table of the frontal sinus.

Surgery of the frontal sinus has progressed in parallel with the development of treatment for craniofacial trauma.

The first attempts to access the frontal sinus included simple percutaneous drainage by trepanation in cases of acute sinusitis. Satisfactory results rarely were obtained.

The first operation for fracture of the frontal sinus was described by Reidel in 1898. This author performed total sinus exenteration, thus creating collapse of the frontal flap onto the posterior wall. In order to minimize the aesthetic defect of the Reidel procedure, Killian in 1904 performed a similar operation but preserved 10 mm of the supraorbital rim for cosmetic purposes. In 1921, Lynch performed frontoethmoidectomy, resecting the floor of the frontal sinus, ethmoid, and nasal middle turbinate bones. The incidence of complications with this procedure was comparable to that of the most radical procedures of Reidel and Killian.

The next significant advance in the management of fractures of the frontal sinus was achieved in 1951, when Bergara and Bergara developed the "osteoplastic flap." The technique for preparing a bone flap in surgery of the

frontal sinus was first described by Kocher in the 19th century. Attempted osteotomy of the anterior table as a single unit was performed by Tato and later by Goodale and Montgomery² for the management of frontal chronic sinusitis.

Molds were made using the form of the frontal sinus based on plain skull radiography (the magnification factor has to be considered). This mold was sterilized at the time of surgery and used to delineate the perimeter of the frontal

ción de una parte del hueso craneal, Hayes Martin 1948.

En ocasiones la osteotomía de abordaje al seno frontal es modificada siguiendo el patrón de fractura de la pared anterior del seno frontal (Fig. 1). La extracción de fragmentos óseos fracturados de la pared anterior permite el acceso al seno. Dichos fragmentos son conservados en suero salino para su posterior reposición anatómica tras el tratamiento adecuado del seno frontal. Es imprescindible una planificación adecuada del colgajo óseo teniendo en cuenta las fracturas existentes, siendo el objetivo final una exposición y manejo preciso de la patología traumática frontal. El colgajo óseo puede incluir los huesos propios nasales. En estos casos es precisa la fijación de los ligamentos cantales mediante sutura no reabsorbible en la pared anterior del seno frontal contralateral pasando tras el segmento nasofrontal (cantopexia transnasal). Se obtiene así una correcta posición de los cantos mediales en los planos vertical, horizontal y sagital. Algunos autores,⁶ preservan 3-5 mm distales de los huesos propios nasales intactos para mantener la funcionalidad de las válvulas nasales internas. El tamaño del colgajo óseo y la cantidad de rebordes orbitarios a incluir en el colgajo es determinada por la cantidad de FCA que necesitamos exponer, diseñando la osteotomía en la pared anterior del seno frontal (Fig. 2).

Como el tamaño del colgajo óseo es conocido antes de realizar la osteotomía completa, es posible en este momento la preinserción de la miniplacas que fijarán la osteotomía en su posición definitiva (Fig. 3). Dichas miniplacas son retiradas parcialmente (se liberan los tornillos que la fijan al colgajo óseo y se rotan), se completa la osteotomía de la pared anterior y se aborda el seno (Fig. 4). La osteotomía es realizada con sierra sagital. Dicha sierra permite crear la osteotomía superior del colgajo de forma biselada como medida de seguridad para evitar penetrar en el sistema nervioso central a través de la fosa craneal anterior. Un osteotomo tras la glabella permite la separación del colgajo de la crista galli, evitando penetrar la dura frontal. La precisa colocación final del colgajo óseo asegura una adecuada reconstrucción frontal.

La osificación primaria sucede si la osteotomía es suficientemente estrecha y el colgajo óseo es recolocado y fijado de forma estable mediante osteosíntesis.

Si la patología de base afecta a un solo seno frontal y el septum intersinusal no se encuentra afectado no existe indicación para la

Figura 3. Premodelado de placas de osteosíntesis antes de finalizar la osteotomía subcraneal.

Figure 3. Premodeling of osteosynthesis plates before completing the subcranial osteotomy.

Figura 4. Retirada parcial de placas de osteosíntesis y finalización de la osteotomía.

Figure 4. Partial removal of osteosynthesis plates and completion of osteotomy.

sinus. An osteotomy was made according to this perimeter and the anterior table was pediculated from the frontal pericranium. Another technique uses transillumination to delimit the edges of the frontal sinus.

Current concepts and principles are based on earlier surgery undertaken to obtain stable aesthetic and functional results. At present, CAT type craniofacial imaging techniques allow the evaluation of sinus form and size, thus facilitating the later quadrangular access osteotomy to the anterior wall of the frontal sinus.

The approach to the frontal, ethmoidal, and sphenoid sinuses is practically impossible without a procedure involving the section of part of the cranial bone, Hayes Martin, 1948.

Sometimes the osteotomy of approach to the frontal sinus is modified following the fracture pattern of the anterior wall of the frontal sinus (Fig. 1). Removal of the fractured bone fragments from the anterior wall gives access to the sinus. These fragments are conserved in saline solution and repositioned anatomically after proper

treatment of the frontal sinus. Proper planning of the bone flap is essential and should take into consideration the existing fractures. The final goal is to precisely expose and manage the traumatic frontal pathology. The bone flap may include the nasal bones. In these cases, the canthal ligaments are attached by nonresorbible suture to the anterior wall of the contralateral frontal sinus by passing it behind the nasofrontal segment (transnasal canthopexy). This correctly positions the medial canthi in the vertical, horizontal, and sagittal planes. Some authors⁶ preserve the distal 3-5 mm of the intact nasal bones to maintain the functionality of the internal nasal valves. The size of the bone flap and amount of orbital rim included in the flap are determined by the amount of frontal cavity that has to be exposed when designing the osteotomy of the anterior wall of the frontal sinus (Fig. 2).

eliminación de dicho septum. Queda claro que sólo requerirá tratamiento quirúrgico el seno frontal afectado siempre y cuando el septum esté intacto.

Independientemente del proceso patológico implicado, el abordaje quirúrgico al seno frontal debe favorecer una exposición y manejo adecuado del mismo. Una vez que la cavidad sinusal ha sido abordada y el proceso patológico tratado, la mucosa del seno frontal es meticulosamente eliminada de las paredes sinusales, procediendo posteriormente al fresado de dichas paredes (Fig. 5). De esta forma, conseguimos eliminar las invaginaciones óseas de la mucosa sinusal disminuyendo las complicaciones postoperatorias. El fresado de las paredes óseas incrementa también el aporte vascular útil para el material de relleno empleado en la obturación del seno frontal.

Las bases anatómicas para la eliminación de la cortical ósea interna mediante fresado fueron descritas en 1933 por Mosher y Judd, describen pequeñas depresiones en la cortical interna que permiten el paso a las venas diploicas de Breschet. Estas venas conectan la mucosa con las venas durales. Insiste así en la necesidad de eliminación de dichas depresiones como sitios potenciales de retención mucosa.

Holding, en sus trabajos sobre seno frontal en perros, muestra que la incompleta eliminación de la membrana mucosa implica una obliteración sinusal incompleta con mantenimiento de una cavidad aérea y formación posterior de quistes mucosos. Sugiere que las islas mucosas traumatizadas retenidas presentan un crecimiento anormal con tendencia a la formación de quistes mucosos que pueden originar mucocelos (Fig. 6). Otros autores como Montgomery defienden incluso el uso del microscopio intraperatorio como ayuda para una meticulosa exéresis de la mucosa sinusal.

El conducto nasofrontal⁷ (Fig. 7) es obturado con diversos materiales previa eliminación de la mucosa del mismo (Fig. 8). El abordaje coronal realizado para el manejo de dichas patologías favorece la obtención de hueso autógeno como

Figura 5. Fresado de la cortical interna sinusal para eliminar invaginaciones de la mucosa frontal.

Figure 5. Abrasion of the sinus internal cortical layer to eliminate invaginations of the frontal mucosa.

Figura 6. Mucocelo postraumático tratado a través de abordaje subcraneal.

Figure 6. Post-traumatic mucocelo treated through an anterior subcranial approach.

Figura 7. TC coronal donde se aprecia el conducto nasofrontal.

Figure 7. Coronal CT in which the nasofrontal duct is visible.

As the size of the bone flap is known before the osteotomy is completed, it is possible at that time to preinsert the miniplates that will attach the osteotomy to its definitive position (Fig. 3). These miniplates are partially removed (the screws that attach it to the bone flap are loosened and the flap is rotated) and the anterior wall osteotomy is completed and the sinus is opened (Fig. 4). The osteotomy is made with a sagittal saw. The sagittal saw allows a beveled-edge upper osteotomy to be made during flap harvest, which is a safety measure to avoid penetrating the central nervous system through the anterior cranial fossa. Insertion of an osteotome behind the glabella allows the flap to be separated from the crista galli, thus impeding the penetration of the frontal dura mater. Precise final positioning of the bone flap ensures adequate frontal reconstruction.

Primary ossification occurs if the osteotomy is narrow enough and the bone flap is repositioned and attached firmly by osteosynthesis.

If the underlying pathology affects only one frontal sinus and the intersinus septum is not affected, there is no indication for eliminating this septum. It is clear that only the affected frontal sinus will require surgical treatment, which will be given only if the septum is intact.

Independently of the pathologic process involved, the surgical approach to the frontal sinus must allow adequate exposure and management of the sinus. Once

material adecuado para la obturación del conducto.

Los principios básicos en torno a la obliteración del seno frontal se han desarrollado durante los últimos 50 años. Dicho procedimiento se ha convertido en uno de los puntos clave en el tratamiento de fracturas, infecciones crónicas y procesos oncológicos benignos del seno frontal. Disminuye el riesgo de aparición de complicaciones infecciosas (mucocelos, mucopioceles, osteomielitis, meningitis y abscesos cerebrales) dada la potencial degeneración quística de la mucosa sinusal afectada.

Una de las controversias en torno al manejo del seno frontal se ha centrado tradicionalmente en el material empleado para el relleno de la cavidad sinusal tras el tratamiento de la patología de base. Existen en la literatura estudios experimentales y clínicos defendiendo el uso de un material determinado como relleno de la cavidad.⁸ Sin embargo, la mayoría de estos estudios son realizados sobre senos frontales sin patología asociada (modelos animales).

La obliteración del seno frontal se define como la ocupación de la cavidad aérea sinusal frontal manteniendo intactas las paredes óseas. Se emplea en el manejo de patología traumática, infecciosa, oncológica o en el tratamiento de sus secuelas. Su objetivo es la eliminación sinusal como unidad funcional, evitando la regeneración epitelial sinusal.

Nuestro equipo quirúrgico aboga por el relleno con viruta ósea de calota, favorecido dicho procedimiento por el abordaje coronal⁹ (Fig. 9-10). Asimismo, permite a largo plazo un exhaustivo control radiológico, siendo más sencillo el diagnóstico de posibles recidivas de la patología de base. (Fig. 11) Tras la obliteración sinusal se recoloca el colgajo óseo frontal y se fija en su posición predeterminada inicialmente. La osteosíntesis habitualmente es realizada con titanio aunque es posible el uso de osteosíntesis reabsorbible (Fig. 12).

La reconstrucción primaria es imperativa en estos procedimientos para asegurar la supervivencia, siendo el método reconstructivo ideal aquél que reduzca al máximo el número de complicaciones, no interfiriendo con las pruebas de imagen de

Figura 8. Fresado y obturación del conducto nasofrontal.
Figure 8. Abrasion and filling of the nasofrontal duct.

Figura 9. La calota craneal permite la toma de injertos corticales y viruta ósea útil para la obliteración sinusal frontal.
Figure 9. The braincase provides cortical bone grafts and bone shavings that are useful for obliterating the frontal sinus.

Figura 10. Obliteración frontal con viruta ósea de calota.
Figure 10. Obliteration of the frontal sinus with skull bone shavings.

the sinus cavity has been opened and the pathologic process is treated, the mucosa of the frontal sinus is carefully removed from the sinus walls, which then are abraded (Fig. 5). This eliminates the invaginations of the sinus mucosa, thus reducing postoperative complications. Abrasion of the bone walls also increases the useful vascular supply to the filler used to pack the frontal sinus.

The anatomic bases for eliminating the internal cortex of the bone by abrasion were described in 1933 by Moshier and Judd. They described small depressions in the internal cortical layer that allow the diploic veins of Breschet to pass through. These veins connect the mucosa with the dural veins. The author insists on the need to eliminate these depressions as potential sites of mucous retention.

Holding, in studies of the frontal sinus in dogs, showed that incomplete elimination of the mucous membrane leads to incomplete sinus obliteration with maintenance of an air cavity and later formation of mucous cysts. The author suggests that the traumatized mucous islands that are retained may present abnormal growth and tend to form mucous cysts that can originate mucocèles (Fig. 6). Other authors, such as Montgomery, defend the use of intraoperative microscopy to assist in meticulously excising the sinus mucosa.

The nasofrontal duct⁷ (Fig. 7) is occluded with a variety of materials before the ductal mucosa is removed (Fig.

8). The coronal approach used to manage these pathologies makes it easier to obtain autologous bone as a suitable

control postquirúrgicas y proporcionando un resultado estético y funcional óptimo.

El abordaje subcraneal representa un acceso extracraneal y fue descrito inicialmente por Joram Raveh en 1978 para el tratamiento de los traumatismos complejos de la base craneal anterior.^{10,11} La osteotomía del segmento frontonasal puede ser extendida deliberadamente hacia la sutura frontocigomática dependiendo de cada caso.¹² Favorece una correcta reparación extracraneal de las fracturas de la base craneal anterior, incluso con desgarros duros y herniación cerebral. Permite la reconstrucción de la base craneal tras la reparación de los desgarros duros con mínima retracción de los lóbulos frontales. Es un procedimiento versátil y relativamente sencillo técnicamente.

Sus principales indicaciones son:

1. Traumatismos craneofaciales complejos que incluyen fracturas de base de cráneo con perforaciones duros y fracturas del complejo frontonasal-etmoidoorbitario desplazadas.¹³
2. Procedimientos reconstructivos de base de cráneo en casos de fístula de LCR postraumática, postquirúrgica o idiopática.
3. Descompresión del nervio óptico tras etmoidectomía radical.
4. Neoplasias con afectación de fosa craneal anterior originadas en cavidad nasal, nasofaringe, senos paranasales, órbita o meninges.¹⁴

Entre sus ventajas destaca:

1. La posibilidad en la mayoría de los casos de la reconstrucción craneofacial precoz en un solo acto quirúrgico (primeras 24-48 horas) a pesar de la afectación severa concomitante de la base craneal, la presencia de fragmentos craneales desplazados, la contusión y el edema cerebral y la herniación de tejido cerebral.
2. Disminución significativa de la morbilidad asociada evitando la retracción de los lóbulos frontales, el daño de los filamentos olfatorios y la reducción del edema cerebral y fístulas de LCR recurrentes postoperatorias, asociando una excelente exposición de la cavidad nasal, órbitas, etmoides y seno esfenoidal (fosa craneal anterior).
3. El tratamiento del pseudohipertelorismo (compresión centrípetas simétrica cantal para manejo del telecanto), la descompresión del nervio óptico (tras etmoidectomía radical) y la metículosa reparación del tercio medio facial pueden ser realizadas en una sola intervención quirúrgica.
4. Sellado hermético de desgarros duros y manejo de la base craneal a través de los espacios paranasales. Permite un estricto ais-

Figura 11. TC axial. Control radiológico de la obliteración sinusal.
Figure 11. Axial CT. Radiographic follow-up of sinus obliteration.

Figura 12. Osteosíntesis reabsorbible en abordaje subcraneal.
Figure 12. Resorbible osteosynthesis in the subcranial approach.

material for occluding the duct.

The basic principles of the obliteration of the frontal sinus have been developed over the last 50 years. This procedure has become one of the key points in the treatment of fractures, chronic infections, and benign neoplastic processes of the frontal sinus. It reduces the risk of the occurrence of infectious complications (mucocoele, mucopyocoele, osteomyelitis, meningitis, and cerebral abscess), which is important because of the potential for cystic degeneration of the sinus mucosa.

One of the issues in the management of the frontal sinus has centered traditionally on the material used to fill the sinus cavity after treating the underlying pathology.

Experimental and clinical studies in the literature defend the use of certain materials to fill the cavity.⁸ However, most of these studies have been made on frontal sinuses without asso-

ciated pathology (animal models).

Obliteration of the frontal sinus is defined as the occupation of the frontal sinus air cavity while maintaining the bone walls intact. It is used to manage traumatic, infectious, or tumoral pathology and in the treatment of pathologic sequelae. The goal is to annul the sinus as a functional unit by impeding the regeneration of the sinus epithelium.

Our surgical team recommends filling the sinus with skull bone shavings. This procedure is facilitated by the coronal approach (Figs. 9, 10).⁹ It also allows close long-term radiologic control to be conducted as it is easier to diagnose possible recurrences of the underlying pathology (Fig. 11). After sinus obliteration, the frontal bone flap was repositioned and attached in the initially predetermined position. Osteosynthesis is usually performed with titanium, although resorbible osteosynthetic material may be used (Fig. 12).

Primary reconstruction is imperative in these procedures to ensure survival. The ideal reconstructive method minimizes the number of complications, does not interfere with postoperative follow-up imaging studies, and produces an optimal aesthetic and functional outcome.

lamiento del SNC, con baja tasa de aparición de fístulas de LCR e infecciones epidurales, disminuyendo así el tiempo de hospitalización.

5. Procedimiento estéticamente muy aceptable, evitando incisiones faciales; la única incisión es la bicoronal, preferiblemente camuflada tras la línea capilar.
6. En traumatismos con fracturas frontonaso-orbitarias con afectación de la base craneal, contusión frontal, presión intracraneal elevada y/o fístula de LCR, la reparación intracraneal con los abordajes clásicos es sólo posible tras la resolución del edema cerebral concomitante que permita la retracción de los lóbulos frontales. Esto conlleva habitualmente un retraso en el procedimiento quirúrgico inicial de 2-3 semanas. Las desventajas de este retraso son un incremento en la tasa de infecciones postoperatorias, la interposición de tejido de granulación en los focos de fractura y el inadecuado drenaje de las cavidades sinusales. El abordaje subcraneal permite una corrección quirúrgica precoz de estos complejos traumatismos en un solo tiempo a pesar de la afectación del neurocráneo.

Contraindicaciones para la realización del abordaje subcraneal son traumatismos de la base craneal anterior laterales al techo orbitario o lesiones que requieren acceso neuroquirúrgico al lóbulo frontal vía craneotomía estándar. Los límites laterales del abordaje incluyen los nervios ópticos, senos cavernosos y caudalmente las porciones laterales e inferiores del maxilar superior.

Conclusiones

Los refinamientos quirúrgicos del abordaje subcraneal desarrollados a lo largo de la historia permiten cumplir con éxito los siguientes criterios básicos relacionados con la cirugía de la base craneal:

1. Permitir una amplia exposición de los defectos duros.
2. Permitir el tratamiento asociado de las lesiones intracraneales.
3. Mínima morbilidad quirúrgica.
4. Preservar cintillas olfatorias.
5. Empleo de los espacios aéreos faciales y movilización segura de los huesos craneofaciales como vía de abordaje a la base craneal.¹⁵ Obliteración del seno frontal.
6. Respeto máximo de los pedículos neurovasculares, cruciales en la vitalidad de los colgajos utilizados en la reconstrucción y en la viabilidad de los injertos óseos.
7. Planificación conjunta abordaje-reconstrucción para asegurar el aislamiento efectivo de las distintas cavidades implicadas, en especial del espacio subdural y la vía aerodigestiva superior.

Es imprescindible por otra parte a la hora de elegir el abordaje más apropiado considerar la experiencia del equipo quirúrgico y la posibilidad de futuras cirugías sobre el mismo campo quirúrgico.

Bibliografía

1. Patel SG, Singh B, Polluri A, Bridger PG, y cols. Craniofacial surgery for malignant skull base tumors. Report of an international Collaborative study. *Cancer* 2003;98:1179-87.

The subcranial approach consists of an extracranial access and was described initially by Joram Raveh in 1978 for the treatment of complex injuries of the anterior skull base.^{10,11} Osteotomy of the frontonasal segment can be extended purposefully toward the frontozygomatic suture depending on the needs of each case.¹² The subcranial approach facilitates the correct extracranial repair of fractures of the anterior skull base, even with dural tears and cerebral herniation. It allows the skull base to be reconstructed after the repair of dural tears with minimum retraction of the frontal lobes. It is versatile and relatively simple technically.

The main indications of the anterior subcranial approach are:

1. *Complex craniofacial trauma with fractures of the skull base, dural perforations, and fractures with displacement of the fronto-naso-ethmoido-orbital complex.¹³*
2. *Reconstructive procedures of the skull base in cases of posttraumatic, postoperative, or idiopathic CSF fistula.*
3. *Decompression of the optic nerve after radical ethmoidectomy.*
4. *Neoplasms of the nasal cavity, nasopharynx, paranasal sinuses, orbit, or meninges with involvement of the anterior cranial fossa.¹⁴*

The advantages of the anterior subcranial access include:

1. *In most cases, early craniofacial reconstruction in a single surgical act (first 24-48 hours) despite concomitant severe affection of the skull base, the presence of displaced cranial fragments, contusion, edema cerebral, and herniation of the brain tissue.*
2. *Significant reduction of associated morbidity, avoiding retraction of the frontal lobes, damage to the olfactory filaments, and reducing cerebral edema and postoperative recurrent CSF fistulas, together with excellent exposure of the nasal cavity, orbits, ethmoid, and sphenoid sinus (anterior cranial fossa).*
3. *The treatment of pseudohypertelorism (canthal symmetrical centripetal compression for the management of telecanthus), optic nerve decompression (after radical ethmoidectomy), and meticulous repair of the middle third of the face can be performed in a single surgical intervention.*
4. *Leak-proof seal of dural tears and management of the skull base through the paranasal spaces. It allows strict isolation of the CNS with a low rate of occurrence of CSF fistulas and epidural infections, thus reducing hospitalization time.*
5. *It is an aesthetically acceptable procedure that avoids facial incisions; the only incision is bicoronal, preferably camouflaged behind the hairline.*
6. *In trauma with fronto-naso-orbital fractures that involve the skull base, frontal contusion, high intracranial pressure and/or CSF fistula, intracranial repair using traditional approaches is possible only after resolution of the concomitant brain edema, which allows the frontal lobes to be retracted. This usually entails a delay in the initial*

2. Raveh J, Vuillemin T, Sutter F. Subcranial management of 395 combined frontobasal-midface fractures. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1988;114:1114-22.
3. Sekhar LN, Janecka IP. Surgery of cranial Base Tumors. *Raven Press* 1993.
4. Georgantopoulou A, Hodkinson PD, Gerber CJ. Cranial-base surgery: a reconstructive algorithm. *Br J Plastic Surg* 2003;56:10-3.
5. Chang DW, MD, Langstein HN, MD, Gupta A, MD, De Monte F, MD, Do K, Ph D, Wang X, MS, Robb G, MD. Reconstructive Management of Cranial Base Defects after Tumor Ablation. *Plast Reconstr Surg* 2001;107:1346-55.
6. Kellman R, Marentette L. The transglabellar/subcranial approach to the anterior skull base. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 2001;127:687-90.
7. Disa JJ, Robertson BC, Metzinger SE, Manson P. Transverse glabellar flap for obliteration/isolation of the nasofrontal duct from the anterior cranial base. *An Plast Surg* 1996;36:453-7.
8. Mickel TJ, Rohrich RJ, Robinson JB. Frontal sinus obliteration: a comparison of fat, muscle, bone and spontaneous osteogenesis in the cat model. *Plast Reconstr Surg* 1995;95:586-92.
9. Shumrick KA, Smith ChP. The use of cancellous bone for frontal sinus obliteration and reconstruction of frontal bony defects. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1994;120:1003-9.
10. Raveh J, y cols. The subcranial approach for frontoorbital and anteroposterior skull base tumors. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1993;119:385-93.
11. Raveh J, y cols. Extended anterior subcranial approach for skull base tumors: long-term results. *J Neurosurg* 1995;82:1002-10.
12. Fliss D, y cols. Early outcome and complications of the extended subcranial approach to the anterior skull base. *Laryngoscope* 1999;109:153-60.
13. Schaller B. Subcranial approach in the surgical treatment of anterior skull base trauma. *Acta Neurochir* 2005;147:355-66.
14. Kaplan MJ, Fischbein NJ, Harsh GR. Anterior skull base surgery. *Otolaryngol Clin North Am* 2005;38:107-31.
15. Yavuzer R, y cols. Management of frontal sinus fractures. *Plast Reconstr Surg* 2005;115:79-93.

surgical procedure of 2-3 weeks. The disadvantages of this delay are an increase in the rate of postoperative infections, interposition of granulation tissue in the fracture foci, and inadequate drainage of sinus cavities. The subcranial approach allows early surgical correction of these complex injuries in a single intervention despite involvement of the neurocranium.

Contraindications for using the subcranial approach are skull base injuries anterolateral to the orbital roof or lesions that require neurosurgical access to the frontal lobe by conventional craniotomy. The lateral limits of the approach include the optic nerves and cavernous sinuses, and the caudal limits are the lateral and lower portions of the upper maxilla.

Conclusions

The surgical refinements to the anterior subcranial approach that have been developed throughout its history have made it possible to successfully fulfill the following basic criteria for surgery of the skull base:

1. *Ample exposure of dural defects.*
2. *Access for associated treatment of intracranial lesions.*
3. *Minimum surgical morbidity.*
4. *Preservation of the olfactory tracts.*
5. *Use of facial air spaces and safe mobilization of the craniofacial bones as an approach to the skull base.¹⁵ Obliteration of the frontal sinus.*
6. *Maximum respect for the neurovascular pedicles, which are crucial for the vitality of the flaps used in reconstruction and the viability of bone grafts.*
7. *Combined planning of the approach and reconstruction ensure effective isolation of the different cavities involved, particularly the subdural space and upper airway and digestive tract.*

On the other hand, when choosing the most appropriate approach it is essential to consider the experience of the surgical team and the possibility of future operations in the same surgical field.