¿Cuál es su diagnóstico?

What would your diagnosis be?

Una mujer de 60 años, sin antecedentes médicos de interés, edéntula parcial, fue remitida a nuestro servicio por su odontólogo tras el hallazgo casual en una radiografía panorámica de una lesión radiolúcida, intraósea y redondeada, de un tamaño aproximado de 3 x 2 cm, con bordes bien definidos, en el ángulo mandibular derecho y en relación con la corona de un tercer molar inferior incluido (Fig 1A). La lesión respetaba y desplazaba el canal del nervio dentario inferior (Fig 1B).

Clínicamente la paciente se encontraba asintomática. A la exploración se detectó un abombamiento de ambas corticales óseas, con una mucosa de aspecto normal. La sensibilidad del nervio dentario inferior no estaba alterada. El diagnóstico diferencial incluyó en primer lugar el quiste folicular o dentígero, por su relación al tercer molar inferior incluido; y en segundo lugar, queratoquiste, quiste lateral periodontal, quiste botrioide odontogénico y ameloblastoma como lesión agresiva intraósea que cause osteólisis.

Figura 1A. Radiografía panorámica que muestra una lesión radiolúcida asociada a tercer molar incluido de bordes bien definidos, unilocular e intraósea.

Figure 1A. Panoramic radiograph showing radiolucid lesion, with well-defined borders that is unilocular and intraosseous, and associated with impacted third molar.

Figura 1B. Detalle de la radiografía panorámica de la relación de la lesión con el nervio dentario inferior.

Figure 1B. Panoramic radiograph detail showing relationship between the lesion and the inferior dental nerve.

A 60 year old female, with no medical history of interest, who was partially edentulous, was referred to our department by her dentist after an incidental finding on a panoramic radiograph of a radiolucid lesion that was intraosseous and rounded, and that measured 3 x 2 cm approximately. Its borders were well-defined and it was situated in the right mandibular angle, by the crown of a lower impacted third molar (Fig. 1A). The lesion was not interfering with the inferior dental nerve canal, which had been displaced (Fig 1B).

The patient was clinically asymptomatic. On examination, a bulging that affected both cortical areas was detected, and mucosa of a normal appearance. The sensitivity of the inferior dental nerve had not been affected. The differential diagnosis included firstly follicular or dentigerous cyst, given its relationship with the lower third impacted molar; and in second place, keratocyst, lateral periodontal cyst, botryoid odontogenic cyst and ameloblastoma, as aggressive intraosseous lesions causing osteolysis.

Quiste odontogénico glandular: diagnóstico diferencial y manejo de lesiones quísticas maxilares

Glandular odontogenic cyst: differential diagnosis and management of maxillary cyst lesions

D. López Vaquero¹, P. Infante Cossío², M. Acosta Feria¹, J. Hernández Gutiérrez¹, A. García-Perla García², J.L. Gutiérrez Pérez²

La paciente fue intervenida bajo anestesia general, realizándose la enucleación de la lesión, extracción del tercer molar incluido y curetaje de la cavidad ósea resultante. Se realizó seguimiento clínico y radiológico cada tres meses, no encontrándose evidencia de recidiva a los 36 meses (Fig 2).

La pieza resultó tener 2 cm de diámetro, presentando una cubierta de color blanco y consistencia dura (Fig 3). El examen histopatológico determinó el resultado de quiste odontogénico glandular: mostraba una cavidad quística, tapizada por un epitelio plano poliestratificado no queratinizado, con áreas de engrosamiento simulando pequeños quistes dentro del mismo. Además en la superficie de este epitelio presentaba células cuboideas de carácter eosinófilico a veces ciliadas. Dentro de estas cavidades microquísticas existía moco con cristales de colesterol. Todo ello bajo un tejido conectivo rico en colágeno, y en ausencia de infiltrado inflamatorio (Fig 4).

Discusión

El quiste odontogénico glandular (QOG) es una lesión quística de los maxilares muy poco frecuente (0,012%) según Magnusson y cols.,¹ que aparece en un rango de edad amplio (50 años aproximadamente de media); sin predilección clara por ningún sexo; de localización preferentemente mandibular (85%), y en sector anterior como una lesión radiolúcida, uni o multilocular, de bordes bien definidos y festoneados. Fue descrita por primera vez por Gard-

The patient was operated on using general anesthesia. Enucleation of the lesion was carried out together with extraction of the impacted third molar and curettage of the bony bed. A clinical and radiological follow-up was carried out every three months, and no evidence of recurrence was found after 36 months (Fig. 2).

The specimen had a 2 cm diameter, it was covered by a white layer with a hard consistency (Fig. 3). The result of the histopathological examination was glandular odontogenic cyst: it had a cystic cavity that was lined by flat polystratified non-keratinized epithelium, with thicker areas that appeared to have small cysts inside. In addition, the surface of this epithelium had cuboid cells of an eosinophilic nature that were sometimes ciliated. Within these microcystic cavities there was mucous with cholesterol crystals. All this was under connective tissue that was rich in collagen, and which had no inflammatory infiltrate (Fig 4).

Discussion

Glandular odontogenic cyst (GOC) is a cystic lesion of the jaw that is very rare (0.012%) according to Magnusson and cols.,¹ appearing within a wide age range (approximate mean age of 50); it has no clear sex predilection, it is more commonly found in the mandible (85%) and in the anterior sector as a radiolucid lesion. It is uni- or multilocular, with well-defined scalloped borders. It was first described by Gardner and cols² in 1988, although Padayachee and Van Wyk had described two cases a year previously with the same characteristics, which they called sialo-odontogenic cyst.³ It was Gardner and cols. who first used the name of glandular odontogenic cyst,² with which it appears in the WHO's classification of cystic lesions of the jaw because of its probable dental origin (1992). Only some 60 cases have been described in the literature, perhaps because this entity has been recognized as such not very long ago, given that these cysts were diagnosed as different types of odontogenic tumors because of their histological, clinical and radiological similarity.⁴

1 Médico Residente.

2 Médico Adjunto.

3 Jefe de Servicio

Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. España

Correspondencia:

Pedro Infante Cossío

Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial

Hospital Universitario Virgen del Rocío

Avda. Manuel Siurot s/n

41013 Sevilla. España

E-mail: pinfante@us.es

ner y cols.² en 1988, aunque Padayachee y Van Wyk un año antes describieron 2 casos con las mismas características, pero con la denominación de quiste sialoodontogénico.³ Fueron Gardner y cols quienes primero lo identificaron con el nombre de quiste odontogénico glandular,² con el cual figura en la clasificación de la OMS de lesiones quísticas maxilares por su presumible origen dentario (1992). Sólo hay descritos en la literatura alrededor de unos 60 casos, quizás debido a que esta entidad se ha reconocido como tal no hace mucho ya que estos quistes fueron diagnosticados como otros tipos de tumores odontogénicos por su parecido tanto histológico, clínico y radiológico.⁴

El caso clínico que presentamos en este artículo es similar a todos los anteriormente descritos en la literatura: lesión quística mandibular, imagen radiolúcida unilocular, con bordes bien definidos. Tiene la particularidad que está asociado a un tercer molar incluido, provocando que el diagnóstico de presunción preoperatorio fuera el de quiste folicular. Hasta nuestro conocimiento, este es el tercer caso presentado en la literatura con esta característica diferencial.⁵ No existen signos ni clínicos ni radiológicos que nos hagan sospechar en él, por lo que habitualmente se presenta simulando otras entidades, como es nuestro caso.

Histológicamente se trata de una cavidad quística tapizada por un epitelio plano estratificado no queratinizado, presentando áreas de engrosamiento, simulando pequeños quistes dentro del mismo. Estos también se presentan en el quiste lateral periodontal y quiste botriode odontogénico,^{6,7} justificando la hipótesis de su posible origen odontogénico, propuesta por Gardner y cols.² Este epitelio también presenta en sus capas más superficiales células cuboideas eosinófilas, pudiendo ser ciliadas formando pseudopapilas. Dentro de las cavidades microquísticas se dan lagos mucosos (mucicarmina y PAS +), de apariencia glandular. Esto es lo que hizo que Padayachee y Van Wyk lo denominaran quiste sialoodontogénico.³ Todo ello es sustentado por un tejido conectivo rico en colágeno, con ausencia de infiltrado inflamatorio. Estas características histológicas asemejan a algunas entidades de origen odontogénico como: quiste lateral periodontal, quiste botriode odontogénico o quiste dentígero.⁸ Sin embargo lo que le diferencia de los demás es la alta tasa de recurrencia, demostrando en ocasiones una conducta agresiva.

El quiste lateral periodontal es una lesión radiolúcida con bordes bien definidos, uni o multilocular, adyacente a ápices de dien-

Figura 2. Radiografía panorámica de control tras 36 meses de seguimiento, donde se aprecia la ausencia de recidiva de la lesión.
Figure 2. Follow-up radiograph at 36 months showing no evidence of any recurrence.

Figura 3. Pieza quirúrgica donde se observa la lesión adyacente al tercer molar.
Figure 3. Surgical specimen showing lesion adjacent to third molar.

The clinical case presented in this article is similar to all those that have previously been described in the literature: mandibular cystic lesion, unilocular radiolucid image, with well-defined borders. It is unusual in that it is associated with an impacted third molar, which led to the pre-operative presumed diagnosis of a follicular cyst. To our knowledge it is the third case presented in the literature with this differential

characteristic⁵. There are no clinical or radiological signs to suspect it, and it usually presents mimicking other entities, such as in this case of ours.

Histologically it appears as a cystic cavity that is lined by flat stratified non-keratinized epithelium, with thicker areas that appear to have small cysts inside. These also appear in the periodontal lateral cyst and in the odontogenic botryoid cyst,^{6,7} which would justify the hypothesis of its possible odontogenic origin, as proposed by Gardner and cols.²

This epithelium also has eosinophilic cuboid cells in its more superficial layers, which may be ciliated and form pseudopapillae. Within the microcystic cavities there are mucous pools (mucicarmin and PAS +) with a glandular appearance. This is what led Padayachee and Van Wyk to call it sialo-odontogenic cyst.³ All this is supported by connective tissue that is rich in collagen but there is no inflammatory infiltrate. These histological characteristics are similar to some entities with an odontogenic origin such as: lateral periodontal cyst, odontogenic botryoid cyst or dentigerous cyst.⁸ However, what differentiates it from the others, is the high rate of recurrence, and on occasions it has shown aggressive behavior.

The lateral periodontal cyst is a radiolucid lesion with well-defined borders, that is uni- or multilocular, adjacent to the apexes of vital teeth, and lined with a fine layer of flat stratified non-keratinized epithelium. At certain points it becomes thicker with eosinophilic glycogen-rich cells. What differentiates it from GOC is its high recurrence rate.^{4,8}

The botryoid odontogenic cyst has a similar histologic structure, but it has a greater tendency to recurrence, and it is therefore more aggressive. It is therefore thought that GOC is a variation of the botryoid cyst; and it is even thought

tes vitales, tapizado por un fino epitelio plano estratificado no queratinizado. También presenta engrosamientos puntuales con células eosinofílicas ricas en glucógeno. Lo único que le diferencia del QOG es la alta tasa de recurrencia de este último.^{4,8}

El quiste botrioide odontogénico es de estructura histológica parecida, pero con una tendencia mayor a recidivar, siendo por tanto algo más agresivo. Se cree por tanto que el QOG es una variante del quiste botrioide; e incluso se piensa que las tres entidades son tres variantes de un grupo de quistes epiteliales no queratinizados de origen odontogénico.⁹ La existencia de epitelio ciliado y estructuras ductales acinares en áreas localizadas, hace que dentro de estas entidades, el QOG tenga nombre propio.

Una característica similar entre el carcinoma mucoepidermoide central (CMC) y QOG es el desarrollo intraóseo de estructuras glandulares. Alrededor del 30% de quistes odontogénicos muestran células mucosas en su interior.⁴ Se piensa que el CMC deriva del epitelio de recubrimiento de tumores odontogénicos tras fenómenos displásicos de células mucosas, en concreto de los quistes dentígeros.⁴ Muchos de estos tumores presentan localización pericoronaria, simulando lesiones que son más frecuentes en esas áreas, apareciendo asociado a un diente incluido, como es nuestro caso. Según varias revisiones realizadas en la literatura, queda demostrada la similitud entre CMC y QOG, apareciendo en ellos hasta un 25% de recurrencia, dependiendo del tratamiento realizado. Algunos autores han llegado a la conclusión de que QOG podría ser un CMC de bajo grado, donde esas áreas de engrosamiento epitelial que forman los microquistes sufren cambios displásicos, siendo entidades clínica y morfológicamente solapadas.⁴

Kaplan y cols.¹⁰ realizaron una revisión de todos los tratamientos realizados en los casos de QOG encontrados de 1987 a 2003, estudiando localización, locularidad, extensión, integridad de corticales, tratamiento, tiempo de seguimiento y recurrencia: en 48 de los casos se realizó cirugía menor (enucleación y curetaje o masurpialización), y en 8 cirugía mayor (ostectomía periférica o resección en bloque). El seguimiento realizado fue de 3 meses a 20 años, con una media de 3 años. Recidivaron 13 casos (27,1%). Esta recidiva se asoció a

Figura 4. A) Hematoxilina-eosina 4x. Epitelio plano estratificado intercalado con espacios multiquisticos. B) Hematoxilina-Eosina 20x. Epitelio con células cuboideas resultando aspecto glandular. C) Contenido quístico: colesterol.

Figure 4. A: Hematoxylin-eosin 4x. Flat stratified epithelium with intercalated multicystic spaces. B: Hematoxylin-eosin 20x. Epithelium with cuboid cells leading to a glandular appearance. C: Cystic content: cholesterol.

that the three entities are three variants of a group of non-keratinized epithelial cysts with an odontogenic origin.⁹ The existence of ciliated epithelium and acinic ductal structures in localized areas means that, within these entities, GOC has its own name.

A similar characteristic between central mucoepidermoid carcinoma (CMC) and GOC is the intraosseous development of glandular structures. Around 30% of odontogenic cysts have mucosal cells in their interior.⁴ It is thought that CMC arises from the epithelium that covers odontogenic tumors after dysplastic phenomena of mucosal cells, dentigerous cysts in particular.⁴ Many of these tumors have a pericoronal location, simulating lesions that are more common in this area, and they appear in association with an impacted tooth, as in this case of ours. According to various reviews of the literature, the similarity between CMC and GOC has been demonstrated, with a 25% recurrence occurring, depending on the treatment carried out. Some authors have reached the conclusion that GOC could be a low grade CMC, in which the areas of epithelial thickening and microcyst formation, undergo dysplastic changes, and that they are entities that clinically and morphologically overlap.⁴

Kaplan and cols¹⁰ carried out a revision of all the treatment carried out in GOC cases that were found between 1987 and 2003. They studied location, locularity, extension, cortical integrity, treatment, follow-up time and recurrence: in 48

multilocularidad, lesiones grandes y compromiso de las corticales óseas. Todos los pacientes que recidivaron recibieron un tratamiento conservador con cirugía menor, y ninguno de los pacientes que habían recibido un tratamiento agresivo en un primer tiempo.

La tasa de recurrencia es mucho mayor que para los quistes odontogénicos, inflamatorios o del desarrollo, sólo asemejándose el queratoquiste. Algunas series de seguimiento de queratoquiste muestran una recurrencia cercana al 20%, sólo siendo superada por el ameloblastoma. El motivo que lo puede explicar, es la extrema delgadez del epitelio que tapiza la cavidad quística, y la presencia de los microquistes hace muy difícil la total enucleación.⁹ Se han establecido varios indicadores de agresividad del QOG:¹⁰ alta tasa de recurrencia; integridad de las corticales (39,3% perforación y 14,3% erosión) y la multilocularidad. El compromiso de las corticales óseas se asocia con una alta probabilidad de recurrencia. Este hallazgo obligaría a realizar de entrada un tratamiento agresivo para evitar la recidiva. Chavez y Richter¹¹ estudiaron la multilocularidad, encontrando relación con la recurrencia de la enfermedad, sugiriendo que se convirtiera en otro parámetro para tomar una decisión terapéutica. También se ha demostrado que la recurrencia está en relación con el tratamiento realizado.¹² Kaplan y cols. demostraron 25% de recurrencia para la enucleación y curetaje simple de la lesión.¹⁰ Con todos estos hallazgos se ha propuesto el siguiente protocolo de actuación:^{10,12}

- Lesiones pequeñas, inespecíficas clínica y radiográficamente, y uniloculares: se realiza enucleación y curetaje con análisis de la lesión a posteriori. Si la lesión se enucleó totalmente, no se indicaría otra cirugía. Sin embargo se recomienda un seguimiento de como mínimo 3 años.
- Lesiones grandes o multiloculares: deben ser biopsiadas para tomar una decisión terapéutica. Para lesiones grandes pero uniloculares se recomienda enucleación con preservación de estructuras vitales. Se admite una marsupialización, pudiéndose realizar una osteotomía periférica para asegurar la no recidiva. Para lesiones grandes y multiloculares están indicados los tratamientos más agresivos: mandibulectomía marginal o segmentaria con colocación de injertos óseos para su reconstrucción. Si la lesión está cerca del seno maxilar o fosa nasal, está indicada la marsupialización. Se recomienda un seguimiento de por lo menos 3 años.

Nuestro caso concuerda con el tratamiento a realizar propuesto en el primer punto del protocolo: lesión pequeña, unilocular, de bordes bien definidos y asintomática; donde realizamos la enucleación y curetaje de la cavidad, no encontrando evidencia de recidiva tras 3 años de revisiones.

Conclusiones

El QOG es una entidad rara, que histológica y radiográficamente se parece a otros quistes odontógenos, pero que tiene una mayor tasa de recurrencia y un comportamiento agresivo. Debe ser incluido en el diagnóstico diferencial de los quistes maxilares, y así poder realizar un tratamiento adecuado para evitar la recidiva. Es obligado realizar un seguimiento a largo plazo.

of the cases minor surgery was carried out (enucleation, curettage or marsupialization), and 8 major surgeries (peripheral osteotomy or en bloc resection). The follow-up that was carried out was between 3 months and 20 years, with a mean of 3 years. There was recurrence in 13 cases (27.1%). This recurrence was associated with multilocularity, large lesions and cortical bone compromise. All the patients that experienced recurrence received conservative treatment with minor surgery. None of these were patients that had initially undergone aggressive surgery.

The rate of recurrence is much greater than that of odontogenic, inflammatory or developmental cysts, and it is only similar to that of the keratocyst. Some keratocyst follow-up series indicate a recurrence of nearly 20%, which is only surpassed by the ameloblastoma. The reason that can explain this is the extreme fineness of the epithelium that lines the cystic cavity, and the presence of microcysts, making total enucleation very difficult.⁹ Various indicative factors of aggressiveness of GOC have been established¹⁰: high rate of recurrence, cortical integrity (39.3% perforation and 14.3% erosion) and multilocularity. Cortical bone compromise is associated with a high probability of recurrence. This finding makes carrying out aggressive treatment necessary in order to avoid recurrence. Chavez and Richter¹¹ studied multilocularity, finding a link with disease recurrence, suggesting that it should be converted into another parameter when taking a therapeutic decision. It has also been demonstrated that recurrence is related to the treatment carried out.¹² Kaplan and cols. demonstrated 25% recurrence with regard to enucleation and simple curettage of the lesion.¹⁰ Based on all these findings the following procedure protocol has been proposed:^{10,12}

- *For small lesions, that are clinically and radiologically unspecific, and unilocular: enucleation and curettage with later analysis. If the lesion is totally enucleated no further surgery should be indicated. However, a follow up of a minimum of 3 years is recommended.*
- *Large or multilocular lesion: a biopsy should be carried out in order to make a therapeutic decision. For large but unilocular lesions, enucleation is recommended with preservation of vital structures. Marsupialization can be carried out, and also peripheral osteotomies for ensuring there is no recurrence. More aggressive treatment is recommended for larger and multilocular lesions: marginal or segmental mandibulectomy with use of bone grafts for reconstruction. If the lesion is near the maxillary sinus or nasal fossa, marsupialization is indicated. A follow-up of at least three years is recommended.*

Our case is in line with the treatment that should be carried out in the first point of the protocol: small, unilocular lesion, with well-defined borders that are asymptomatic; we carried out enucleation and curettage of the cavity, not finding any evidence of recurrence after a follow-up of three years.

Bibliografía

1. Magnusson B, Goransson L, Odesjo B, Grondahl K, Hirsch JM. Glandular odontogenic cyst. Report of seven cases. *Dentomaxillofac Radiol* 1997; 26:26-31.
2. Gardner DG, Kessler HP, Morency R, Schaffner DL. The glandular odontogenic cyst: an apparent entity. *J Oral Pathol* 1988; 17: 359-66.
3. Padayachee A, Van Wyk CW. Two cystic lesions with features of both the botryoid odontogenic cyst and the central mucoepidermoid tumour: Sialo-odontogenic cyst? *J Oral Pathol* 1987; 16: 499-504.
4. Sittitavornwong S, Koehler JR, Said-Al-Naief N. Glandular odontogenic cyst of the anterior maxilla: case report and review of the literature. *J Oral Maxillofac Surg* 2006; 64: 740-5.
5. Kasaboglu O, Basal Z, Usubutun A. Glandular odontogenic cyst presenting as a dentigerous cyst: a case report. *J Oral Maxillofac Surg* 2006; 64: 731-3.
6. Ertas U, Buyukurt MC, Gungormus M, Kaya O. A large glandular odontogenic cyst of the mandible: report of case. *J Contemp Dent Pract* 2003; 15: 53-8.
7. Bhatt V, Monaghan A, Brown AM, Rippin JW. Does the glandular odontogenic cyst require aggressive management? *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 2001; 92, 249-51.
8. Osny FJ, Azevedo LR, Sant'Ana E, Lara VS. *Glandular odontogenic cyst: case report and review of the literature*. Quintessence Int 2004; 35, 385-9.
9. Tran P, Cunningham CJ., Baughman RA. Glandular odontogenic cyst. Case report. *J Endod* 2004; 30:182-4.
10. Kaplan I, Gal G, Anavi Y, Manor R, Calderon R. Glandular odontogenic cyst: treatment and recurrence. *J Oral Maxillofac Surg* 2005; 63: 435-41.
11. Chavez JA, Richter KJ. Glandular odontogenic cyst of the mandible. *J Oral Maxillofac Surg* 1999; 57: 461-4.
12. Piloni MJ, Paparella ML, Keszler A. Quiste odontogénico glandular. Estudio Retrospectivo clínico-radiográfico e histológico. *Med Oral* 2000; 5: 159-164.

Conclusions

GOC is a rare entity, which histologically and radiographically is similar to other odontogenic cysts, but it has a greater rate of recurrence and aggressive behavior. It should be included in the differential diagnosis of maxillary cysts, in order for adequate treatment to be carried out and for recurrence to be avoided. A long-term follow up is compulsory.