

UROLOGÍA EN IMÁGENES**"URÉTER DERECHO EN HERNIA INGUINO-ESCROTAL DERECHA"**

Miguel Álvarez Múgica, Verónica Bulnes Vázquez¹, Antonio Jalón Monzón, Roberto C. González Álvarez, Laura Rodríguez Robles y José Luis Martín Benito.

Servicio de Urología 1. Hospital Universitario Central de Asturias.

¹Servicio de Radiodiagnóstico 1. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. España.

Víctor Arón de 74 años que ingresa por cólico renoureteral derecho asociado a infección del tracto urinario. La ecografía realizada, mostró la presencia de una ureterohidronefrosis izquierda, visualizándose el uréter hasta su entrada en vejiga, así como una ureterohidronefrosis derecha hasta cruce de iliacos sin visualizarse distalmente. El TC, evidenció una uropatía obstructiva bilateral condicionada por una hipertrofia prostática, encontrándose el uréter derecho, en su tercio distal, herniado hacia el escroto debido a la presencia de una hernia inguino-escrotal derecha (Figuras 1 y 2).



FIGURA 1. TC; Uréter derecho introduciéndose en el conducto inguinal derecho. Se observa la porción de uréter que se introduce en el conducto y la porción de uréter que asciende desde el conducto hacia la vejiga.



FIGURA 2. TC; Uréter derecho en bolsa escrotal derecha (flechas), haciendo un bucle para ascender hacia la vejiga.

Correspondencia

Miguel Álvarez Múgica
Servicio de Uroología I
Hospital Universitario Central de Asturias
Celestino Villamil s/n
33006 Oviedo. Asturias (España).
malvarez79@mixmail.com