

UROLOGÍA EN IMÁGENES

Arch. Esp. Urol. 2009; 62 (6): 510-511

“COMPLICACIÓN INFRECUENTE DE UNA PRÓTESIS DE PENE”

Daniel López García, Pastor Casas Agudo, José Manuel Janeiro Pais, Sara Martínez Breijo, Enrique Fernández Rosado, Manuel Ruibal Moldes y Marcelino González Martín.

Servicio de Urología. Hospital Juan Canalejo. La Coruña. España.

Presentamos el caso de un varón de 63 años, hipertenso, diabético, con una arteriopatía periférica importante y sometido a cistectomía radical e ileocolocoplastia por un carcinoma de células transicionales de vejiga hace 16 años y a nefrectomía radical derecha por un carcinoma de células renales hace 4 años.

Debido a disfunción eréctil multifactorial se coloca una prótesis de pene de tres elementos 3 años atrás.

El paciente es ingresado tras acudir al Servicio de Urgencias de nuestro Centro por dificultad miccional y dolor señalado a punta de dedo a nivel de cuerpo cavernoso derecho coincidiendo con la micción.



FIGURA 1. Uretrografía retrograda: uretra bulbocavernosa de características normales.

En la cistouretrografía se objetiva fistula uretro-cavernosa (Figuras 1, 2 y 3), por lo que se procede a retirada quirúrgica del material protésico y sutura del cuerpo cavernoso.

El paciente es dado de alta el segundo día postoperatorio con cobertura antibiótica y tras recuperar la micción espontánea y sin dificultad.



FIGURA 2. Estudio permiccional: fuga de contraste hacia la base y tercio proximal alrededor del elemento derecho de la prótesis.



FIGURA 3. Estudio permiccional: persiste la fuga de contraste. Neovejiga ileal.



CORRESPONDENCIA

Daniel López García
Paseo Marítimo, 9, 5ºD
15002 La Coruña. (España).
delnilopez@hotmail.com

Centro de trabajo
Servicio de Urología, planta 11 Hospital
Juan Canalejo
Xubias de Arriba s/n,
15006 La Coruña. (España).

Trabajo recibido: 12 de abril 2008.