

Litiasis múltiple ocupando por completo neovejiga ileal y pelvis renal derecha

A. Vega Vega*, D. García Alonso*, L.E. Parra Muntaner**

*Servicio de Urología, Unidad de Litotricia, Obra Hospitalaria Nuestra Señora de Regla. León.

**Servicio de Urología, Hospital del Bierzo, Ponferrada, León.

Actas Urol Esp 2005; 29 (10): 1003

Paciente mujer de 57 años con antecedentes de Histiocitosis X, tratada con quimioterapia hace 20 años, con cistectomía parcial hace 17 años por epiteloma vesical, con un período libre de enfermedad vesical de 13 años, posteriormente papiloma de bajo grado que se le reseca, posteriormente infecciones de repetición, desarrollando cistitis incrustante y nuevos episodios de resección vesical por papiloma de bajo grado, hace 2 años, diagnóstico de 2 lesiones tumorales en uréter derecho y otras en vejiga. Se le practica cistectomía radical con conservación uretral y ureterectomía derecha, con creación de neovejiga ileal con chimenea derecha que sustituye uréter derecho, donde se empalma pelvis renal derecha. Acude a nuestra consulta presentando múltiples litiasis que moldean la neovejiga y pelvis renal derecha (Fig. 1).

Dr. A. Vega Vega
Gran Vía de San Marcos 42; 6-B
24002 León

