Respuesta a tratamiento hormonal en cáncer de próstata diseminado

P. Serrano Frago, M^a.J. Gil Sanz, M. Allué López, Á. García de Jalón Martínez,
D. Pascual Regueiro, L.Á. Rioja Sanz

Servicio de Urología de Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Actas Urol Esp 2005; 29 (6): 616

Varón de 66 años diagnosticado de adenocarcinoma de próstata bien diferenciado con PSA: 12.320 ng/ml, en el estudio de extensión aparecen grandes adenopatías ilíacas, periprostáticas que desplazan la vejiga, retroperitoneales y retrocrurales (Fig. 1). Se administra tratamiento hormonal (bloqueo androgénico completo con flutamida y análogo trimestral) y a los 8 meses se

evidencia respuesta espectacular con reducción de las adenopatías ilíacas y desaparición de las retroperitoneales (Fig. 2).

Dra. P. Serrano Frago
C/ Lapuyade 19; 1º A
50007 Zaragoza
e-mail: pserranof@comz.org

FIGURA 1. Adenopatías ilíacas de aproximadamente 7 cm de diámetro y periprostáticas que desplazan vejiga.

FIGURA 2. Desaparición de adenopatías periprostáticas con vejiga en posición normal.