

Litiasis múltiple en riñón en herradura

E. Gómez Lanza, C. Ramírez Sevilla, C.X. Raventós Busquets, J. Morote Robles

Servicio de Urología. Hospital Vall d'Hebrón. Barcelona.

Actas Urol Esp 2006; 30 (1): 99

Varón de 18 años sin antecedentes patológicos conocidos de interés que presenta episodios de dolor tipo cólico en flanco derecho. No fiebre asociada. En la radiografía simple de abdomen se observan 5 imágenes cálcicas compatibles con litiasis que se proyectan sobre la silueta renal derecha y otra en pelvis menor a nivel de S2. En la urografía endovenosa se describe una alteración de la morfología renal compatible con riñones en herradura, observando un retraso en la captación y eliminación del

vel de S2. Se completó el estudio con una pielotografía que confirmaba los riñones en herradura, la litiasis obstructiva a nivel pélvico y múltiples calicilares derechas.

Dra. E. Gómez Lanza
Servicio de Urología
Hospital Vall d'Hebrón
Pg. de la Vall d'Hebrón, 119-129
08035 Barcelona
E-mail: esgolan@yahoo.es

(Trabajo recibido el 20 de abril 2005)



FIGURA 1



FIGURA 2



FIGURA 3