Complicaciones de la cirugía de reasignación de sexo

Cuesta Presedo JM, Sánchez Zalabardo D, Ascaso Cornago I.

Fundación Hospital Calahorra.

Actas Urol Esp. 2006;30(9):966

Paciente de 30 años de edad, de sexo femenino, con antecedente clínico de una cirugía de reasignación de sexo realizada en otro centro 5 años atrás, que presenta dificultad miccional con sensación de micción inconclusa y episodios ocasionales de hematuria macroscópica.

A la exploración destaca un neopene normoimplantado y constituido a expensa del músculo recto anterior del abdomen, asimismo, se aprecia una vagina ocluida siendo imposible la localización del meato uretral externo. Labios mayores íntegros.

A la urografía se aprecia en placa simple una gran litiasis intravesical con función renal normal y ligera ectasia de ambos uréteres.

Se le realiza al paciente una cistolitectomía.

Posoperatorio con desaparición total de la clínica por la que acudió a nuestra consulta.

Dr. J.M. Cuesta Presedo
Paletillas, 3 - 7º Izda.
26500 Calahorra (La Rioja)
E-mail: jcuesta@fhcalahorra.com

(Trabajo recibido el 23 de noviembre de 2005)

FIGURA 2. Radiografía simple de abdomen previa a la cirugía.

FIGURA 1. Genitales externos tras la cirugía.

FIGURA 3. Litiasis vesical.