

Condilomatosis gigante genital y perianal

Rodríguez Corchero J, Villodres Duarte A, Mármol Navarro S, Domínguez Usero D, Osman García I, Rodríguez Pérez A.

Servicio de Urología. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Actas Urol Esp. 2007;31(2):177

Paciente varón de 41 años con antecedentes personales de adicción a drogas por vía parenteral (Ex.ADV), SIDA (estadio 3), Hepatopatía viral (virus B, C y D positivos) y Tuberculosis en tratamiento, remitido a nuestro hospital por presentar condilomatosis gigante penoescrotal y perianal (Figs. 1 y 2).

Ingresa para intervención quirúrgica reglada, interviniendo en la misma especialistas de Cirugía General (Coloproctología), Cirugía Plástica y Urología. Se realiza exéresis completa de los condilomas (Fig. 3), dejando una colostomía temporal de protección.



FIGURA 1



FIGURA 2



FIGURA 3

El análisis anatomopatológico de las piezas quirúrgicas confirma el diagnóstico de Condilomas acuminados.

Correspondencia autor: J. Rodríguez Corchero.
 Servicio de Urología. Hospital Infanta Elena
 Ctra. Huelva-Sevilla, s/n 21007 Huelva.
 Tel.: 959 015 100
 E-mail autor: jrcorchero@hotmail.com
 Información artículo: Imágenes en Urología
 Trabajo recibido: enero 2006
 Trabajo aceptado: marzo 2006