

Sepsis urinaria, hidronefrosis severa y linfoma Burkitt

González Castro A, Suberviola B, Rodríguez-Borregan JC.

Servicio de Medicina Intensiva. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander.

Actas Urol Esp. 2008;32(3):367

Paciente que ingresó en la UCI por una sepsis grave de origen urinario. Entre las pruebas diagnósticas realizadas se incluyó un TAC abdominal (Fig. 1), en el que se observó una gran masa de

10,52 x 12,10 cm. y aspecto heterogéneo con signos de necrosis en su interior que provocaba el desplazamiento y colapso de ambos uréteres con la consiguiente hidronefrosis de grado III. Se realizó una biopsia de la masa mediante una punción guiada por ecografía siendo diagnosticado de un linfoma tipo Burkitt. Recibió tratamiento con antibioterapia, corticoides y ciclofosfamida con una evolución satisfactoria.



FIGURA 1

Correspondencia autor: Dr. A. González Castro
Servicio de Medicina Intensiva.
Hospital Universitario Marques Valdecilla
Avda. Valdecilla s/n - 39008 Santander (Cantabria)
Tel.: 942 202 520
E-mail autor: jandro120475@hotmail.com.
Información artículo: Imágenes en Urología
Trabajo recibido: octubre 2006
Trabajo aceptado: noviembre 2006