

Megauréter segmentario izquierdo no obstructivo ni refluyente

Álvarez Múgica M*, Jalón Monzón A*, Bulnes Vázquez V**, González Álvarez RC*,
Rodríguez Robles L*, Martínez Gómez FJ*.

*Servicio de Urología 1. **Servicio de Radiodiagnóstico 1. Hospital Universitario Central de Asturias.
Oviedo (Asturias).

Actas Urol Esp. 2008;(4):472

Paciente remitido por hallazgo casual ecográfico de dilatación del tercio distal del uréter izquierdo, sin sintomatología asociada. La urografía (Figs. 1 y 2), evidenció la presencia de una dilatación del tercio distal del uréter izquierdo presentando un calibre normal en su porción yuxtavesical. Se realizó una cistografía (Fig. 3), descartándose la presencia de reflujo vesico-ureteral, y los BKS en orina fueron también negativos.



FIGURAS 1 y 2. Urografía: dilatación del tercio distal del uréter izquierdo, presentando calibre normal pre y post dilatación.




FIGURA 3. Cistografía: no se evidencia presencia de reflujo vesico-ureteral.

El megauréter es una entidad producida por una alteración en el desarrollo de las fibras musculares circulares del uréter terminal, lo que impide una correcta conducción de las ondas peristálticas produciendo ureterectasia con elongación y acodaduras. En un 10-15 % de los casos se trata de un hallazgo casual en UIV o Ecografías.

Correspondencia autor: Dr. M. Álvarez-Múgica
Servicio de Urología 1. Hospital Universitario Central de Asturias
Celestino Villamil s/n, 33006 - Oviedo, Asturias.
Tel.: 985 108 000 (extensión 38143)
E-mail autor: malvarez79@mixmail.com
Información artículo: Imagen en urología
Trabajo recibido: noviembre 2006
Trabajo aceptado: diciembre 2006