

Vasculitis gangrenosa juvenil del adulto

Arce Gil J, Acaso Til H, Angerri Feu O, Caffaratti Sfulcini J, Garat Barredo JM, Villavicencio Mavrich H.

Servicio de Urología. Fundació Puigvert, Barcelona.

Actas Urol Esp. 2008;32(5):574

Lesión ulcerativa dolorosa en hemiescroto izquierdo de 24 horas de evolución en paciente de 15 años con cuadro faringoamigdalar de 4 días de evolución. El hemocultivo, urinocultivo y cultivo de exudado faríngeo fueron negativos. El estudio de población leucocitaria e inmunoglobulinas fueron normales. En ausencia de pruebas diagnósticas específicas de otros procesos, se orienta el cuadro como una vasculitis gangrenosa juvenil del adulto iniciando tratamiento con corticoterapia y antibioterapia endovenosa con resolución de cuadro faringoamigdalar y de la lesión escrotal. La vasculitis gan-

grenosa juvenil del adulto descrita por Piñol en 1973, es una entidad poco frecuente de carácter benigno que cursa con resolución del cuadro y ausencia de recidivas.

Correspondencia autor: Dr. J. Arce Gil
Servicio de Urología. Fundació Puigvert
Cartagena, 340-350 - 08025 Barcelona
Tel.: 943 169 700
E-mail autor: jacobo1976@hotmail.com
Información artículo: Imágenes en urología
Trabajo recibido: diciembre 2006
Trabajo aceptado: enero 2007



FIGURA 1



FIGURA 2