

Traumatismo en región pélvica

López García D, Martínez Breijo S, Janeiro Pais JM, Casas Agudo VP, Gómez Veiga FA, González Martín M.

Servicio de Urología. Hospital Juan Canalejo. La Coruña.

Actas Urol Esp. 2008;32(8):863

Presentamos el caso de un paciente varón de 26 años sin antecedentes médicos o quirúrgicos de interés que acude al Servicio de Urgencias de nuestro Centro tras sufrir un traumatismo en región pélvica al golpearse de modo accidental contra una mesa en su centro de trabajo.

A la exploración física presenta una herida inciso-contusa de aproximadamente 4 cm de longitud (Fig. 1), en cuyo fondo se observa la vena dorsal superficial del pene indemne.



FIGURA 1. Herida inciso-contusa en región pélvica con la vena dorsal superficial del pene indemne en su fondo.

Tras comprobar que conserva la micción espontánea, la ausencia de hematuria (Fig. 2) y que no existen lesiones asociadas se procede a la limpieza y sutura de la herida en 3 planos, muscular, subcutáneo y piel con puntos sueltos de material reabsorbible, (Figs. 3 y 4). Tras permanecer 6 horas en observación, el paciente es dado de alta estando asintomático.

Correspondencia: Dr. D. López García
Servicio de Urología. Hospital Juan Canalejo
Xubias de Arriba, 84 - 15006 La Coruña. Tel.: 981 178 000
E-mail autor: delnilopez@hotmail.com
Información artículo: Imágenes en Urología
Trabajo recibido: abril 2007
Trabajo aceptado: mayo 2007



FIGURA 2. Ausencia de hematuria y de lesiones asociadas.



FIGURA 3. Limpieza y campo quirúrgico previos a la sutura de la herida.



FIGURA 4. Sutura de la herida.