

*Imágenes en Urología***Reflujo secundario a resección transuretral**

Antonio Jalón Monzón, Miguel Álvarez Múgica, Jesús M^a Fernández Gómez, Laura Rodríguez Robles, Roberto C. González Álvarez, Francisco J. Regadera Sejas

Servicio de Urología-1. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. Asturias, España

Varón de 76 años de edad controlado en nuestras consultas de uro-oncología por tumores vesicales superficiales recidivantes. En cistoscopia de control realizada se observa una vejiga con fondo eritematoso y un trígono deslustrado y fibroso con implantación de ambos orificios ureterales lateralizados, muy amplios y refluientes, consecuencia de múltiples resecciones sobre ellos (Figs. 1 y 2).



FIGURA 1

La actitud diagnóstico-terapéutica de aquellos tumores vesicales que asientan sobre el orificio ureteral será la resección conjunta del tumor junto con una pastilla del propio meato, teniendo



FIGURA 2

la precaución de no coagular sobre el orificio ureteral para evitar estenosis secundarias. Posteriormente se comprobará mediante urografía intravenosa si existe afectación tumoral del tracto urinario superior.

Correspondencia autor: Dr. Antonio Jalón Monzón
 Servicio de Urología-1
 Hospital Universitario Central de Asturias
 Celestino Villamil, s/n - 33006 Oviedo, Asturias
 Tel.: 985 108 004
 E-mail autor: ajalonm@hotmail.com
 Información artículo: Imágenes en Urología
 Trabajo recibido: junio 2006
 Trabajo aceptado: julio 2006