

*Imágenes en Urología***Estenosis ureterointestinal en derivación Mainz II. Resolución endoscópica**

Ignacio Rodríguez Gómez, Vicente P. Casas Agudo, Luis M. Álvarez Castelo, Venancio Chantada Abal, Javier Sánchez Rodríguez-Losada, Daniel López García, Marcelino González Martín

Servicio de Urología. Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo. La Coruña. España.

Paciente de 63 años a la que se realizaron múltiples RTU vesicales por tumor superficial y habiendo recibido instilaciones con diversos fármacos. Ante recidiva superficial extensa se decide realizar cistectomía radical y derivación urinaria tipo Mainz II.

Al 6^a mes postoperatorio se evidencia dilatación pieloureteral bilateral, más llamativa en unidad izquierda, con episodios de dolor renoureteral episódicos.

Se realiza desobstrucción mediante NPC izquierda y pielografía descendente, que muestra afilamiento ureteral distal, a nivel del reimplante, con escaso paso a la bolsa sigmoidea.

Se procede a dilatación percutánea con balón, y colocación de catéter doble-j, retirado a las 6 semanas.

Se evidencia buena respuesta funcional y clínica tras el procedimiento.



FIGURA 1



FIGURA 2



FIGURA 3



FIGURA 4

Correspondencia autor: Dr. Ignacio Rodríguez Gómez
Servicio de Urología
Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo
Xubias de Arriba, 84 - 15006 La Coruña
Tel.: 981 178 057
E-mail autor: urogomez@hotmail.com
Información artículo: Imágenes en Urología
Trabajo recibido: enero 2007
Trabajo aceptado: febrero 2007