

*Imágenes en Urología***Suboclusión intestinal tras laparoscopia**

M<sup>a</sup> Mercé Pascual Queralt, José Segarra Tomás, Violeta Catalá\*, I. Pozuelo Fernández, Félix Millán Rodríguez, Humberto Villavicencio Mavrich

Servicio de Urología y \*Servicio de Radiología. Fundació Puigvert. Barcelona, España

**P**aciente varón de 80 años entre cuyos antecedentes patológicos destaca EPOC y obesidad.

Se realiza ureterolitotomía laparoscópica de litiasis ureteral izquierda de 1,5 cm de diámetro localizada a nivel L3-L4. En el postoperatorio inmediato aparece cuadro de suboclusión intestinal.

Se realiza tomografía computerizada (TC) abdominal objetivándose herniación del intestino delgado a nivel del orificio paraumbilical izquierdo (trocar óptico). El TC muestra claramente la dilatación del asa aferente y el colapso de la eferente.

Se realiza corrección quirúrgica a través de la herida del trocar óptico con buena evolución posterior.

---

Correspondencia autor: Dr. M<sup>a</sup> Mercé Pascual Queralt  
 Servicio de Urología. Fundación Puigvert.  
 Cartagena, 340-350. 08025 Barcelona  
 Telf.: 934 169 700  
 E-mail autor: mercepascualquer@hotmail.com  
 Información artículo: Imágenes en Urología  
 Trabajo recibido: noviembre 2007  
 Trabajo aceptado: diciembre 2007



**FIGURA 1.** Corte axial de la herniación.



**FIGURA 2.** Reconstrucción multiplanar con asa intestinal aferente distendida y asa eferente colapsada.



**FIGURA 3.** Reconstrucción 3D de hernia.