



## Fístula uretro-rectal tras recibir tratamiento por adenocarcinoma de próstata con radioterapia externa y crioterapia

### Urethro-rectal fistula following external radiotherapy and cryotherapy for prostatic adenocarcinoma



**Figura 1** – Se observa en la imagen sagital cómo la sonda vesical con la que el paciente acudió a Urgencias se encontraba alojada en el recto por una fístula recto-uretral secundaria al tratamiento recibido (radioterapia externa y crioterapia).



**Figura 2** – En el corte transversal de tomografía computarizada se visualiza el globo de la sonda vesical en el recto, no contrastándose la vejiga.

A. Rincón Mayans<sup>a\*</sup>, I. Pascual Piédrola<sup>a</sup>, E. Tolosa Eizaguirre<sup>a</sup>, J. Barba Abad<sup>a</sup>, J. Rioja Zuazu<sup>a</sup>, B. Zudaire Diaz-Tejeiro<sup>b</sup> e I. Vivas Pérez<sup>b</sup>

<sup>a</sup>Departamento de Urología, <sup>b</sup>Departamento de Radiodiagnóstico, Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, Navarra, España

\*Autor para correspondencia  
Correo electrónico: arincon@unav.es. (A. Rincón Mayans)