Ectasia tubular de la rete testis y otras lesiones escrotales benignas

Tubular ectasia of the rete testis and another benign scrotal lesions

Figuras 1 a 3 - Paciente con nódulo palpable de 1 cm en hemiescrotos izquierdo, demostrándose en la ecografía una lesión anecoica extratesticular compatible con quiste de túnica albugínea (fig 1). Mismo paciente; colección de imágenes quísticas y tubulares anecoicas en mediastinum testis en relación con ectasia tubular de la rete testis, que no debe confundirse con un tumor (fig 2). Espermatocoele en cabeza epididimaria, asociado a menudo a la ectasia de la rete testis (fig 3).

A.X. Casal Rodríguez*, P. Rodríguez Fernández,
C.M. Rodríguez Paz, A. Tilve Gómez y M. Otero García

Servicio de Urología, Hospital Xeral-Cies (CHUVI), Vigo, España

*Autor para correspondencia.

Correo electrónico: anton.casal.rodiguez@sergas.es
(A.X. Casal Rodríguez).

doi: 10.1016/j.acuro.2010.02.035

Reconstrucción genital en paciente con gangrena de Fournier

Genital reconstruction in a patient with Fournier gangrene

Figura 1 - Paciente de 51 años con antecedentes de alcoholismo crónico que presenta gangrena de Fournier, siendo precisa la realización de desbridamiento quirúrgico y limpieza del área genital por necrosis de la piel y del tejido celular subcutáneo extensa.

M.A. Arrabal-Polo^{a,*}, F. Almazán-Fernández^b, S. Merino-Salas^a,
S. Arias-Santiago^b, R. Armijo-Lozano^b, M. Arrabal-Martín^a y
A. Zuluaga-Gómez^a

^aServicio de Urología, Hospital Universitario San Cecilio, Granada, España

^bDermatología, Hospital Universitario San Cecilio, Granada, España

Figura 2 - Reconstrucción del área genital mediante colgajos de la piel escrotal restante, no siendo precisa la colocación de injertos de otras zonas del cuerpo.

*Autor para correspondencia.

Correo electrónico: arrabalp@ono.com (M.A. Arrabal-Polo).

doi: 10.1016/j.acuro.2010.02.036