Actas Urológicas Españolas

www.elsevier.es/acuro

Original – Andrología-Infertilidad

Evaluación de la autoestima en varones con disfunción eréctil tratados con sildenafil. Análisis de un grupo de pacientes españoles procedentes de un estudio multicéntrico internacional

J.M. Martínez-Jabaloyas^{a,*}, I. Moncada^b, L. Rodríguez-Vela^c, P.R. Gutiérrez^d y J. Chaves^e,
en representación del grupo español del estudio SMILE

^aServicio de Urología, Hospital Clínico Universitario, Valencia, España

^bServicio de Urología, Hospital de la Zarzuela, Madrid, España

^cServicio de Urología, Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España

^dDepartamento de Cirugía, Hospital Universitario de Canarias, Tenerife, España

^eDepartamento Médico de Pfizer, Madrid, España

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Historia del artículo:

Recibido el 3 de febrero de 2010

Aceptado el 31 de marzo de 2010

On-line el 29 de junio de 2010

Palabras clave:

Disfunción eréctil

Sildenafil

Inhibidor fosfodiesterasa tipo 5

Autoestima

Calidad de vida

RESUMEN

Introducción y objetivos: La disfunción eréctil (DE) provoca alteraciones psicológicas, principalmente ansiedad y pérdida de la autoestima. Intentamos conocer los cambios emocionales, basados en la autoestima y las relaciones, en un grupo de varones españoles con DE tras el tratamiento con sildenafil, utilizando para ello el cuestionario SEAR (Self-Esteem And Resatationship).

Material y método: De un estudio internacional multicéntrico, randomizado, grupos paralelos, doble ciego y controlado por placebo de sildenafil diseñado para evaluar la autoestima y relaciones en varones con DE, seleccionamos los pacientes reclutados en España.

Se compararon los cambios en los diferentes dominios del cuestionario SEAR (autoestima, actividad sexual, autoconfianza y relaciones generales) que se administró antes y después del tratamiento, así como los diferentes dominios del IIEF. También se calculó la correlación entre el cambio en el dominio autoestima del cuestionario SEAR y el dominio función eréctil del IIEF. El estudio estadístico se basó en un análisis de la covarianza del cambio en las puntuaciones y en un estudio de correlación.

Resultados: El grupo español de investigadores incluyó 119 pacientes. La puntuación del dominio función eréctil mostró una mejoría significativamente mayor para el grupo de sildenafil. La diferencia de cambio en la media de la puntuación total del SEAR tras el tratamiento fue de 16,9 (IC 95%: 8,9; 24,8) a favor de sildenafil respecto al placebo ($p=0,0001$), con una mejoría en la puntuación significativamente superior en todos los dominios del SEAR a favor de sildenafil. Se observó una correlación significativa entre los cambios en el dominio de autoestima del SEAR y el dominio función eréctil del IIEF para ambos grupos de tratamiento.

*Autor para correspondencia.

Correo electrónico: y jaba@pulso.com (J.M. Martínez-Jabaloyas).

Conclusiones: Se confirma una mejoría emocional en los pacientes tratados con sildenafil en base a la mejora en la autoestima, autoconfianza y las relaciones. Variaciones en el dominio función eréctil del IIEF muestran correlación con las del dominio autoestima del SEAR.

© 2010 AEU. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

Evaluation of self-esteem in males with erectile dysfunction treated with viagra. Analysis of a Spanish patients group selected from a multicenter, international study

A B S T R A C T

Keywords:

Erectile dysfunction
Sildenafil
Phosphodiesterase type 5 inhibitor
Self concept
Quality of life

Introduction and objectives: Erectile dysfunction (ED) leads to psychological disturbances, especially anxiety and loss of self-esteem. We try to understand the emotional changes, based on self-esteem and relationships in a group of Spanish men with ED after sildenafil treatment, with the use of the the SEAR questionnaire (Self-Esteem And Relationship).

Materials and methods: The patients recruited in Spain, where selected from an international, multicenter, randomized, parallel-group, double-blind, placebo-controlled, sildenafil study designed to assess self-esteem and relationships in men with ED.

We compared the changes in the different domains of the SEAR questionnaire (Self-esteem, sexual activity, self-confidence and general relationships) that was administered before and after treatment; the different domains of the IIEF was evaluated aswell. We also calculated the correlation between changes in self-esteem domain of the SEAR questionnaire. The statistical study was based on an analysis of covariance of change in scores and a correlation analysis.

Results: The Spanish group of researchers included 119 patients. The erectile function domain score showed significantly greater improvement for the group of sildenafil. The difference in change in total mean score of the SEAR after treatment was 16.9 (95% CI 8.9, 24.8) for sildenafil over placebo ($p=0.0001$), with a significantly higher score improvement in all the domains of the SEAR for Sildenafil. There was a significant correlation between the changes in the domain of self-esteem of the SEAR and the IIEF erectile function domain for both treatment groups.

Conclusions: Emotional improvement was confirmed in patients treated with sildenafil based on improved self-esteem, self-confidence and relationships. Changes in the IIEF erectile function domain correlate with the SEAR self-esteem domain.

© 2010 AEU. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.

Introducción

La salud sexual es un estado de completo bienestar físico mental y social referido a la sexualidad¹. Este concepto de salud sexual se acuñó durante la conferencia de 1975 de la OMS y desde entonces se incorpora, de forma variable, en los programas de salud pública de los distintos países, dependiendo principalmente su aplicación del grado de desarrollo de cada país. La prevalencia de la disfunción eréctil en España es del 19% en los varones entre 25-70 años, alcanzando el 32,3% entre los 60-70 años². Considerando el progresivo envejecimiento de la población y la pérdida de tabúes respecto a la sexualidad, hay que considerar que la disfunción eréctil es un serio problema de salud pública que se incrementará considerablemente en los próximos años.

Desde hace tiempo es conocido que la disfunción eréctil provoca alteraciones psicológicas, principalmente ansiedad y pérdida de la autoestima³⁻⁵. Además suele estar precedida de una serie de patologías como las enfermedades

cardiovasculares, diabetes, enfermedades neurológicas..., tratamientos farmacológicos y quirúrgicos, que merman la calidad de vida del sujeto.

Las herramientas utilizadas para los estudios de calidad de vida no son lo suficientemente adecuadas para evaluar la afectación que provoca la disfunción eréctil sobre esta, ya que estamos hablando de una enfermedad poco invalidante y cuyas repercusiones tienen lugar sobre todo en la esfera psicológica. Además está claro que las escalas de medida específicas para cada patología son más sensibles a pequeños cambios que se produzcan en la misma con lo que son más relevantes para pacientes y clínicos, aunque pierdan aspectos generales más allá de la enfermedad específica⁶. Así, muchos de los estudios en los que se determina la calidad de vida en la disfunción eréctil o cómo se modifica esta calidad de vida tras el tratamiento se han llevado a cabo con instrumentos inespecíficos para esta patología, por lo que no son capaces de reflejar adecuadamente la repercusión de la disfunción eréctil y de su tratamiento sobre la vida del paciente⁷. Este hecho ha llevado a desarrollar cuestionarios específicos de calidad de

vida para la disfunción eréctil, entre los que destaca el cuestionario de autoestima y relaciones «SEAR» (Self-Esteem And Relationship) que enfatiza sobre factores psicosociales y emocionales, que son los principalmente afectados cuando se altera la función eréctil. Este cuestionario ha demostrado su capacidad de cuantificar el grado de repercusión de la disfunción eréctil sobre ciertos aspectos de la calidad de vida reflejados en sus 2 dominios: relación sexual y autoconfianza, incluyendo esta última como componentes la autoestima y la capacidad de relación en general⁸. Además ha mostrado ser sensible a los cambios que se producen tras el tratamiento con éxito de la disfunción eréctil⁷, aunque sin un adecuado grupo control.

El objetivo de este estudio es evaluar, mediante un estudio doble ciego controlado con placebo, los cambios en la autoestima y las relaciones en un grupo de varones con disfunción eréctil tras el tratamiento con sildenafil, utilizando para ello el cuestionario SEAR.

Material y método

Estudio internacional multicéntrico, randomizado de grupos paralelos, doble ciego y controlado por placebo con dosis flexibles en el que se incluyeron 922 pacientes, entre los que hemos seleccionado el subgrupo de pacientes reclutados en España por los 9 centros que participaron en el estudio en nuestro país.

El criterio de inclusión fue: varones mayores de 18 años con pareja sexual estable durante el estudio y con diagnóstico de disfunción eréctil documentada por una puntuación del cuestionario de salud sexual del varón o «SHIM» («Sexual Health Inventory for Men») igual o menor a 21. Como criterios de exclusión: sujetos que hayan tomado más de 4 dosis de sildenafil, cualquier otro inhibidor de la fosfodiesterasa 5 o apomorfina antes de la visita de selección, o que hayan tomado cualquier dosis de estos compuestos en los 2 últimos meses. Uso concomitante de otros tratamientos para la disfunción eréctil. Presentar alguna contraindicación para el tratamiento con sildenafil. Cualquier condición o circunstancias que, a criterio del investigador, hicieran aconsejable la no participación del paciente en el estudio. El esquema de randomización ciego fue generado previo al estudio mediante ordenador. Los pacientes fueron randomizados en un ratio 2:1 para el grupo sildenafil y placebo respectivamente.

El estudio constaba de 6 visitas durante 14 semanas. Hubo un periodo de selección de 2 semanas (visita 1) y una fase de tratamiento de 12 semanas: la visita basal en la semana 0 (visita 2) y visitas de seguimiento en semana 2 (visita 3), semana 4 (visita 4), semana 8 (visita 5) y semana 12 (visita 6).

En la visita 1 o de selección se le explicaba al paciente las características del estudio y se obtenía el correspondiente consentimiento informado. Se realizaba una detallada historia clínica que incluía la administración del cuestionario SHIM y se averiguaban los antecedentes clínicos y demográficos, así como los tratamientos concomitantes. La exploración física incluía la determinación de tensión arterial y pulso en sedestación y bipedestación. Finalmente se dispensaba el diario del paciente compuesto de un cuestionario de 9 preguntas donde debe anotar cada vez que toma la

medicación del estudio y/o inicia una actividad sexual, así como los resultados de la misma. Se instaba al paciente a que intentara al menos 4 coitos en esas 2 semanas de selección.

En la visita basal, además de registrar si se había producido algún cambio clínico o en los tratamientos concomitantes se le administraba el cuestionario «SEAR» y el Índice Internacional de Función Eréctil (IIEF), se revisaba el diario y se randomizaba al paciente. El tratamiento comenzaba con dosis de 50 mg de sildenafil o placebo.

El cuestionario SEAR consiste en 14 preguntas, cada una de ellas con 5 posibles respuestas (apéndice 1). Está compuesto de 2 dominios: el dominio relaciones sexuales (preguntas 1-8) y dominio autoconfianza (preguntas 9-14) el cual a su vez se divide en 2 subescalas: la subescala autoestima (preguntas 9-12) y la subescala relación general (preguntas 13 y 14). A las preguntas 8 y 11 se les invierte la puntuación ya que están redactados en forma negativa y se puede obtener una puntuación para el total del cuestionario y una puntuación para cada una de los dominios y subescalas mencionados. Tanto la puntuación total como la puntuación de cada dominio fue transformada, de manera independiente para cada una de ellas, en una escala de 0-100 mediante la siguiente fórmula:

Escala transformada

$$= \frac{\text{Puntuación real bruta} - \text{puntuación bruta más baja posible}}{\text{Máximo recorrido posible de la puntuación bruta}} \times 100$$

Mayores puntuaciones indican mejor calidad de vida: 0 es la peor y 100 la mejor, por lo que cambios ascendentes tras el tratamiento en la subescala autoestima indicarán una mejoría de la autoestima del paciente.

En la visita 3, 4 y 5 tras determinar la tensión arterial en sedestación y bipedestación, se revisó la respuesta terapéutica, el tratamiento concomitante el diario del paciente y se dispensaba nueva medicación al paciente ajustando la dosis a 25, 50 o 100 en base a la eficacia y a los efectos secundarios.

En la visita 6 o en la visita de finalización, si se trataba de una visita de terminación prematura, además de revisar el diario, los efectos secundarios y los tratamientos concomitantes se volvía a administrar el cuestionario SEAR y el cuestionario IIEF, además de las cuestiones de eficacia global (apéndice 2) y la pregunta de satisfacción global (apéndice 3).

La eficacia se valoró en base al cuestionario SEAR, el Índice Internacional de Función eréctil y las preguntas de eficacia y de satisfacción global.

El primer parámetro de eficacia fue comparar los cambios en la visita 6 (semana 12) respecto a la basal en el dominio de autoestima del SEAR en la población con disfunción eréctil.

Los parámetros secundarios de eficacia fueron: comparar los cambios en la visita 6 (semana 12) respecto a la basal en los dominios actividad sexual, y relación del cuestionario SEAR, así como los cambios en los diferentes dominios del IIEF, en la proporción de coitos exitosos referidos en el diario del paciente (preguntas 5 y 6) y en las preguntas de eficacia global y de satisfacción global. También se calculó la correlación entre el cambio en el dominio autoestima del cuestionario SEAR y el dominio función eréctil del IIEF.

En el análisis estadístico las pruebas de contraste fueron de 2 extremos y el nivel de significación se estableció en el 5%. Se

analizó la homogeneidad de los grupos placebo y tratamiento en cuanto a antecedentes y severidad de la disfunción eréctil. El tratamiento fue analizado como una variable categórica siendo el placebo el grupo de referencia. Las diferencias entre los tratamientos fueron estimadas como «sildenafil-placebo» y fueron construidos intervalos de confianza al 95% entre todas las diferencias en tratamiento. Los cambios tras el tratamiento fueron computados como «fin de tratamiento basal». El estudio estadístico se basó en un análisis de la covarianza del cambio producido en la semana 12 respecto a la semana basal en la puntuaciones de los diferentes dominios del SEAR, del IIEF, de la pregunta 3 sobre la eficacia global y la pregunta de satisfacción global. Las preguntas 1 y 2 de eficacia global y se analizaron mediante un análisis de regresión logística. Para calcular las correlaciones entre los dominios autoestima del SEAR y función eréctil del IIEF utilizamos el coeficiente de correlación de Pearson.

Resultados

El grupo español de investigadores introdujo en el estudio 119 pacientes con una edad media de $52,8 \pm 10,2$ años. Los antecedentes clínicos y las características de la disfunción eréctil se describen en la tabla 1. El tiempo de duración de la disfunción eréctil desde el primer diagnóstico fue de 3,7 años para el grupo placebo y de 4,3 para el grupo de sildenafil ($p=N.S.$). Ambos

grupos de tratamiento fueron homogéneos en cuanto a antecedentes y características de la disfunción eréctil.

El índice internacional de función eréctil (fig. 1) muestra mejorías significativas en ambos grupos de tratamiento para el dominio función eréctil aunque 6 puntos mayor la

Figura 1 – Comparación de las puntuaciones del Índice Internacional de Función eréctil para los diferentes dominios. La p expresa la diferencia entre el grupo placebo y sildenafil en el cambio de puntuación de la visita basal a la semana 12.

Tabla 1 – Antecedentes clínicos y demográficos de los pacientes analizados y características de la disfunción eréctil. Comparación entre ambos grupos de tratamiento

	Total (119) n (%)	Placebo (41) n (%)	Sildenafil (78) n (%)	p
Edad				
Media	54	52,8	54,8	p=N.S. ^a
DS	10,9	10,2	11,4	
Tabaco				
No fumador	40 (33,6%)	19 (46,3%)	21 (26,9%)	p=N.S. ^b
Ex fumador	40 (33,6%)	14 (34,2%)	26 (33,3%)	
Fumador	39 (32,8%)	8 (19,5%)	31 (39,7%)	
Alcohol				
No	61 (51,3%)	24 (58,5%)	37 (47,4%)	p=N.S. ^b
Si	58 (48,7%)	17 (41,5%)	41 (52,6%)	
Hipertensión	43 (36,1%)	10 (24,4%)	33 (42,3%)	p=N.S. ^b
Dislipemia	33 (27,7%)	10 (24,4%)	23 (29,5%)	p=N.S. ^b
Diabetes Mellitus	23 (19,3%)	10 (24,4%)	13 (16,7%)	p=N.S. ^b
HBP	16 (13,4%)	5 (12,2%)	11 (14,1%)	p=N.S. ^b
Etiología Disfunción Eréctil				
Orgánica	56	19 (46,3%)	37 (47,4%)	p=N.S. ^b
Psicógena	14	6 (14,6%)	8 (10,3%)	
Mixta	48	16 (39,0%)	32 (41,0%)	
Severidad Disfunción Eréctil				
Sin DE	1 (0,08%)	1 (2,4%)	0 (0,0%)	p=N.S. ^b
DE leve	32 (26,9%)	7 (17,1%)	25 (32,1%)	
DE moderada	37 (31,1%)	13 (31,7%)	24 (30,8%)	
DE severa	49 (41,2%)	20 (48,8%)	29 (37,2%)	

N.S.: No significativo.

^a Test de la U de Mann-Whitney.

^b Test de la Chi cuadrado.

diferencia de puntuación pre y postratamiento a favor del grupo de sildenafil (p=0,0001). Lo mismo ocurre para el deseo sexual y la satisfacción sexual global donde también mejoraron significativamente las puntuaciones de ambos grupos, pero el cambio fue significativamente mayor para el grupo de sildenafil. La función orgásmica y la satisfacción por el coito mejoraron significativamente para el grupo de sildenafil pero no en el de placebo, con cambios también significativamente mayores en el primero.

Al analizar los resultados del cuestionario SEAR (tabla 2) observamos que para la autoestima, los pacientes con placebo no presentan diferencias antes y después del tratamiento mientras que los del grupo de sildenafil muestran una

mejoría significativa en la puntuación. Para el dominio actividad sexual, ambos grupos presentan mejoría significativa tras el tratamiento, pero el cambio es significativamente mayor para el grupo de sildenafil. En el dominio autoconfianza no hay diferencias entre la puntuación basal y al final del estudio en el grupo placebo mientras que los pacientes con sildenafil mejoraron significativamente, al igual que ocurre con el dominio de relación.

Respecto a las preguntas de valoración de eficacia global un 45,7% del grupo placebo contestaron «sí» a que el tratamiento había mejorado su erección, frente al 82,8% del grupo de tratamiento (p<0,0001). Para la segunda pregunta el 45,7% dijeron que el tratamiento había mejorado su capacidad para

Tabla 2 – Resultados de la puntuación del cuestionario SEAR para ambos grupos de tratamiento, así como de sus diferentes dominios, con la diferencia de cambio entre el grupo de placebo y el de sildenafil

	Placebo (n=39) Media (DEs)	Sildenafil (n=75) Media (DEs)	Placebo vs Sildenafil Dif. (IC 95%) p
Puntuación total			
Basal	44,0 (17,1)	44,9 (18,2)	0,9 (–5,3; 7,1) 0,7781
Semana 12	50,7 (24,2)	67,6 (22,3)	16,9 (8,9; 24,8) 0,0007
Valor de p	0,0716	<0,0001	
Dominio relaciones sexuales			
Basal	38,3 (16,7)	38,7 (18,9)	0,4 (–6,0; 6,7) 0,9122
Semana 12	47,2 (27,2)	65,6 (24,3)	18,4 (9,5; 27,3) 0,0001
Valor de p	0,0167	<0,0001	
Dominio Confianza			
Basal	51,5 (22,6)	53,1 (24,2)	1,6 (–7,2; 10,4) 0,7190
Semana 12	55,5 (25,4)	70,4 (22,7)	14,9 (6,7; 23,2) 0,0005
Valor de p	0,5422	<0,0001	
Subescala autoestima			
Basal	51,5 (23,0)	52,1 (24,8)	0,6 (–8,5; 9,7) 0,8989
Semana 12	56,7 (25,3)	70,8 (22,2)	14,1 (6,1; 22,1) 0,0007
Valor de p	0,2395	<0,0001	
Subescala relación general			
Basal	51,4 (29,9)	55,0 (28,2)	3,6 (–7,0; 14,2) 0,4992
Semana 12	52,7 (32,6)	69,5 (27,8)	16,9 (5,8; 27,9) 0,0030
Valor de p	0,7047	0,0001	

Tabla 3 – Resultados de las preguntas 6 y 7 del diario del paciente

	Placebo (n=39) Media (DEs)	Sildenafil (n=75) Media (DEs)	Placebo vs Sildenafil Dif. (IC 95%) p
% de erecciones suficientes penetración			
Basal	33,4 (37,3)	32,8 (44,5)	–0,6 (–12,3; 11,1) 0,9160
Semana 12	49,8 (46,5)	82,2 (34,2)	32,4 (17,9; 46,9) <0,0001
Valor de p	0,0151	<0,0001	
% de erecciones suficientes para un coito con éxito			
Basal	11,8 (25,4)	32,8 (44,5)	–6,3 (–15,0; 2,3) 0,1506
Semana 12	42,7 (43,3)	82,2 (34,2)	31,6 (15,9; 47,3) 0,0001
Valor de p	<0,0001	<0,0001	

el sexo frente al 81,2% del grupo sildenafil (p<0,0001) y la puntuación media de la tercera pregunta (erecciones suficientes para relación sexual con éxito) fue de $2,7 \pm 1,6$ para el grupo placebo y de $3,9 \pm 1,4$ para el de sildenafil (p<0,0001).

Para la pregunta de satisfacción global, también la puntuación del grupo de sildenafil ($3,5 \pm 1,1$ vs $2,6 \pm 1,1$) fue superior a la del grupo placebo (p=0,0001).

El resultado de las preguntas más relevantes del diario del paciente se muestra en la [tabla 3](#). En ellas se observan mejorías significativas del grupo de tratamiento con sildenafil respecto al grupo placebo, tanto en el porcentaje de erecciones suficientemente rígidas para la penetración como en la duración de las mismas.

Finalmente, se aprecia una correlación significativa entre los cambios en la puntuación de la subescala autoestima del SEAR y en la del dominio función eréctil del IIEF, con índice de correlación de 0,60 (p=0,0001) para el grupo placebo y de 0,50 para el grupo sildenafil (p<0,0001).

Discusión

La eficacia de sildenafil como tratamiento oral para la disfunción eréctil es un hecho suficientemente contrastado desde hace tiempo⁹ y su comercialización supuso una auténtica revolución terapéutica en este campo. Los diversos estudios demuestran una mejoría de la calidad de las erecciones en todos los métodos de evaluación, con cambios significativos respecto al placebo en el dominio función eréctil del IIEF, el % de erecciones suficientemente rígidas para el coito y el porcentaje de erecciones suficientemente duraderas del diario del paciente, así como en las preguntas de valoración tanto de eficacia como de satisfacción global. Los avances en medicina permiten que los tratamientos aplicados no solo consigan la curación de enfermedades y la mejoría de los síntomas, sino que además el paciente experimente una mejora en su calidad de vida. Así, una vez que conocemos sobradamente la eficacia del sildenafil en el tratamiento de la disfunción eréctil, pretendemos conocer si dicho tratamiento supone mejorar la calidad de vida del paciente, concretamente mejorar su autoestima, evaluado con una mejoría significativa en la puntuación de la subescala autoestima del cuestionario SEAR.

La calidad de vida en la disfunción eréctil puede verse afectada por 2 vías: las enfermedades que predisponen y acompañan a esta patología merman de forma importante la calidad de vida¹⁰⁻¹², también la disfunción eréctil puede afectar por sí misma la calidad de vida, ya que es un hecho conocido desde hace tiempo que la alteración de la función eréctil afecta negativamente sobre la psicología del individuo afectando a las relaciones con familiares y amigos⁴. En ocasiones es difícil establecer qué factores son los que más influyen, aunque los estudios muestran una relación entre la disfunción eréctil y el deterioro de la calidad de vida. Así, se ha descrito que la disfunción eréctil se asocia a una peor calidad de vida en pacientes con diabetes mellitus tipo II y su presencia muestra una asociación independiente con todas las dimensiones de la calidad de vida analizadas¹³. También se ha referido que los pacientes con disfunción eréctil y que son diabéticos presentan peor calidad de vida que los no diabéticos, aunque en los

primeros la disfunción eréctil es más severa¹⁴. En un estudio realizado en un grupo de pacientes en hemodiálisis, el dominio emocional del cuestionario SF-36 está muy asociado con la DE independientemente de otras comorbilidades¹⁵. Cabe destacar que aunque en algún caso se ha descrito una asociación predominante de la DE con los dominios físicos de la calidad de vida, reflejada por el cuestionario MOS-SF36¹⁶, se afectan preferentemente los dominios emocionales¹⁷.

A pesar de la relación entre calidad de vida y disfunción eréctil descrita en los estudios mencionados, como anteriormente hemos comentado, la utilización de cuestionarios de calidad de vida genéricos, presentan una baja sensibilidad para una patología como la disfunción eréctil, que no supone una enfermedad invalidante ni que amenace la vida pero que puede ocasionar efectos negativos sobre aspectos psicológicos, emocionales y de relaciones. Es por ello importante la utilización de cuestionarios específicos que sean sobre todo sensibles a los cambios en las dimensiones antes mencionadas. El primer cuestionario específico para la DE fue el denominado «Quality of Life-Male Erectile Dysfunction»¹⁸, desarrollado en 1996, con el problema de que tenía muchas preguntas (27) y carecía de una extensa validación. Posteriormente se desarrolló el «Erectile Dysfunction Effect on Quality of Life ED-EQoL» (ED-EQoL), que consiguió disminuir el número de preguntas sin disminuir la validación¹⁹. Por el mismo periodo se desarrolló un instrumento denominado «Psychological Impact of Erectile Dysfunction» (PIED)²⁰, que representa un avance porque captura la multidimensional naturaleza de las consecuencias psicológicas de la disfunción eréctil generando la puntuación en 2 subescalas: impacto psicológico de la disfunción eréctil en la experiencia sexual e impacto psicológico de disfunción eréctil sobre la vida emocional. Este cuestionario se utilizó para demostrar que los respondedores al tratamiento para la disfunción eréctil presentan mejora en ambas escalas²¹. Se ha intentado simplificar la cumplimentación de los cuestionarios por el paciente mediante la creación de uno específico para la disfunción eréctil basado en escalas análogo visuales pero está poco desarrollado²². Por último destacar la escala PAIRS (Psychological And Interpersonal Relationships Scale)²³, que ha mostrado ser una medida fiable de la autoconfianza sexual, la espontaneidad y de las preocupaciones temporales asociadas a la disfunción eréctil y su tratamiento.

La escala SEAR se trata de un cuestionario específico para la disfunción eréctil de reciente desarrollo^{24,25}. Está validado en España, lo que se realizó en el año 2004 durante la primera fase del estudio VESAR, llevado a cabo por Pfizer²⁶. Su importancia reside en la evaluación psicológica de la calidad de vida del paciente con disfunción eréctil, enfermedad que no supone una amenaza vital pero tiene un gran poder para estigmatizar y afectar psicológicamente al varón, principalmente a su autoestima y autoconfianza²⁷, que son los 2 aspectos psicosociales en los que se centra el cuestionario, con la ventaja de que permite una valoración global, una valoración específica para cada dominio (relación sexual y autoconfianza) y una valoración de los componentes del dominio autoconfianza (autoestima y relación general).

Aunque estudios previos habían mostrado que la mejoría en la función eréctil y sexual tras el tratamiento con sildenafil se asociaban a cambios positivos en las

dimensiones de bienestar psicológico y relaciones sexuales con la pareja^{28,29}, este estudio junto con otro similar llevado a cabo en EE.UU.³⁰, son los primeros controlados por placebo para evaluar los cambios que se producen en la autoestima, medida por la escala SEAR, tras el tratamiento de la disfunción eréctil con sildenafil.

Este estudio procede del análisis del subgrupo de pacientes incluidos en un estudio multicéntrico internacional llevado a cabo en 9 países europeos³¹. Los resultados son muy similares y las diferencias en alguno pueden ser atribuidas a la diferencia en el tamaño muestral. Esta concordancia en los resultados nos llevaría a pensar que las diferencias culturales entre nuestro país y el resto de países participantes no parecen tener influencia en el efecto del tratamiento sobre las variables analizadas.

Observamos que en algunos dominios de la escala SEAR se producen mejorías significativas en las puntuaciones para el grupo placebo, pero la diferencia en la puntuación es siempre significativamente mayor en el grupo de sildenafil. La mejoría en el grupo placebo tiene su explicación porque también existe una mejoría significativa en el dominio función eréctil para este grupo y en todas las escalas de valoración de eficacia. Ello tiene relación con el componente psicógeno de esta patología y la mejoría clínica que se produce solo con el hecho de estar recibiendo un tratamiento. Sin embargo, llama la atención que la escala autoestima no hay diferencias entre la puntuación basal y la final en el grupo placebo, lo que podría ser indicativo de la importancia que tiene la mayor eficacia del tratamiento sobre este aspecto, aunque el hecho de que en el estudio multicéntrico sí que existieran diferencias y la tendencia observada a una mejor puntuación tras el tratamiento nos puede inducir a pensar que la causa es el tamaño muestral. También observamos una buena correlación entre el dominio función eréctil del IIEF y la subescala autoestima del SEAR lo que nos indica que una parte importante de la variabilidad de la puntuación del SEAR puede ser explicada por las variaciones en la puntuación del dominio función eréctil.

Nuestro trabajo está en concordancia con otros estudios que revelan la importancia de la repercusión de la disfunción eréctil sobre el comportamiento psicosocial³², y además es una confirmación del cambio positivo que se produce al tratar la disfunción eréctil, lo que también coincide con los resultados obtenidos con otros inhibidores de la fosfodiesterasa 5 y otro tipo de escala^{33,34}.

La utilización de este cuestionario puede servir de complemento a otros cuestionarios de función sexual, como el IIEF, lo que nos permitirá conocer el grado de afectación de la disfunción eréctil sobre la calidad de vida.

Cabe destacar que, en un periodo relativamente corto de 12 semanas, haya un cambio tan significativo en la autoestima, lo que presupone que periodos más largos de tratamiento pueden producir una mejoría mucho mayor en los patrones psicológicos del paciente, ya que es posible que los cambios emocionales provocados en el individuo, en algunos casos durante años, precisen periodos más largos de tratamiento para revertir por completo.

Como conclusiones destacar que el SEAR es un instrumento válido para la evaluación de la autoestima en los varones con disfunción eréctil, así como los cambios que se producen tras

el tratamiento, con una buena correlación con el dominio función eréctil del IIEF y que los varones tratados con sildenafil muestran mejoras significativas respecto al placebo en su autoestima, autoconfianza y relaciones evaluados mediante la escala SEAR.

Financiación

El estudio fue financiado por Pfizer Inc.

Conflicto de intereses

José M. Martínez-Jabaloyas es investigador científico en ensayos clínicos patrocinados por Pfizer Inc, Bayer, y GlaxoSmithKline.

Ignacio Moncada actúa como investigador y conferenciante para Pfizer Inc., Lilly, Bayer-Schering, Janssen-Cilag, and AMS.

Luis Rodríguez-Vela participa en congresos como conferenciante para Pfizer Inc, Bayer, Lilly-ICOS y GlaxoSmithKline e investigador en ensayos clínicos para Pfizer Inc, Lilly-ICOS, Bayer y GlaxoSmithKline.

Pedro R. Gutiérrez participa en congresos como conferenciante y como investigador en ensayos clínicos para Bayer, Schering, Pharma, Lilly-ICOS y Pfizer Inc.

José Chaves es empleado de Pfizer España.

Agradecimientos

Han participado también en el grupo españoles de investigadores en la realización del ensayo clínico: Dr Rafael Gutiérrez. Hospital Clínic de Barcelona. Dr Cristóbal López. Hospital San Juan de Alicante. Dr Fernando Jiménez Cruz. Hospital Universitario La Fe. Valencia. Dr José Duarte. Hospital 12 de Octubre. Madrid Dr Carlos Pertusa Peñas. Hospital Cruces. Baracaldo. Dr Luis Martínez Piñeiro. Hospital La Paz. Madrid.

Apéndice 1. Cuestionario SEAR

Dominio de relación sexual

1. Me he sentido tranquilo al pensar en empezar cada relación sexual con mi pareja.
2. Me he sentido seguro de que mi erección duraría lo suficiente durante la relación sexual.
3. Me he sentido satisfecho de cómo he funcionado sexualmente.
4. He sentido que podría tener relaciones sexuales cuando surgieran de forma espontánea.
5. Me he sentido predispuesto a empezar yo las relaciones sexuales.
6. Me he sentido seguro de funcionar sexualmente.
7. Me he sentido satisfecho con nuestra vida sexual.
8. Mi pareja se ha sentido descontenta con la calidad de nuestras relaciones sexuales.

Dominio de Confianza

Subescala de autoestima

9. Me he sentido bien conmigo mismo.
10. Me he sentido como un hombre completo.
11. Estuve propenso a sentir que soy un fracasado.
12. Me he sentido seguro de mi mismo.

Subescala de relaciones generales.

13. Mi pareja se ha sentido satisfecha con nuestra relación en general.
14. Me he sentido satisfecho con nuestra relación en general.

Opciones de respuesta

1. Casi nunca/nunca.
2. Pocas veces (mucho menos de la mitad de las veces).
3. Algunas veces (aproximadamente la mitad de las veces).
4. La mayoría de las veces (mucho más de la mitad de las veces).
5. Casi siempre/siempre.

Nota: preguntas 8 y 11 son puntuadas a la inversa, de tal forma que una puntuación mayor indica una respuesta más favorable en todas las preguntas. Todas las preguntas están precedidas de la frase: «Durante las últimas 4 semanas».

Apéndice 2. Preguntas de eficacia global

1. Comparado con no tomar ningún tratamiento para el problema de erección, la medicación de estudio ha tomado durante las últimas 4 semanas ¿ha mejorado sus erecciones?
 - Sí
 - No
2. Comparado con no tomar ningún tratamiento para el problema de erección, la medicación de estudio que ha tomado durante las últimas 4 semanas ¿ha mejorado su capacidad para mantener relaciones sexuales?
 - Sí
 - No
 - No he intentado mantener relaciones
3. Cuando tomó una dosis de la medicación de estudio y tuvo estimulación sexual, ¿Con qué frecuencia consiguió una erección que le permitiera mantener relaciones satisfactoriamente?
 5. casi siempre o siempre.
 4. la mayoría de las veces (mas de la mitad de las veces).
 3. algunas veces (la mitad de las veces).
 2. unas pocas veces (menos de la mitad de las veces).
 1. casi nunca o nunca.
 0. no mantuve relaciones.

Apéndice 3. Pregunta sobre satisfacción global

Si usted el resto de su vida tuviera las erecciones que tiene en la actualidad ¿Cómo se sentiría?

1. Muy insatisfecho.
2. Insatisfecho.
3. Ni satisfecho ni insatisfecho.
4. Satisfecho.
5. Muy satisfecho.

BIBLIOGRAFÍA

1. United Nations. Health. In: Handbook of household surveys. 1Rev. ed. New York: United Nations; 1984.
2. Martin-Morales A, Sanchez-Cruz JJ, Saenz de Tejada I, Rodriguez-Vela L, Jimenez-Cruz JF, Burgos-Rodriguez R. Prevalence and independent risk factors for erectile dysfunction in Spain: results of the Epidemiologia de la Disfuncion Erectil Masculina Study. *J Urol.* 2001;166:569-74.
3. Krane RJ, Goldstein I, Saenz de Tejada I. Impotence. *N Engl J Med.* 1989;321:1648-59.
4. NIH Consensus Development Panel on Impotence. Impotence. *JAMA.* 1993;270:83-90.
5. Fugl-Meyer AR, Lodnert G, Branholm IB, Fugl-Meyer KS. On life satisfaction in male erectile dysfunction. *Int J impot Res.* 1997;9:141-8.
6. Guyatt GH, Feeny DH, Patrick DL. Measuring health related quality of life. *Ann Internal Med.* 1993;118:622-9.
7. Althof SE. Quality of life and erectile dysfunction. *Urology.* 2002;59:803-10.
8. Cappelleri JC, Althof SE, Siegel RL, Shpilsky A, Bell SS, Duttgupta S. Development and validation of the Self-Esteem And Relationship (SEAR) questionnaire in erectile dysfunction. *Int J Impot Res.* 2004;16:30-8.
9. Goldstein I, Lue TF, Padma-Nathan H, Rosen RC, Steers WD, Wicker PA, Sildenafil Study Group. Oral sildenafil in the treatment of erectile dysfunction. *N Engl J Med.* 1998;338:1397-404.
10. Ahroni JH, Boyko EJ, Davignon DR, Pecoraro RE. The health and functional status of veterans with diabetes. *Diabetes Care.* 1994;17:318-21.
11. Lawrence WF, Fryback DG, Martin PA, Klein R, Klein BE. Health status and hypertension: a population-based study. *J Clin Epidemiol.* 1996;49:1239-45.
12. Wee HL, Cheung YB, Li SC, Fong KY, Thumboo J. The impact of diabetes mellitus and other chronic medical conditions on health-related Quality of Life: is the whole greater than the sum of its parts? *Health Qual Life Outcomes.* 2005;3:2.
13. De Berardis G, Franciosi M, Belfiglio M, Di Nardo B, Greenfield S, Kaplan SH, et al. Quality of Care and Outcomes in Type 2 Diabetes (QuED) Study Group. Erectile dysfunction and quality of life in type 2 diabetic patients: a serious problem too often overlooked. *Diabetes Care.* 2002;25:284-91.
14. Person DF, Latini DM, Lubeck DP, Wallace KL, Henning JM, Lue TF. Do impotent men with diabetes have more severe erectile dysfunction and worse quality of life than the general population of impotent patients? Results from the Exploratory Comprehensive Evaluation of Erectile Dysfunction (ExCEED) database. *Diabetes Care.* 2003;26:1093-9.
15. Rosas SE, Joffe M, Franklin E, Strom BL, Kotzker W, Brensinger C, et al. Association of decreased quality of life and erectile dysfunction in hemodialysis patients. *Kidney Int.* 2003;64:232-8.
16. Sanchez-Cruz JJ, Cabrera-Leon A, Martin-Morales A, Fernandez A, Burgos R, Rejas J. Male erectile dysfunction and health-related quality of life. *Eur Urol.* 2003;44:245-53.
17. Litwin MS, Nied RJ, Dhanani N. Health-Related Quality of Life in Men with Erectile Dysfunction. *J Gen Intern Med.* 1998;13:159-66.
18. Wagner TH, Patrick DL, McKenna SP, Froese PS. Cross-cultural development of a quality of life measure for men with erection difficulties. *Qual Life Res.* 1996;5:443-9.
19. MacDonagh R, Ewings P, Porter T. The effect of erectile dysfunction on quality of life: psychometric testing of a new quality of life measure for patients with erectile dysfunction. *J Urol.* 2002;167:212-7.

20. Latini DM, Penson DF, Colwell HH, Lubeck DP, Mehta SS, Henning JM, et al. Psychological impact of erectile dysfunction: validation of a new health related quality of life measure for patients with erectile dysfunction. *J Urol.* 2002;168:2086-91.
21. Latini DM, Penson DF, Lubeck DP, Wallace KL, Henning JM, Lue TF. Longitudinal differences in disease specific quality of life in men with erectile dysfunction: results from the Exploratory Comprehensive Evaluation of Erectile Dysfunction study. *J Urol.* 2003;169:1437-42.
22. Torrance GW, Keresteci MA, Casey RW, Rosner AJ, Ryan N, Breton MC. Development and initial validation of a new preference-based disease-specific health-related quality of life instrument for erectile function. *Qual Life Res.* 2004;13:349-59.
23. Swindle RW, Cameron AE, Lockhart DC, Rosen RC. The Psychological and Interpersonal Relationship Scales: Assessing Psychological and Relationship Outcomes Associated With Erectile Dysfunction and Its Treatment. *Archives of Sexual Behavior.* 2004;33:19-30.
24. Cappelleri JC, Bell SS, Stecher V, Althof SE, Shpilsky A, Duttgupta S, et al. Development and validation of self-esteem/overall relationship questionnaire (SEORQ) in erectile dysfunction (abstract). *Pharmacoepidemiol Drug Saf.* 2002;11(suppl 1):S122.
25. Althof SE, Cappelleri JC, Shpilsky A, Stecher V, Diuguid C, Sweeney M, et al. Treatment responsiveness of the Self-Esteem And Relationship questionnaire in erectile dysfunction. *Urology.* 2003;61:888-92.
26. Rejas-Gutierrez J, Cabello-Santamaria F, Calle-Pascual A, Chantada-Abad V, Fora-Eroles F, Garcia-Garcia M, et al. Validación de la versión española del cuestionario SEAR (Self-Esteem And Relationship Questionnaire) para varones con disfunción eréctil. *Med Clin (Barc).* 2005;125:565-73.
27. Tomlinson J, Wright D. Impact of erectile dysfunction and its subsequent treatment with sildenafil: qualitative study. *BMJ.* 2004;328:1037.
28. Giulano F, Peña BM, Mishra A, Smith MD. Efficacy results and quality-of-life measures in men receiving sildenafil citrate for the treatment of erectile dysfunction. *Qual Life Res.* 2001;10:359-69.
29. Paige NM, Hays RD, Litwin MS, Rajfer J, Shapiro MF. Improvement in emotional well-being and relationships of users of sildenafil. *J Urol.* 2001;166:1774-8.
30. O'Leary L, Michael P, Althof A, Stanley E, Cappelleri C, Joseph C. The United States Self-Esteem and Relationship Questionnaire Study Group Self-Esteem, Confidence and Relationship Satisfaction of Men With Erectile Dysfunction Treated With Sildenafil Citrate: A Multicenter, Randomized, Parallel Group, Double-Blind, Placebo Controlled Study in the United States. *J Urol.* 2006;175:1058-62.
31. Moncada I, Martínez-Jabaloyas JM, Rodríguez-Vela L, Gutiérrez PR, Giuliano F, Koskimaki J, et al. Emotional changes in men treated with sildenafil citrate for erectile dysfunction: a double-blind, placebo-controlled clinical trial. *J Sex Med.* 2009;6:3469-77.
32. Martín-Morales A, Mejjide Rico F, García González JJ, Regadera Anechina L, Manero Font M. Repercusiones psicológicas de la disfunción eréctil sobre la autoestima y autoconfianza. *Actas Urol Esp.* 2005;29:493-8.
33. Martín-Morales A, Mejjide F, García N, Artes M, Muñoz A. Efficacy of vardenafil and influence on self-esteem and self-confidence in patients with severe erectile dysfunction. *J Sex Med.* 2007;4:440-7.
34. El Khiat Y, Ghazi S, Allam A, Khawaja M, Belger M, Tamer M, et al. Psychosocial impact and effectiveness of tadalafil among treatment-naïve and previously-treated men with erectile dysfunction in Saudi Arabia and other Gulf-region countries. *Curr Med Res Opin.* 2008;24:1965-73.