

CARTAS AL DIRECTOR

A propósito del artículo de Lagares Borrego, A. et al.: “Reconstrucción de párpado inferior mediante colgajos miocutáneos en isla de los músculos orbicular y nasal”. *Cir. plást. iberolatinoam.*, Mar 2009, vol. 35, no. 1, p. 35-42.

Estimada Araceli: Leí tu artículo de reconstrucción de párpado. Me parece una gran contribución a nuestra especialidad. Tu revisión bibliográfica internacional es orientadora. Pero no veo ninguna cita de nuestra Revista Iberolatinoamericana. Tal vez ignores algunas aportaciones interesantes. Te invito a leer algo que escribí al respecto en *Cir. plást. iberolatinoam.*, 1995, 21 (2).

Te felicito y te envío un cordial saludo

Dr. Carlos del Vecchy Calcáneo

*Jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva
Hospital General de México. Ciudad de México*

RESPUESTA AL DR. CARLOS DEL VECCHYO

En primer lugar, agradecerle el comentario al Dr. C. del Vecchy. Hemos leído con interés su artículo (1). Es cierto que en nuestra revisión bibliográfica no lo citamos, desconocíamos su existencia; aunque sí que nombramos otras citas bibliográficas en las que se recoge el uso del mismo tipo de reconstrucción palpebral basada en el empleo de un colgajo nasogeniano de pedículo subcutáneo superior. Todas estas citas son posteriores a la del Dr. C. del Vecchy. En nuestro artículo intentamos mostrar las ventajas de la elección de colgajos miocutáneos en isla basados en la vascularización que aporta el sistema musculoaponeurotico superficial (y en concreto, los músculos orbicular y nasal). Esto permite un mejor arco de rotación y avance de los colgajos, sobre todo en pacientes más jóvenes, frente a los colgajos en isla de pedículo subcutáneo.

1. **Del Vecchy Calcáneo C, Gamboa López F.**: “Reconstrucción del párpado inferior”. *Cir. plast. iberolatinoam.* 1995; 21 (2): 121-6.

Un cordial saludo

Dra. Araceli Lagares Borrego