IMÁGENES EN PATOLOGÍA DIGESTIVA

Carcinoide biliar intrahepático

R. Jiménez, A. Beguiristain, I. Ruiz-Montesinos, F. Villar, M. A. Medrano, F. Garnateo
y M. Echenique Elizondo¹

Departamento de Cirugía. Hospital Donostia. ¹Universidad del País Vasco. San Sebastián, Guipúzcoa

INTRODUCCIÓN

Los tumores carcinoides del tracto biliar son extremadamente infrecuentes y representan de 0,2-2% de todos carcinoides del tracto gastrointestinal (1). Entre ellos el carciñoide biliar del tracto intrahepático es sumamente raro.

CASO CLÍNICO

Varón de 60 años de edad que es ingresado presentando un cuadro de ictericia. La RMN y colangio-RMN establecieron el diagnóstico de sospecha de colangiocarcinoma (Figs. 1 y 2). En el curso de la intervención se consiguió la resección de una masa en el área de la bifurcación biliar y reconstrucción de la continuidad biliar mediante anastomosis segmentarias a un asa desfuncionalizada yeyunal en Y de Roux. El estudio histopatológico reveló se trataba de un tumor carciñoide (Figs. 3 y 4).

Figs. 1 y 2. Colangio-MRN. Masa en bifurcación biliar extendiéndose a conducto biliar izquierdo.

COMENTARIOS

El tumor del carciñoide del conducto biliar es una forma rara de obstrucción biliar, con menos que 34 casos publicados en la literatura inglesa (2). Los lugares de afectación más comunes son BBP –vía biliar principal– (58%), región perihiliar (28%), conducto cístico (11%) y conducto hepático común (3%). Presenta un cuadro clínico similar al colangiocarcinoma. El tiempo medio de supervivencia según una revisión actual resultó de 102 meses mientras era de 33 meses para pacientes afectados de colangiocarcinoma en la misma serie (1).

Fig. 3. H-E x100. Células redondeadas y poligonales con estructura trabecular.

Fig. 4. Tinción positiva a cromogranina.

La información disponible sugiere que pacientes con carcinoides biliares tienen un pronóstico favorable general después de tratamiento quirúrgico agresivo (3). El intervalo libre de enfermedad después de resección curativa en otro estudio resultó de ser 32 meses (rango: 3 meses-20 años) (4).

Los carcinoides biliares constituyen un subconjunto muy infrecuente pero identificable de tumores del árbol biliar. La terapia adyuvante continúa siendo objeto de valoración. La información disponible sugiere que los pacientes con carcinoides biliares tienen un pronóstico general bueno tras actuación quirúrgica agresiva (5).

BIBLIOGRAFÍA

1. Hubert C, Sempoux C, Berquin A, Deprez P, Jamar F, Gigot JF. Bile duct carcinoid tumors: an uncommon disease but with a good prognosis? *Hepatogastroenterology* 2005; 52(64): 1042-7.
2. Pawlik TM, Shah S, Eckhauser FE. Carcinoid tumor of the biliary tract: treating a rare cause of bile duct obstruction. *Am Surg* 2003; 69: 98-101.
3. Maitra A, Krueger JE, Tascilar M, Offerhaus GJ, Angeles-Angeles A, Klimstra DS, et al. Carcinoid tumors of the extrahepatic bile ducts: a study of seven cases. *Am J Surg Pathol* 2000; 24: 1501-6.
4. El Rassi ZS, Mohsine RM, Berger F, Thierry P, Partensky CC. Endocrine tumors of the extrahepatic bile ducts. Pathological and clinical aspects, surgical management and outcome. *Hepatogastroenterology* 2004; 51: 1295-300.
5. Modlin IM, Shapiro MD, Kidd M. An analysis of rare carcinoid tumors: clarifying these clinical conundrums. *World J Surg* 2005; 29(1): 92-101.