Schwanoma de la fosa pterigopalatina. Abordaje endoscópico

L. Rosique-López; M. Rosique-Arias* y F.J. Sánchez-Celemin*

Servicio de Otorrinolaringología Hospital Rafael Méndez. Lorca. *Servicio de Otorrinolaringología Hospital Virgen Arrixaca. Murcia

Resumen

Exponemos las características anatómicas de la fosa pterigopalatina (FPP) y la patología que se puede originar en ella. A continuación se muestra la experiencia quirúrgica en un caso de schwanoma de FPP de cinco centímetros de diámetro que pudo ser extirpada por cirugía endoscópica transnasal, evitando así un abordaje externo. Los schwannomas constituyen del 8 al 10% de los tumores intracraneales. Su asiento principal es la rama vestibular del VIII nervio craneal, siendo los trigeminales a nivel de FPP de escasa frecuencia.

PALABRAS CLAVE: Fosa pterigopalatina. Schwanoma. Endoscopia nasal.

Pterygopalatine fossa schwannoma. Endoscopic approach

Summary

We expose the anatomical characteristics of the pterygopalatine fossa (FPP) and the pathology that can cause it. Below is the surgical experience in a case of schwannoma of FPP five centimeters in diameter that could be removed by transnasal endoscopic surgery, being unnecessary an external surgery. Schwannomas constitute the 8-10% of intracranial tumors, normally localized in the vestibular branch of the VIII cranial nerve. A schwannoma of a branch of the trigeminal nerve in the pterygopalatine fossa is exceptional.

KEY WORDS: Pterygopalatine fossa. Schwannoma. Nasal endoscopy.

Introducción

La fosa pterigopalatina (FPP) es un espacio con forma de pirámide invertida que se encuentra localizada inmediatamente posterior al seno maxilar, anterior al proceso

pterigoideo del esfenoides, inferior al ala mayor del esfenoides y lateral al hueso palatino. En el ápex de esta pirámide se encuentra la entrada al canal palatino mayor. La fosa pterigopalatina es un punto de comunicación entre diferentes zonas de la cavidad craneal a través de diversas hendiduras y forámenes³. Lateralmente esta fosa comunica con la fosa infratemporal a través de la escotadura pterigo maxilar. Permite el paso de la arteria maxilar interna. Medialmente la FPP conecta: con la cavidad nasal a través del agujero esfenopalatino permitiendo el paso de los vasos y nervio esfenopalatinos, y con la nasofaringe vía canal palatovaginal. Anteriormente comunica con la órbita a través de la escotadura y foramen infraorbitario por el que discurre el nervio infraorbitario (rama terminal del nervio maxilar o V2), y con la hendidura esfenomaxilar, por el que discurre el ramo zigomático de V2. Posteriormente conecta con la fosa craneal media a través del agujero redondo por el que discurre el nervio maxilar o V2 y a través del canal vidiano por el que discurre el nervio vidiano. Inferiormente comunica con la cavidad oral gracias a los agujeros palatinos mayores y menores^{3,11}. Las estructuras vasculares de esta fosa se encuentran en un plano anterior a las estructuras nerviosas. El tercio distal de la arteria maxilar interna penetra en la fosa a través de la fisura pterigomaxilar discurriendo a través de este espacio. Sus ramas terminales son la arteria faríngea o palatovaginal la cual atraviesa el agujero palatovaginal para dar vascularización a la nasofaringe, y las arterias esfenopalatina y nasal posterior las cuales abandonan la fosa por el agujero esfenopalatino. El curso de la arteria maxilar interna es variable y tortuosa estando rodeada de tejido graso en la parte más anterior de la fosa pterigopalatina.

En la parte posterior de las estructuras vasculares y en la parte superior y medial de la fosa hallamos las estructuras nerviosas: nervio vidiano, división de la segunda rama del trigémino (rama maxilar o V2), ganglio esfenopalatino y nervio palatino mayor. El nervio vidiano tiene su origen en la cavidad intracraneal, resultante de la unión del petroso mayor (parasimpático) y petroso profundo (simpático) penetra en el foramen lacerum y a través del canal vidiano

Recibido: 12-04-10. Aceptado: 9-07-10

Abreviaturas. FPP: fosa pterigopalatina. PPF: pterygopalatine fossa

Figura 1. Fosa pterigopalatina izquierda. Límites y contenido.

del hueso esfenoidal llega a la fosa pterigopalatina estando situado inferior y medial al agujero redondo y posterior al ganglio esfenopalatino.

El nervio maxilar, segunda rama del nervio trigémino (V2), atraviesa el agujero redondo en la parte más superior y lateral de la fosa dando ramas al ganglio esfenopalatino, nervio alveolar posterior y sus ramas terminales son el nervio zigomático e infraorbitario. El nervio palatino mayor se origina en el ganglio esfenopalatino alcanzando, acompañado de su arteria, el agujero palatino mayor que da la innervación sensitiva al hemipaladar. El nervio infraorbitario viaja en la parte más anterior y lateral de la FPP y sobre el seno maxilar bordeando el borde lateral de la fosa pterigopalatina y el borde medial de la fosa infratemporal. El ganglio esfenopalatino posee una forma triangular y recibe tres ramas: nervio vidiano, V2, y nervios palatinos (mayores y menores). En su parte inferior, pequeñas fibras de este ganglio se unen al V2 para proporcionar la innervación autonómica a la glándula lacrimal. En la figura 1 representamos un diagrama sencillo de la fosa pterigopalatina izquierda, donde se muestra esquemáticamente, sus límites y su contenido.

Un 4% de los tumores neurogénicos se localizan en las cavidades paranasales; se pueden tratar de schwannomas, neurofibromas, sarcomas neurogénicos y aquellos asociados a la enfermedad de von Recklinghausen. Los schwannomas son tumores de lento crecimiento. El 60% se originan en el neurilema de los nervios craneales, principalmente en la zona de entrada de la raíz. En esta zona se realiza la transición de la mielina central con la periférica. Los nervios sensitivos son especialmente afectados, mientras que la incidencia de los motores suele asociarse a

neurofibromatosis^{10,11}. En general, los schwannomas constituyen del 8% al 10% de los tumores intracraneales y su asiento principal es la división superior de la rama vestibular del VIII nervio craneal y en escasa frecuencia, en orden descendente, derivan del V, IX, X y VII pares craneales. Los originados en el trigémino representan del 0.8 hasta el 8% de todos los schwannomas intracraneales. Hasta el momento actual en la literatura inglesa, se han publicado aproximadamente 428 casos de schwannomas trigeminales, desde la primera descripción en 1849 hecha por Smith¹¹. Estos tumores pueden originarse de la raíz nerviosa, del ganglio de Gasser o de cualquiera de las tres divisiones del nervio trigémino; por lo tanto, pueden ocupar los pisos posteriores y/o medio de la base del cráneo e incluso compartimentos extracraneales, confundiendo en muchas ocasiones con tumores primarios de dichas regiones^{12,13}.

Yoshida y Kawase¹³ los clasifican en 6 tipos: 1. *M*, a los localizados en la fosa media, ya sea que se hayan originado del ganglio de Gasser o de algunas de sus ramas en la pared del seno cavernoso; 2. *P*, a los que se originan de la raíz del trigémino y por consiguiente se localizan en la fosa posterior; 3. *E*, a los originados extracranealmente de alguna de las divisiones del V par; 4). *MP*, a los tumores que se encuentran en la fosa media y la posterior; 5. *ME*, a los localizados en el piso medio con extensión extracraneal; 6. *MPE*, a los que se ubican en los tres compartimentos.

Existe poca bibliografía respecto a tumores originados en la fosa pterigomaxilar siendo más frecuentes aquéllos que la invaden por extensión de tumores intracraneales de la base del cráneo o de los senos paranasales.

Los abordajes quirúrgicos pueden ser mediante rino-

Figura 2. Diseción de agujero esfenopalatino. CO (Coana), CM (cornete medio), PSM (Pared posterior seno maxilar).

tomía lateral, transoral o transpalatal, degloving mediofacial, abordaje de Wewer-Fergusson y endoscópicos. La técnica endoscópica para la exposición de la FPP la describiremos a continuación^{4,6}.

Técnica endoscópica

Para realizar el abordaje endoscópico de la fosa pterigopalatina, éste se debe iniciar realizando una antrostomía ampliada extendiéndola hasta el nivel de la pared posterior del seno maxilar (Figura 2). La cola del cornete medio puede ser extirpada previa coagulación amplia con pinza bipolar para mejor visualización^{5,7}. Se realiza un colgajo mucoso desde la pared nasal posterolateral a la cresta etmoidal. Se puede observar ahora el agujero esfenopalatino expuesto, se procede a la exéresis de la cresta etmoidal y apófisis orbitaria del palatino. Pueden empezar a observarse estructuras vasculares como son la arteria esfenopalatina o sus ramas (septal y nasal posterior). Podremos ver el relieve del canal infraorbitario en la parte anterior y lateral de la pared superior del seno maxilar⁵.

Se procede posteriormente, con pinza de Citelli o Kerrison, a retirar la pared posterior del seno maxilar desde su extremo medial a lateral hasta el borde medial del nervio infraorbitario^{7,9}. En este punto la arteria esfenopalatina es disecada y cauterizada o ligada evitando así posible daño de las estructuras neurales posteriormente (Figura 3).

El ganglio esfenopalatino yace justo en la parte posterior de la arteria maxilar interna, medial e inmediatamente anterior al canal vidiano (Figura 4). Con disección roma con una espátula se puede ir rechazando la grasa avanzando hacia atrás hasta encontrar el ganglio esfenopalatino, y mediante su tracción ligera desde el fondo, la rama maxilar y el nervio vidiano. Si traccionamos del nervio infraorbitario en su parte posterior podremos delimitar el agujero redondo y el V2 superolateral al canal vidiano. El

Figura 3. Extirpación de la pared posterior del seno maxilar. NI (Nervio infraorbitario), AEP (arteria esfenopalatina).

Figura 4. Visualización de las estructuras nerviosas de la FPP. NV (Nervio Vidiano), GE (Ganglio esfenopalatino), NM (Nervio Maxilar, en el agujero redondo), NP (Nervio Palatino).

nervio palatino mayor puede verse abandonando el ganglio esfenopalatino en su parte inferior.

Con la exéresis del proceso orbitario del palatino puede movilizarse cuidadosamente hacia la parte lateral el nervio palatino mayor para evitar tracciones y daño de este nervio. Si fuera necesario el abordaje al receso lateral esfenoidal, se retira la pared ósea posterior de la fosa pterigopalatina que corresponde a la pared anterior del receso esfenoidal^{1,9}.

Caso clínico

Se trata de una mujer de 52 años que consulta por primera vez en el servicio de otorrinolaringología, por

Figura 5. A. Imagen RNM, prequirúrgica. B. Se observa tumoración tras retirar la pared posterior de seno maxilar; Tm (Tumoración), Cm (Cornete medio). C. Aspecto de fosa pterigopalatina tras exéresis de tumor, y pieza quirúrgica. D. Imagen de RNM post quirúrgica.

parestias hemifacial y periorbitaria derecha de un mes de evolución; asocia cefalea sin rinorrea ni sensación de ocupación nasal. La rinoscopia anterior presentaba aspecto normal. Se realiza una exploración mediante endoscopia observando abombamiento a nivel de la cola del cornete medio sin alteración de la mucosa. Tras la exploración se decide petición de estudio radiológico mediante TAC con contraste y RNM el cual informaba de masa expansiva de partes blandas que se presenta hiperintensa en secuencia T2, y escasamente captante de contraste, compatible por sus características radiológicas, con un tumor de origen neurogénico (Figura 5A). Ante los hallazgos y diagnóstico probable se consulta a radiología intervencionista sin que se considere indicada la embolización previa a la cirugía. Mediante cirugía endoscópica se realizó la disección de la tumoración nasal siendo el resultado postoperatorio satisfactorio (Figura 5B, 5C, 5D). El resultado anatomopatológico de la pieza quirúrgica (5C) fue de tumor neurogénico, compatible con schwannoma.

Discusión

Los schwannomas son tumores de lento crecimiento. El 60% se originan en el neurilema de los nervios craneales, principalmente en la zona de entrada de la raíz, también denominada de Obersteiner-Redlich. Los nervios sensitivos son especialmente afectados. Por los casos ya descritos y por el nuestro, podemos evidenciar características importantes de los mismos. La media de edad en momento del diagnóstico es de 39.5 años, con un rango amplio que va desde los 7 a los 63 años, existiendo un franco predominio en el sexo femenino (22 pacientes/81.5%). En lo que respecta a la sintomatología, la duración desde el inicio hasta el diagnóstico se sitúa entre 9 días hasta 13 años, con una media de 24 días a 6 meses. Los síntomas y signos de afección al nervio trigémino, evidentemente, fueron los preponderantes de éstos, el dolor facial hipoestesia parestias y paresia de masticadores. El diagnóstico clínico se torna difícil; por lo tanto, las imágenes nos ayudan ampliamente. En la TC el tumor se presenta isodenso o

ligeramente hiperdenso y suele realizarse intensamente con la administración de contraste; la ventana ósea nos muestra alteraciones de los huesos circundantes que, más que erosionados y destruidos, se presentan desplazados por el tipo de crecimiento tumoral. En la Resonancia Magnética se muestran bien definidos y circunscritos, isointensos o hipointensos, en relación al parénquima cerebral, en T1 e hiperintenso en T2. En la angiografía se muestran avasculares, con desplazamiento de vasos vecinos^{2,8}.

La fosa pterigopalatina (FPP) es un espacio con forma de pirámide invertida que se encuentra localizada inmediatamente posterior al seno maxilar, este espacio contiene tanto estructuras vasculares y nerviosas, donde pueden asentar diversas patologías, es también un lugar de encrucijada ya que comunica con diversas estructuras como son la cavidad nasal, fosa infratemporal, fosa craneal media y órbita. Es por ello una estructura anatómica complicada siendo necesario al plantear un procedimiento sobre ella, su conocimiento exhaustivo.

Conclusiones

La cirugía endoscópica nasosinusal (CENS) es una técnica quirúrgica muy extendida que permite el tratamiento de múltiples enfermedades del área nasosinusal. Se trata de un procedimiento con raras complicaciones, aunque a la hora de la cirugía el paciente debe ser informado tanto de las complicaciones menores, que se resolverán espontáneamente, como de otras complicaciones mayores que necesitarán reingreso, o incluso nuevo tratamiento quirúrgico⁸. El abordaje mediante endoscopia de la FPP evita los abordajes externos, presentando menor morbilidad que éstos. El conocimiento anatómico y endoscópico de la FPP permitirá realizar estas intervenciones con mínimo riesgo.

Bibliografía

1. Andrew, P. Lane.: Endoscopic pterygopalatine space surgery Operative Techniques in Otolaryngology-Head and Neck Surgery; 14. 3: 212-215 A.
2. Aronsohn, Michael S., et al.: Utility of Image Guided Surgery in the Diagnosis of Pterygopalatine Fossa Lesions. Laryngoscope 2004; 114: 424-427.
3. Attia, E.L., Bentley, K.C., Head, T., Mulder, D.: A

new external approach to the pterygomaxillary fossa and parapharyngeal space. Head Neck Surg. 1984; 6: 884-891.

4. Cappabianca, P., de Divitiis, E. Back to the Egyptians: neurosurgery via the nose. A five-thousand year history and the recent contribution of the endoscope. Neurosurg Rev. 2007; 30: 1-7.

5. Fortes, Felipe S.G., Sennes, L.U.; Carrau, R.L., et al.: Endoscopic Anatomy of the Pterygopalatine Fossa and the Transpterygoid Approach: Development of a Surgical Instruction Model. Laryngoscope 2008; 118: 44-49.

6. John, M., Del Gaudio, J.: Endoscopic transnasal approach to the pterygopalatine fossa. Otolaryngol. Head and Neck Surgery 2003; 129: 441-445.

7. Luigi M. Cavallo, Andrea Messina, et al.: Extended Endoscopic Endonasal Approach to the Pterygopalatine Fossa: Anatomical Study and Clinical Considerations. Neurosurgery Focus 2005; 19 (1).

8. Martínez Ferreras, A., Rodrigo Tapia, J.P., Llorente Pendás, J.L., Suárez Nieto.: Endoscopic nasal surgery for pterygopalatine fossa schwannoma. C. Acta Otorrinolaringol Esp. 2005; 56: 41-43.

9. Melissa McCarty Statham, Thomas A. Tami: Endoscopic anatomy of the pterygopalatine fossa. Operative Techniques in Otolaryngology. 2006; 17: 197-200.

10. Mitchell, J., Alburger, W., Bolger, M., Frew, A., Richardson: Otolaryngology Three-dimensional imaging of the pterygopalatine fossa. Head and Neck Surgery; 36 6: 1014-1016 A.

11. Smith, R.W.: A Treatise on the Pathology, Diagnosis and Treatment of Neuroma. Dublin: Hodges and Smith, 1849.

12. Tiwari, R., Quak, J., Egeler, S., Smeele, L., Waal, I.V., Valk, P.V., Leemans, R.: Tumors of the infratemporal fossa. Skull Base Surg. 2000; 10: 1-9.

13. Yoshida, K., Kawase.: Trigeminal neurinomas extending into multiple fossae: surgical methods and review of the literature. J. Neurosurg 1999; 91: 202-211.

Rosique-López, L.; Rosique-Arias, M.; Sánchez-Celemin, F.J.: Schwannoma de la fosa pterigopalatina. Abordaje endoscópico. Neurocirugía 2010; 21: 405-410.

Correspondencia. Lina Rosique López. Calle Carril del Salabroque 3, 30012 Murcia.

lrosiquel@hotmail.com

Comentario al trabajo *Schwannoma de la Fosa Pterigopalatina. Abordaje endoscópico de Rosiqui y cols.*

En este trabajo los autores nos presentan un schwannoma de la fosa pterigopalatina sintomático tratado mediante abordaje endoscópico endonasal. El resultado es muy satis-

factorio, y la técnica endoscópica aplicada es claramente ventajosa en relación a otros posibles abordajes transfaciales o transcraneales a la fosa pterigopalatina que potencial-

mente conllevan mayor morbilidad quirúrgica.

El éxito de este trabajo radica, sin lugar a dudas, en la meticulosa y prudente aplicación del conocimiento anatómo-quirúrgico previamente adquirido. Las ilustraciones de la anatomía quirúrgica de la fosa pterigopalatina tienen gran valor didáctico y su completa asimilación es fundamental para el desarrollo de un abordaje quirúrgico exitoso.

Los abordajes endoscópicos endonasales a la fosa pterigopalatina tienen gran importancia no sólo como fin sino también como medio. La apropiada exposición y movili-

zación de la fosa pterigopalatina es un paso esencial en el abordaje endonasal transpterigoideo, el cual permite acceder a la fosa cranial media (cavum de Meckel, triángulos anterolateral y anteromedial) y fosa infratemporal medial, para el tratamiento de lesiones como schwannomas trigeminales, meningiomas, angiofibromas juveniles, y otros tumores nasofaríngeos con invasión de fosa media y/o fosa infratemporal.

J.C. Fernández-Miranda
Pittsburgh (PA), Estados Unidos